


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.540






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.540




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.540










1. 6. 540








XV A
in MYND CARP.





¶ Nicolaus Bargilesius Bononi.

Iactauit quondam claro se Felsina alumno /
Italię summum Felsina docta decus.
Gręcia culta suos cui non componere honores
Audeat: aut celebres promere Roma uiros:
Inclita Mundini quum primum scripta diserti
Assidua uidit uoluere quemq; manu.
Nunc uero quo nam merito te carmine dicam:
Iam tolles nitidum sydera ad alta caput.
Nam cura et magni effecit facundia Carpi/
Laudibus ut surgas conspicienda nouis.
Dum quicquid studium fugit: mentemq; fessile
Mundini: (nam quis omnia nosse queat?)
Legit: et in numerum melius: cultumq; redegit:
Plurimaq; ingenti terfit: & auxit ope.
Vt quondam latio fueras quę prima sub orbe:
Vna fores eadem gloria: & orbis honos.
Idem.
In Carpo feri discant tua scripta nepotes/
Hęc Mūdine etenim charta loquetur anus.

**¶ Niger Cremonensis de Casale maiori
ad Lectorem.**

Qui cupit exertos humani corporis artus/
Sectaq; membra suis quęq; uidere locis:
Ille legat docti perfecta uolumina Carpi:
Nec sibi Mūdinum iudicet esse satis.
Ditior hic illo est: & quod Mundinus omittit
Quodq; docet pariter plenius iste refert.
Singula de nostro soluissē Promethea credes
Corpore: quę tenui sinxerat ante luto.

Illustris. ac Clarissimo Dño. D. Alberto Pio. Carporũ
Comiti. et Dño meritiss. Iacobus Berégarius
Carpenfis. S. P. D.

VM Diuturna. et pene ęterna Illustris. Princeps
ea censerı soleāt. quibus a primis annis assuescere
solemus. mihi persuasum est. nullam obliuionem
delere potuisse q̃ plurima honestissima studia. quę
tecum in mansuetiorũ musarũ rudimentis sub fœ
lici memoria Aldi Manutii Ro. p̃ceptoris nostri conferebam.
Et illud in primis nequaq̃ de alta. ac diuina mente tua excidisse
existimarim: quod per iocum experiri placuit (nam ętas illa ioco
plurimũ gaudet) placuit autem ut porci Anatomia a nobis fie
ret: mihiq̃ sectionis munus demandatũ est. utpote: qui sub gen
tore meo in Chirurgica arte ab infantia pene exercitatus forem.
Tanta (testor Deos ımortales) ex illo tempore Anatomię dul
cedo. mētem. animũq̃ meum tenuit: ut omnem ętatem iis Me
dicinę elementis nō minori bonorũ professorũ utilitate. q̃ priua
ta uoluptate cōtrierim: libros huiusce disciplinę q̃ plurimos: sed
indigestos lectitando: quos eorum authores ad alia trāsferentes
uolumina. fabulas potius. q̃ Anatomia scribere uidebantur: quo
factum est. ut pauci. uel nulli hac nostra tempestate tam neces
sarię. ac p̃ciosissimę artis sinem nouerint. Accedebat insuper
ad eius ignorationem (sic mea fert opinio) fœda. ac multis sto
macosa membrorũ sectio. creberrimaq̃ illorũ attrectatio: Et cū
ego q̃ plurima centena cadauerum secuerim: q̃ pauci ętatis no
stre Medici hanc artem nouerint: Intellexi. Quare p̃senti. ac
futuro sęculo prodesse cupiens: non minus pium. q̃ saluberrimũ
fore putauı: cōmentaria quędam. et digressiones super Anato
mia Mundini componere: quę antiquorũ philosophorũ: pariter
et Medicorũ sapiēter scripta de humani corporis admirabili mo
le demonstrant: illaq̃ copiose tradita a q̃ plurimis medicinę stu
diosissimis uiris rogatus in lucem dedi. Cum autem actu. et ocu
lata fide Academici Anatomia cognoscere cupiant: Ars in illis
cōmētariis difusior est: q̃ ut breuiter cognosci possit. Et p̃pea ad
cōmunē omniũ bonorũ utilitatē p̃sens perlucidũ Enchiridion

A 11

DE ANATOMIA

omni alio sibi pari uberius de ipsa Anatomia composui: In quo omnia in cōmuni sectione designata apparent: eiusq; beneficio omnis longē inquisitionis labor aberit: Hocq; Alberte clarissime: ac sapiētissime princeps nūcupatim tibi dedicaui eorū aductus exemplo: qui labores suos alicui deorū cōsecrarunt: ut sub illorū numine securius in manus hominū peruenirent: idq; instantius egi: q; tu unus inter reip. Christiane primores / nō solū bonorū fortunę: Sed cuius uis Minerę sis facile princeps. Naturalis. n. ac moralis Philosophia: & quę Deū cōtemplatur: Theologia: & omnes deniq; scientię sunt tibi tanta amicitia / ac affinitate coniunctę: ut sapientis nomen apud omnes merito tibi uēdicaueris. Et cum semper benignus fueris: sisq; Carpoq; patrię meę / meiq; meritissimus Princeps / fortunas meas / ingeniū / cogitationem / mentem deniq; omnem / benignitati tuę debere non eram in scius / & eo maxime: q; in edibus tuis omniū bonarū disciplinarū nido huiusce preciosissimę artis principia tuo sub scēlici auspicio sumpserim. Suscipe igitur gloriosissime Princeps lęto animo: ac serena frōte hoc de Anatomia Enchiridion a fido / ac sincero mancipio tibi dicatū: quādo nō minus Regium sit munera quā tulacūq; fuerint / hilari fronte suscipere: q; preciosissima elargiri. Oblationes siquidē lacteas a cretensi pastore Ioui datas gratissimas fuisse constat: nec eorum munera aspernātur / qui cū Thus nō habeant / mola salsa litant: tantū. n. ex labore meo & tatis nostrę medici tibi debebunt / quantum & uoluptatis: & utilitatis ex hoc libello suscipient / quo cum in hac materia alius breuior: & lucidior nō fuerit: Celsitudini tuę ad decantādas laudes semper obnoxii mecum dicent: deus tua uota secundet. Vale.

ISAGOGAE Iacobi Carpi i Anatomia humani corporis.

Illumina me dñe spiritu ueritatis & manifestabo
opera manuum tuarum.

OC Opus duas habet partes. Prima uniuersalis: *Prima pars operis.*
Secunda particularia tractat: Prima notat secundū
aliquos hoc nomen Anatomia derivari ab Ana.
græce/qđ latine significat: per. Sursum/Re/Aequa
le/Rectū/et tomos: quod diuifio/seu sectio dici/
tur: quasi recta per partes/uel circa partes diuifio.

Sed uerius interpretando/Ana incōpositione/pter alia/signifi
cat per singulas partes inuestigationē quādā/unde incōpositiōe
huius uerbi temno/quod est incido/significat in singulas partes
seco/Inuestigandi causa/quę/et quot sint:& quāq̃ ratio uideatur
dici de omnibus/quę partes habent/usus tamen obtinuit/ut de
animalibus/et maxime de hominibus dicatur.

*Quid sit ana
tomia & unde
dicatur.*

Est igitur Anatomia/seu Anatome diuifio omnium corporis
aialis partiū/inuestigādi causa: earū substantiā:quātitatē/nume
rū/figurā/sitū/et colligantiā:& hæc in mortuis/quibus pōt addi
cōplexio innata. Et ideo dicebat Gal. in libro de p̃stitutiōe artis
medicatiue: puto necessariū esse nobis/cū hāc cōstituimus artē:
nō solū cognoscere particulas & illarū cōpositionē: sed etiā opa
tiones earū:& in hoc differūt medici ab edificatoribus. Illi.n.do/
morū particulas solas et cōpositionē sciunt:nulla tamen earum
operat̃ eo quia nō est animal:a medicis aut̃ mēbroꝝ hominis:in
quātū est animal:opationes sunt querendę:et quia uere in uiuo
homine et nō mortuo opationes/cōplexiones innate ac influen
tes/et passionēs sunt. Ideo hæc tria in eis ultra p̃dicta inuestigan
tur. Sūt igitur in reali anatomia oīa p̃dicta nouem cōsideranda:

Sed quia a toto tanq̃ a notiori est incipiendum. Primo situato
aliquo cadauere supino in loco icisioni ac ostensionī apto. Prius
loto et a pilis raso:et a sordibus optime mūdato/a capite usq̃ ad
pedes. Sciendū est corpus diuidi. In quatuor partes. s. in tres uen
tres notabiles/et i extrema. s. manus et pedes cū aliis quibuscūq̃.
Prima ps ē testa/caput dicta/eo qđ ibi sensus initiū capiūt: in
quo mēbra aīalia p̃tinēt. hæc ps cōiter sup̃mus uēter appellat̃.

*Diuifio cor /
poris.*

Prima pars.

DE ANATOMIA

Secūda pars. ¶ Secunda pars est concauitas intra costas & ossa eis annexa in qua principaliter spiritalia/seu uitalia/& aliqua alia mēbra sunt. Et hęc pectus/et etiam cassus:& uenter medius dicitur.

Tertia pars. ¶ Tertia pars est concauitas: quę est intra abdomen & partem dorsi infra septumtrāuersum alias diafragma descēdendo ante usq; ad pectinē:& retro usq; ad anum. In qua mēbra nutritiua/& etiā generatiua p parte cōtinētur:& hęc uēter inferior nūcupat.

Quarta pars ¶ Quarta pars est totū corporis residuū: uti collum/manus/& pedes, ac illis seruientia. Hęc pro prima parte.

¶ De Anatomia uentris inferioris.

**Secūda pars
opis.**

¶ Ista parte uniuersali ad particularē deuenio. iqua opator incipere debet sectionē a uentre inferiori: in quo sunt multa mēbra prius anatomizanda & abiiciēda: ne corporis reliquū sua putredine & prauo odore (si postponātur) īpediāt.

¶ Dicamus igitur istum uentrem iuxta prędictas nouem conditiones considerari debere: Et primo circa substantiā: quę est diuersa tam secundum partes continentes q̄ contentas. Substantia partium cōtentarum loco suo apparebit: Cōtinentiū substantia in parte anteriori et laterali pānicularis et musculosa est: ut contractioni et dilatationi apta sit propter impregnationem et cibaria et alia iis similia. est etiam uenosa ac Arteriosa.

**Dignedo nō
est mēbrū.**

¶ In istis partibus est etiam in corpore pingui notabilis pinguedo: In demacrato uero est pauca: et interdum nulla: et pinguedo nō est proprie membrum: sed est adueniens et recedens tāq̄ superfluitas/utilis tamen.

¶ Posterior uero substantia huius uētris est carnosā / musculosa: ossosa: ac etiam parū mēbranosa: pariter uenosa & Arteriosa.

¶ Quātitas eius et figura patent: situs et locus suus est sub uentre uitaliū mēbrorū septotrāuerso mediāte: Incipiēdo a furculā pectoris inferiori et a confinibus septitrāuersi ab utroq; latere quinq; costarū inferiorū trāsit usq; ad partem / in qua corpus bi partitur a magnis pedibus / quibus alligatur. Sua etiā colligantia est cū cerebro mediātibus neruis:& cum corde mediātibus Arterialis: et cum uentre medio per musculos aliquos. De colligantia ipsius cum hepate et mēbris generationis omnibus notū est.

¶ Numero est unus uenter: Numerus tamen partium eius est diuersus: quia aliquę partes sunt contēte / aliquę cōtinētes. Cōten-

te sunt Iecur cum sua parua cysti cōtinēte bilem: et Lien: et Ven-
triculo a multis stomachus dictus: licet male: et sex intestina cū
uenis per ea dispersis: et Renes cū suis emulgentibus: et Vesica
cum poris uritidibus: qui dicuntur emūctoria renū: et Mensente
reon cum suis glādulis: et Vena portę: et Vena chilis cum Arte-
ria Aorta descēdentes: & Venę ac Arterię Vmbilicales: & Vasa
seminaria cum Didimis et Testibus: et Matrix in fēmina: et licet
Didimi et Testes cum suo scroto seu oscheo sint exteriores: po-
nuntur tamen in isto uentre quia alligantur ei imediate.

asēbra cōte-
ta in vētre in-
feriori.

¶ Partium uero continentū: Alię sunt cōmunes: alię proprię: &
alię magis proprię: cōmunes sunt omnes illę partes / quę istum
uentrem circūdant: s. anteriores: laterales: et posteriores: antero-
res et laterales latine dicuntur Sumen / antiquus uero Abdomen:
gręce Epigastrium et ab aliquibus Hetron: et arabice Mirach / po-
steriores dicuntur Imum dorsi.

¶ Harres conti-
nentes.

Sumen.
Abdomen.
Epigastrium.
Hetron.
Mirach.

¶ Partes uero proprię: alię sunt ante: alię a lateribus: alię poste-
rius: quę sunt ante a recētoribus medicis cōiter ponūtur quę:

¶ Prima a superiori incipiens: quę est in medio corporis circa fur-
culam inferiorem pectoris: dicitur gladialis & scutalis cartilago:
& etiam pomum granatum: hęc tamen pars est cōmunis uentri
medio et inferiori paruū occupans locum.

Gladialis.
Scutalis car-
tilago pomū
granatum.
Stomachal-
lis.

¶ Secunda sub ista imediate est pars dicta stomachalis: quia sto-
machus: s. uentriculus est in ista regione cum sua parte anteriori:
& hęc pars se extendit fere usq; ad Vmbilicum.

¶ Tertia est pars umbilicalis dicta: et est ea pars / in qua est Vm-
bilicus clausus in medio abdominis: iam frustratus in nato a suo
principali opere.

Umbilicalis.

¶ Quarta pars est dicta a Mundino sumen: quia est pars emi-
nentior ipsius suminis: & ibi sumitur pars pro toto: hęc regio est
ab Vmbilico usq; ad pectinem.

Sumen.

¶ Quinta est pars pecten dicta: intra quā est os pubis seu pecti-
nis. In ista regione intra uentrem incipit collū Vesicę in utroq;
sexu: & matricis in fēmina.

Pecten os pu-
bis.

¶ Partes laterales proprię ab utroq; latere equaliter diuisę Cō-
muniter a medicis sunt posite duę. s. supior & inferior: supior dicit
hypocūdriū / inferior dicit ilium uel flancus: illa et dicunt lagona &
cenona: In hypocūdrio dextro ē Iecur siue hepar: Lien uero ē in

Hypocūdriū
Ilium.
Flancus.
Lagona.
Cenona.

DE ANATOMIA

- Inguē bubo.** sinistro. ilioꝝ pars superior incipit a supremo ossium ancharū & finitur uersus inferius in extremo huius uentris/ ipsoꝝ infima pars dicitur inguen et bubo. hypocūdrīa uero incipiunt ab extremis costarū mēdosag/ et inferius terminātur ad ilia: inter ilia et hypocūdrīa apparet certa cauitas/ quādo homo ad anteriora flectit: quę ab aliquibus uocatur colago/ et ab aliquibus itrum.
- Colago itrum.**
- Spina iserior: filū dorsi.** ¶ Partes posteriores proprie dicte/ alię sunt in medio alię a lateribus/ quę sunt ī medio dicūtur spina iserior et filū iserius dorsi.
- Lumbaris regio Renalis Luneo nates.** ¶ Laterales alię superiores et alię inferiores/ superiores dicuntur regiones lumbaris et renales: inferiores dicuntur partes supra clunes seu nates.
- ¶** Partes uero magis proprie nominatę/ alię etiam sunt anteriores/ alię laterales/ et alię posteriores. Anteriores et laterales coincidunt/ & sunt cutis primo occurrens/ sub qua est pinguedo et octo musculi/ quorū quatuor sunt obliqui/ et duo longi et duo lati/ oēs dilatati et uniti ad instar pāniculi: qui potest uocari īmo ab Aui. uocatur pāniculus carnosus: nec ibi est alter pāniculus carnosus: ut putant moderni.
- ¶** Sub musculis est membrana subtilis et dura. gręce peritoneon alias peritonion dicta: & arabice Siphac. hęc omnia componunt abdomen/ siue mirach.
- ¶** Posteriores uero partes etiam magis proprie dicte/ sunt cutis: interdū aliqua pinguedo/ Caro musculosa ab utroꝝ latere sphō dilog. s. ante et retro lūbaris ab aliquibus uocata: & caro nō musculosa simplex replēs huius partis loca uacua: & sphondili renū siue alkatim/ et tria ossa ossis sacri/ siue tres sphōdili arabice alho uis dicti: et tres sphondili alhosos siue caude/ et suę chartilagine/ cū suis pāniculis/ et neruis/ uenis et arteriis: et pāniculo peritonio: istarum partium anatomia dicetur loco suo: Nūc autē ad anatomīā abdominis me conuerto: & primo de cute.
- ¶** De cute Ventris inferioris et de Umbilico.
- ¶** Considerabis primo locū umbilici qui dicitur radix hominis: qui habet extra corpus uersus matricem duas uenas et sepiissime unam: et duas arterias putamine cuticuli obductas: qui in nouiter natis ligatur et secatur prope abdomen et per se cōsolidatur et clauditur: eius pars media sic consolidata Acrophalū dicitur: et quia corugata est dicitur Vetula: et

græce Græa: p̄dictis cōsideratis seca cutem secundum crucem in longū et latū in toto abdomine: et excoria ipsam seruādo umbilicū illesum: quē sēpissime uidebis ingredi uentrē cū una uena notabili et duabus arteriis: quę in natis sunt frustratę a p̄prio ope.

Græa.
Locus umbilici.

¶ Vena est ascēdens penetrans incōcauo hepatis i uena portę.

¶ Arterię descendunt per par tē interiorem abdominis sere usq; ad pectinē: et trāseūt ad dorsum a lateribus uesicę et implātātur una a dextris alia a sinistris in arteriā aortam circa os sacrū infra Renes bifurcatā. iste arterie aortę uocātur sēmpiternę.

Arterie sēmpiternę.

¶ Ex istis uasis meat sanguis et spiritus ad Iecur et ad Cor ifantis in utero matris/istū umbilicū melius uidebis post anatomiam abdominis/ quem cū diligentia seruabis cutē considerando: quę duplex est: prima est exterior: quę est mēbrorū grossa superflui/ tas: ideo renascitur: secunda est interior neruea nō renascēs sub qua uel in qua circa latera in quolibet sexu sunt duę uenę: una a dextris alia a sinistris cū difficultate i nato uisibiles: sed i foetibus triū mēsiū uel circa optime apparēt: quę ascēdunt usq; ad mamillas: quas cōserua pro anatomia mamillarū maxime i femina.

Tene ad mamillas tēdentes

¶ In tota tñ cute corporis sunt p̄tenuēs uenę in fibras disperse: et adeo tenues et angustę/ ut per eas penetrare sanguis nō possit aliud ue q̄ exilis humor/ q̄ sudor et sanguinis serositas appellat.

Sudor.
Sanguinis serositas.
Pinguedo.

¶ De pinguedine.

¶ Ost cutim est sēp aliqua pinguedo maxime i corpore nō resoluta ab egritudine/ maior in uno q̄ in alio/ quam remoue/ ut melius uideantur mēbra sub ea cōtenta.

¶ De Musculis uentris inferioris.

¶ Ost pinguedinē sunt uidendi octo musculi abdominis: quorū primo occurrūt quatuor obliqui nominati/ Eorū duo locātur a dextris/ et duo a sinistris: qui cum suis cordis regunt a summo ad Imum totum istum uentrem antierius et superequitant omnes alios: In quolibet enim latere uentris et ante in medio abdominis unus ipsorū est descendens: et unus ascēdens/ descendentes sunt supra ascendentes: quos optime uidebis duce docta manu.

Octo musculi Abdominis.

¶ Primo seperabis caute descendentes ab ascendētibz/ et reperies in quolibet latere uētris eos inuicem incruciati/ una Crux est a dextris/ alia a sinistris/ eorū pars carnea se se inuicem incru/

DE ANATOMIA

ciat sicut neruea seu cordosa etiam se inuicem incruclat. sui uilli tendunt semper oblique a lateribus uersus medium uentris ita q̄ corde istorū musculorū dextri lateris tēdunt ad sinistram partem eiusdem lateris dextri: et cōtrario modo tendunt corde musculorum sinistri lateris. s. in quolibet latere suę proprię cordę se se inuicem incruciant.


¶ Et musculi obliqui incipiunt facere cordā cum obuiant musculis longis/et corde musculorū dextri lateris & etiā sinistri terminantur ubi musculi longi sunt cōtigui: qui locus est in medio uentris per lineam rectam/ a pomo granato usq̄ ad pectinem.

¶ Descendentes trahunt orrum a pectore/ ascendētes uero a regione suprema et anteriori ossiū ancharū/ ipsorū cordę sunt bitunicales: latę ualde/ de difficili seperabiles/ ortę a pāniculis tegētibz eos: et auillis nerueis per eos dispersis.

¶ Duę tunicę cordarū musculorū descendentiū in quolibet latere & una tunica cordarū musculorū ascendētium/ supra tegit muscolum longum sui lateris: a summo ad imū: Vna etiam tunica musculorū obliquorū tegit seu inuoluit musculū longum sui lateris uersus inferius. s. uersus cordam musculi latr: quia musculi longi carent proprio pāniculo eos tegente ut sensus demōstrat: et p̄dictos musculos obliquos optime uidere potes in tribus imediate sequentibus figuris: Omnes tamen eorum cordas in secādo diligenter uide: quas non moueas integre/ nisi supra musculos longos existentes: quę autem sunt sub musculis longis seruande sunt usq̄ quo Anatomizasti eos.

VENTRIS INFERIORIS.


6



In hac fi-
gura hęc du-
o musculos
obliquos dīcē
dētes/ vnus a
dextris alium
a sinistris: qui
sūt supra oēs
musculos: Eo-
rum pars car-
nea apparet a
laenibus & i
medio vētris.
Supra mu-
sculos lōgos
sunt eorū cor-
dae .s. vna a
dextris: alia a
sinistris: pelli-
culares & la-
tae: q̄ terminā-
tur in linea: q̄
est i medio vē-
tris: vt vides:
& cordae istae
sunt duarū
pellicularū .s.
secundū sub:
& supra.

In hac fi-
gura hēs du-
os musculos
obliquos ascē-
dētes: q se ieru-
ciāt cū duob⁹
descēdētib⁹ in
alia figura po-
fig: qui qdē de-
scēdētes sunt
supra istos a-
scēdētes: et to-
tus vnus ex p-
dictis muscu-
lis descēdenti-
bus supra po-
fig i alia figu-
ra cum corda
sua superquirit
obliq muscu-
lū vnū ex istis
ascēdētib⁹ ob-
liq: et faciūt si-
mul figurā. x.
littere graece: et
istoz musculo-
rū ē pars car-
nea ē a lateri-
b⁹: Corde xō
eoz sunt i me-
dio ventris: q
sunt ēt duarū
pellicularū: et
hūt vnā pel-
liculā tñ supe-
grantē muscu-
los lōgos: a-
lia vero pel-
licula ē infra mu-
sculos lōgos:
q adheret cor-
dis latitudina-
liū musculoz:
et istae cordae
ē terminant i
linea: q ē ime-
dio vātris: vt
vidēs.






In hac figura vides
quiter elevatio
musculis lon-
gis sub eis est
vna pellicula:
quae est d cor-
da musculorū
obliquorū:que
habet villos
obliquos: et ē
vna sub quoli-
bet musculo
lōgo: vt vides
in hac figura:
et musculi lon-
gi sunt illi qui
pendent inter
coxas: vt ap-
pareāt elevati
a loco suo na-
turali et pos-
sint videri cor-
dae praedictorū
musculorū
obliquorum
ascendentū.

¶ De Musculis longis.

m Vsculi longi seu recti sunt duo in medio abdominis sub et supra cordas antedictas locati a furcula inferiori pectoris tendentes cum suis uillis per longum uentris usque ad os pectinis: et ideo dicuntur longi: isti sunt sibi contigui: occupantes partem anteriorem uentris per latum in quantitate latitudinis in totum octo digitorum uel circa. Isti musculi non habent proprium pāniculum sicut alii: habent tamen cordas breues terminatas in pectine: et nō habent alias cordas. Sua substantia carnea est: et diuisa in latum magis uersus cutem quā uersus siphac per duo intermedia neruea seu ligamentalia: quorum unum est supra regionem umbilicalem: aliud infra: taliter quod quilibet musculus uidetur diuisus in tres partes carneas notabiliter distinctas: ut potes uidere in figura sequente. & ista intermedia supra dicta a natura sunt ordinata quia quāto uilli musculorum sunt breuiiores: tanto facilius et melius seruiunt uoluntariis motibus.

Nota.



In hac fi-
gura vides
duos muscu-
los longos de-
nudos a cor-
dis musculor-
obliquor- qui
musculi longi
sunt supra cor-
dis musculo-
rum latitudina-
lium: et quili-
bet musculus
habet duas di-
uisiones ner-
ueas seu liga-
mentales in se-
per latum ten-
dentes. s. vna
supra umbili-
cum: et aliam
infra: vt vides:
et ita quilibet
musculus lon-
gus videt di-
uisus in tres
partes seu in
tres musculor-
um: et hoc fecit na-
tura: quia quato
villi musculo-
rum sunt breuio-
res: tanto me-
lius et facilius
contrahuntur.

DE ANATOMIA

¶ De Musculis latis :

u Iſis prædictis : musculos tam obliquos q̄ rectos abſciat
ut melius uideas latos: qui ſunt ſub longis cum ſuis cor/
dis mediante una ex tunicis cordarū musculorū obli/
quorum aſcendentium/ quam uide cum diligentia poſtq̄ remoti
ſunt muscoli longi: quę tunica eſt ſubtilis ualde: alligata notabili
ter cordis musculorū latitudinaliū/ qui muscoli lati habēt ſuam
partem carneam ſub parte carne obliquorū: et iſti dicūtur lati
quia poſitio ſuorū uillorū eſt per latum uētris/ et iſti ſunt magis
ſupra regionem umbilicalem q̄ infra: quia a ſuperioribus ad infe
riora eſt ſua principalis operatio: quę eſt expulſiua inſteſinorum
luuare/ eorū pars carne eſt dorſum uerſus: Terminātur in cor/
das in illa ragione ubi eſt ſitus longitudinaliū: et dexter obuiat
ſiniſtro mediāte ſua corda/ ipſorū pars carne eſt ſub carne obli/
quorū: et corde ſuę ſunt imediate ſub cordis obliquorū aſcendē
tiū prædictorū/ iſtę cordę ſunt etiam multū latę/ et etiā bitunica
les/ durę/ inuicem cōpactę/ pāniculo peritonio ſeu ſiphac alliga
re/ et ſuę cordę inuicem ſe cū musculis lōgis ad angulos rectos.

¶ Ex prædictis apparuit ſitus musculorū uentris inferioris. Sua
ſubſtantia/ ſua quātitas/ ſua figura: eſt cōſpicabilis: Numero ſunt
octo: quatuor obliqui: duo longi/ duo lati/ colligantia eſt oſtēſa/
Firmiſſime. n. inuicem ſunt cōcatenati: & taliter ſunt uniti q̄ iu/
dicantur unus pāniculus qui dicitur carnoſus: Complexio eorū
in uiuo patet ex ſua ſubſtantia.

Pāniculus
carnoſus.

¶ Luuamenta eorū ſunt calefacere inſteſtina/ et manutenere uni/
ta omnia mēbra nutritiōis: et luuare retentiua: expulſiua tamen
principaliter: iuuant et interdum membra anhelitus: maxime in
ſlamine cum ictu: et in uiolenta expiratione: paſſiones omnium
modorum poſſunt pati.

Flāmen cum
ictu.
Uiolenta expi
ratio.


¶ Prædictos musculos uidebis in prima figura ſubſequentē/ et in
ſecunda figura uidebis ſitum/ locum et etiam figuram octo mu
ſculorum abdominis: ſeu epigaſtri: alias mirach: qui tamen me/
lius hos musculos et multa alia perſcrutari intendit/ ad noſtra ſu
per Mundino cōmentaria Recurſum habeat/ de quorum labo
re poſt mortem me Amabit inuidia.



Thabes in
hac figura
duos muscu
los latos/su
pra quos erat
musculi longi
et obliqui/ qui
nunc sunt eleva
ti ab eis/ ut vi
des/ et istorum
musculorum lati
tudinalium po
carnea est a la
teribus/ pars
vero eorum ner
vea .s. cordae
eorum sunt in me
dio ventris/ et
sunt ex duabus
pelliculis com
positae. .s. secun
dum sub et su
pra/ et sunt al
ligatae cum pa
niculo siphace
et isti musculi
sunt magis in
superiori parte
huius ventris
quam in inferiori
ut vides/ ut
melius expel
lant inferius
quod in inte
stinis est.

B

In hac figura sunt tres species musculorum. s. obliqui longi & latissimi: & habes in dextra parte duos musculos / qui non sunt regentes totam partem dextram / sicut faciunt naturaliter / & ut monstratus est in prima & secunda figura: & sic in hoc loco facti sunt: ut melius videatur eorum in cruciationem sinistra vero parte habes unum musculum longum: & unum latissimum: cuius lati tantum apparet pars carnea: corda vero ipsius musculi latissimi est sub musculo longo praedicto.



¶ De Peritoneo seu Siphac.

His predictis eleua cū cautela cordas musculorū latorū
ab una mēbrana sibi ānexa uersus itestina: quę est subti
lis et dura: Peritoneon et Siphac noīata: ista ambit totā
uacuitatē uentris inferioris circūquaq: Rotūda est: nō perfecte
tamen. Sua substātia est Neruea dura: sua figura dicta est.

¶ Ab isto pāniculo oriūtur duę bursę uel saccl didīmi uocati: in
quibus sunt duo testes. intra scortū locati: quę sunt partes ipsius
scortis: sua quātitas est quanta est uacuitas uentris inferioris: situs
patet: numero est unus pāniculus solus: colligantia sua est cum
musculis latis et cum omnibus membris cōtentis in isto uentre:
et omnia membra hulus uentris habent pāniculum proprium
ea inuoluentem: ortum ab isto peritoneo.

¶ Colligatur etiā secūdū Aulc. cū pleura colligat etiā septotrā
suerfo et testibus: sua cōplexio est illa: quę est aliorū pāniculorū.

¶ Iuuamēta sua sunt ligare dorso mēbra nutritionis & generatio
nis: & calefacere itestina: & ea seruare a Ruptura: & ea habet ma
nutenere ab exitu extra uentrē: Iuuat ēt simul cū septotrā suerfo
expulsionē cōtentorū in uentriculo: & in intestinis: & in matrice.

¶ Passiones omniū modorū patitur: sua propria passio est Cre
patura & Mollificatio. Curā omniū uide alibi: quia in demōstra
tione anatomie nō cōuenit ponere curā ascitis: neq: curā uulne
rū abdominis: nec intestinorū: nec modū castrādī: nec extrahē
di lapidē: sicut fecit Mūdīnus: nec etiā alterius egritudinis. Nos
tū dicemus aliqd de flebotomia uenarū Guidez: & forte aliqua
alia singularia. Medicis necessaria de qb⁹ raro scribūt authores.

¶ De Omento siue Zirbo.

Redicta mēbra abicienda sunt: ut melius uideatur resi
duū mēbrorū: & primo occurrit Zirbus seu Omētum:

Rete a uulgaribus dictū: qđ ē mēbrū cōpositū duabus
pelliculis nerueis subtilissimis: cū multa pinguedine sibi annexa.

¶ Habet hoc mēbrum plures uenas pulsantes & quieras: mani
festiores tamen in macro corpore q̄ in pingui: Sui pāniculi seu
pāniculus sunt discontinui per totum: nisi circa circūferentiam
eius: habet formā marsupii seu saccl. Est enim inter ipsas pellicu
las maxima concauitas.

¶ Sua substantia est dicta: Colligantia est cū Siphac: cū Colon &

eum Splene. Suus situs est ante uersus: supra intestina extensus a uentriculo usque ad inguina. Sua magnitudo est conspicabilis: Numero est unum membrum solum. Sua figura est tacta: Sua complexio est complexio partium eum componentium: Sua inuameta sunt luare digestiuam et remollire feces. Passiones omnium modorum potest pati: Causat ramicem in scroto: In umbilico et in inguinibus: et alibi in sumine: si rumpatur uel mollificetur peritonion.

De Intestinis.

De reuolutio/
nis intestinorum.

Leua Zirbu et uidebis intestina que sunt continua a uentriculo ad Anum: uoluta et reuoluta: ut longo tempore retineant cibum gratia boni finis, et numero sunt sex.

Rectum intesti/
num.
Colon.

Primo ab inferiori ascendendo: est Rectum: longitudine palmi uel circa.

Secundo est Colon: quod ascendit per partem sinistram usque ad regionem Renis et lienis: deinde transit a sinistro in dextrum: super equitudo stomachum: & in dextro unitur intestino sacco: circa supremam partem ossis Anchi locato.

Saccus.
Caecus.

Hoc intestinum saccus et Cecus dictus: est tertium in ordine numerandum: Et ista tria dicuntur grosse substantie. Carnosa enim sunt: et possunt consolidari si soluantur.

Ileon.

Quarto est intestinum longum: Ileon et Reuolutum seu inuolutum dictum: quia reuoluitur unde quaque per uentrem. Quinto est Ieiunum: Sexto Duodenum: Et ista tria sunt subtilia: ab aliquibus laces dicta: quorum solutio non consolidatur: si est notabilis: Subtilia sunt superiora per colligantiam: et Grossa sunt inferiora: omnia habent duas tunicas et pericolum communem ortum a peritonio: super te gentem et alligantem ipsa dorso.

Ieiunum.
Duodenum.
Laces.

Interiori eorum parti Pituita alias Phlegma adheret: ut resistat corrosioni & lubricket feces: in eis secundum aliquos sunt uilli omnium modorum: plures tamen lati: Sua complexio est frigida et sicca: et Gracilia sunt frigidiora Grossis: quia substantia sua est Neruea: in Grossis est aliqua caro: Sua figura apparet: Suus situs partium laris apparuit et apparebit ex dicendis: Inuamenta sunt nota: Passiones omnium modorum patiuntur.

Mesenterice la/
ces.
Sanguificatio
incipit in mese/
raico.

Ad particularem anatomiam intestinorum uidendam. Primo uide cum diligentia: Situm eorum: et antequam ea separe a mesenterio: considera eorum Venas mesenterice et laces ab aliquibus dicte: que portant chylum ad portam uenam: in quaque ramis minimis incipit sanguificatio duce

Iecinore. Nota etiā Situm Venę Portę: quę est extra concavum Iecinoris tendens uersus intestina: & uersus stomachum: Omentum & Lienem cum octo ramis: quos omnes ulde cum diligentia: si potes anteq̃ intestina abiciantur.

Ueni postea

*Octo ramę
vene portę.*

¶ De intestino Recto.

Stis expeditis. primo uidēdū est Rectum seu lōganon: quod est sece mundandū: ipsam manibus exprimēdo in Colon: & suum extremū uersus Colon est in duobus locis ligandum: & inter ligaturas secandum. Sua enim positio est ab Ano ad superiora per Ventrem ascēdes circa palmū: paucas habēs Venas meseraicas: quia suum cōtentū parū nutrit: terminatur circa llium sinistrum: ubi incipit Colon: Recto unitum.

*Rectum
Loganon.*

¶ De Colo intestino.

Otabis Colon esse situm in sinistro: & circa Renem sinistrum ascendit: & ibi est strictus: ut cedat locū Spleni quem cooperit & cui alligatur: tendit ab hinc ad dextrū latus: & superequitat Ventriculū & ei alligatur: hinc sit syncopis secessus tempore: hinc suus dolor crescit sumpto cibo: sed dolor Renalis crescit in secūda digestionē: alligatur Omento: a quo & etiā a uētriculo humectatur: tegitur penula Iecinoris: in qua est Cystis bilis: ideo subnigrū est & amarū: est cameratū seu cellulatū: pituita abundat. Cucurbitini et etiā alii uermes in isto generantur: In ipso etiā sterco acquirunt figurā inequalem: in isto fit rugitus parū ante ascēdendi horā: Taliter est situatū: ut a superiori ad inferius melius graue descēdat: & ut cooperiat leiuū & duodenum ipsa ab extrinsecis tuendo: & ut sue feces remoliantur ab Omento ipsi continuato: & ut etiā a cysti felis ad ipsum resudet fel: seu bilis: suarū fecū expulsionem stimulans. Ex suo situ habetur situs clisterizādi: & locus applicatiōis medicaminū in colica: Sua quātitas est cōspicabilis: Sub substātia est carnea parum: & neruea ac pinguis & Solida: ut resistat duris & acutis. Notabiles etiā habet Venas Meseraicas: per quas meat chilos & sanguis.

Colon.

*Cucurbitini
generatur in
colo intestino.*

¶ Sua propria passio est dolor uentosus: in hoc generantur lapides & coria a pituita exliccata: istis uis potes excarnare Colon a Mesenterio: cui alligatur: & dimitte Rectum in loco suo usq̃ ad Anatomiam Antiquę non potest perfecte ulderi: nisi quādo facies anatomiam uligę & uesicę.



DE ANATOMIA

Saccus.
Cecus.
Monoculus.

¶ De Sacco Intestino.

Vicintestino circa os anchē infra Renē in latere dextro
h locatur intestinū unū Cecus: Saccus & Monoculus di/
ctus/ quia pender ut Saccus / & unctū habet orificium:
per quod trahit & expellit feces/ in diuersis tamen horis trahit
ab Ileo & expellit ad Colon/ in isto fit maior digestio q̄ in alio in
testino: Est enī alter uenterculus/ primo attrahit/ deinde dige/
rit/ postea ad Colon expellit.

¶ Sua quantitas est circa palmum per longum/ latum est ut Co
lon/ & etiam plus/ non est Mesenterio alligatum: sed pender in
uentre. In isto generantur Vermes/ Serpentes dicti.

¶ Hoc tñ intestinū sepe reperitur frustratū in natura: quia nihil
operatur de p̄dictis/ & tūc reperitur etiā alligatū Colo intestino
& ileo/ & est tanq̄ additamentum quoddam/ & sua figura apparet
compacta stricta: intus tamen est uacua/ & est minor digito mini
mo manus per latū/ & est longitudinis triū unciarū uel circa.

¶ De ileo Intestino.

Ileon.
Longum
Reuolutum.
Inuolutum.

Vicintestino Sacco ascendendo imediate alligatur pri/
h mum de gracilibus dictum ileon/ & longum/ & reuolu
tum seu inuolutum/ culus substantia est gracilis/ sua fi/
gura oblonga est & rotunda/ quātitate est longior q̄ omnia alia
intestina simul/ in isto intestino sunt plures meseraicę q̄ in aliquo
alio propter suam longitudinē: Situs suus est magis circa ilia/ est
tamen alibi per uentrem: Alligatur Mesenterio: quo debet ex
carnari/ ut alia intestina superiora bene uideas: Sua propria pas/
sio est iliaca dispositio/ & passio dicta miserere mei/ in qua sterco/
ra transeunt ad os: ut uomitu patientis comprehenditur.

¶ De Ieluno intestino.

Ieiunum.
Hira. Hilla
Sterile. yagum.

Vicileo continuatur Secundū de gracilibus: Ieiunum:
h hira: & hilla: & sterile dictū: siue uacuū: & est uacuū quia
est propinquū iecinoria: quo euacuatur attrahendo ab
eo chilū et expellendo in eo contenta/ mediāte bili a Cysti circa
Duodenū i ipso ingrediēte/ plures Meseraicas habet aliquo alio
intestino sibi pari in longitudine: ut cito succurrant iecinori: Est
tamen magis uacuū in sua superiori parte iuxta Duodenū: & nō
est totaliter rectum/ sed incipit reuolui ubi alligatur ileo: et Ideo
pro parte est rectū & pro parte inuolutū/ color eius est citrinus:

gula iecini uicinus: est similis ileo i substantia et figura: Sua quantitas est conspicabilis: non magna tamen: & suus situs est circa regionem Hepatis et parum infra: in medio tamen uentris.

¶ Istis uisus potes excarnare etiam hoc intestinum sicut alia a Mesenterio: ut melius uideas duodenum: quod cognosces in sua longitudine a stomacho infra esse in quantitate quantum sunt duo decim digiti per latum a stomacho uersus inferius.

¶ De Intestino Duodeno:

¶ Ultimo loco est uidendum supremum de gracilibus dictum Duodenum et Dodedactilon: cuius quantitas per longum apparuit supra: et sua latitudo est minor omni alio Intestino: et est tanta quanta est porta inferior uentriculi dicta grece Pyleron: latine Ianitor.

Duodenum.
Dodedactilo

Pyleron.
Ianitor.

¶ Sua substantia est gracilis: Non est reuolutum sed rectum alligatum uentriculo uersus suum superius: et alligatur Mesenterio: circa Jejunum alligatur etiam Cysti bilis: per canale quod portat bilem ad intestina mundificanda: a pituita principaliter: et a fecibus.

¶ Iste canalis ingreditur diagonaliter in isto intestino iter tunicam et tunicam: ne reascendat bilis et forte Chilus ad Cystim.

Jugresus diagonalis cystis in duodeno.

¶ Istud canale cum cautela considera: et conserua pro Anatomia predictae Cystis: sua iuuameta sunt suscipere a uentriculo digesta: et transmittere ea ad alia intestina: patitur omne genus morbi.



¶ De Mesenterio:

¶ Is uisus incide Duodenum infra portam ad ipsum uenientem a Cysti bilis: primo ligando eum: ne in uentriculo contenta exeant: et alia intestina elicias: si ea prius excarnasti caute: ut predictum est a Mesenterio seu Eucaro: quod ab aliquibus etiam dicitur lactes. Hoc membrum est inter ipsa intestina locatum: in eorum centro ea ligans dorso: et compositum est pro parte ex pelliculis duplicatis: & ex Pinguedine et Gladulis: in quo sunt Venae multae ab Hepate mediate Vena porte uenientes: quae coniter uocantur Meseraicae: et a Gal. dicuntur manus Hepatis: quia rapiunt ab intestinis materiam sanguinis et illam dant hepati. Et istae Venae sunt ex aliquibus Ramis Venae portae: quae sunt extra hepari isto membro sunt et aliae Arteriae.

Mesenterium
Eucarus.
Lacteo.

Meseraicae.
Manus hepatis.

¶ Hoc membrum est bipartitum: Prima pars est in superiore parte ad Jejunum et Duodenum alligata: quae est ualde glandulosa: et haec pars habet suas pelliculas simplices: et per istam partem transeunt Venae

Mesenterium duplex.

Prima pars Mesenterij.

B IIII

DE ANATOMIA

**Dolce morfo
Bisaro.
Buca sapor
ita.**

**Secūda pars
Mesenterij.**

**Ventriculus.
Stomachus.**

**Abaura cu
cucurbitula.**

portę ad Ventriculū/ad Splenē/& ad Omentum/hęc pars in porco est saporosi gustus/& vulgariter uocatur Dolce morfo & etiam Bisaro/& Buca saporita/in istis magnis glandulis continetur interdum materia causans egritudinem:quę uocatur melā colia mirachia.

¶ Alia pars huius mēbri est alligata aliis intestinis. Cuius pelli/culę sunt duplicatę:quia magna alligant mēbra dorso:et hęc secunda pars ab omnibus habetur pro uero Mesenterico/ista duo membra nutritur a uenis portę.

¶ Sua quantitas et figura apparent/prima est minor secūda/sua complexio est frigida: Colligantur dorso mediante Siphac.

¶ Iuuamēta corū sunt ligare intestina dorso:et substetare Venas meseraicas et alias Venas portę/et humectare feces intestinorū.

¶ Numero sunt duo mēbra etiam apud uulgares. possunt pati omne genus morbi:istud mēbrū seu mēbra debēt dimitti in suo loco usq; quo uisa sit Anatomia Venarum portę.

¶ De Ventriculo/qui cōmoniter dicitur Stomachus.

Xpedito mesenterico per duodenū supra relictū infla

c Ventriculū quātum potes:propter eius magnitudinem ultimam uidendam/deinde reduces ipsum ad inflatio/nem mediocrem:ut mellus uideantur in eo requisita.

¶ Et primo notabis eius locū: qui est in medio totius remotis extremis:et est imediate sub septo:trāuerso/a dextris habet Hepar:a sinistris Splenē/infra se intestinū Colum et alia intestina/ante Omētum et Abdomen/posterius Dorsum et cōtēta in eo/suus situs est obliquus sub diaphragmate dorso alligatus/pars eius superior est ī sinistro:ut cedat hepatis in dextro et ī alto locato:& ut ad os eius facilius uadat melācolia a splene/pars eius inferior est in dextro:ut cedat colo: qui ē in sinistro magnū occupans locū: est tñ sua pars inferior ī dextro uersus portanatiū minor q̄ in sinistro uersus Colon:ga ī dextro lecur occupat maiorē locū q̄ Colon in sinistro locatū:pars etiā eius inferior est ī dextro aliquantulum orificia sint directa:& ut cibus retineatur melius:et ut colera a Cysti facilius intret Duodenū cōtinuū parti ipsius inferiori.

¶ Sua substantia est neruea a p̄dominio/suus color patet:sua figura est rotunda arcualis ad modum maure cucurbitule:sua quantitas patet.

Colligantur cordi per Arterias/hepati et Spleni per uenas/cerebro per nervos descendētes/alligatur Ano p̄ intestina/et Oris mediante gula/alligatur Zirbo ante uersus/habet duas tunicas ueras/intrinsēcā magis nerueā propter appetitū: et magis grossam/rugosam & durā: q̄a obuiat cibariis duris/q̄ durior est in parte supiore & etiā magis sensibilis/habet extrinsēcā subtiliorē declinātē ad naturā pauce carnis/itrinsēca aliquomō nutrit seu uoluptuat a chilo/extrinsēca nutrit a Vena portę/itrinsēca habet uersus interiorius uillos lōgos attractioni seruīētes uersus exteriorius habet obliquos retinētes/extrinsēca hēt Villos latos expellētes.

CSurū fundum seruit digestiue mediante exteriori tunica: et mediante calore mēbrorū circūstantiū. Est tamen ei uirtus propria occulta digerendi: sicut Matrīci generādī: et hepatis sanguificādī: surū supius seruit appetitui adiuuante melācholia a Splene ad os eius emulgente: et propter hoc Reperitur sepe nigrum.

CHabet etiā Ventriculus tunicā cōmunē inuoluentē ipsū & alligantem dorso/ortā a peritoneo/grossiorē quocūq; alio membro in uentre inferiori cōtento: excepto Mesenterio ī quo est duplicata/et est talis in Ventriculo propter extensionem cibariorū.

CCorpus eius est alligatū dorso cum orificio suo superiore .s. inter. xii. & xiii. Sphondyliū dorsi: quod orificiū proprie dicitur Stomachus: et ibi ponitur medicīne pro confortatione appetitus: & hoc orificiū est in extremo inferiori Gulę seu Meri: quę perforādo diaphragma ascendendo cōtinuatur Oris extremo/ maxime sua interna tunica: et hoc orificiū clauditur a diaphragmate ne corporis inclinatione cibus facile redundet: Alligatur etiā dorso cū sua p̄teriori. s. cū pyloro alias pyloron/ seu portanario/ in loco ubi Duodenū a Mesenterio alligatur dorso/ reliquum uero ipsius est solutū et mouetur de facili undequaq;: Et portanariū est altius fundo cōtinente cibaria: ne cibus descendat indigestus.

CNumero est unum mēbrum: sua complexio ex parte componentium est frigida et sicca.

CSua iuuamenta sunt appetere/ Retinere: et cōcoquere cibū: et dare partem grossam intestinis/ benignā autem et digestam aliis membris: mediante Hepate.

CPassiones omnium modorū patitur: et propter eius magnum sensum ei compatitur cor et cerebrum.



Proprie stomachus.

Pylorus.
Pyloron.
Portanariū.

DE ANATOMIA

De Splene.

Splen.
Lien.

r Elicto Ventrículo in suo loco pro uenis portę uidendis Splenis seu Lienis anatomie est uacādū: et primo uide/ bis ipsum in hypochondrio sinistro situm: hętentem se/ cundum suum parū cōcauū Ventrículo: et secūdū gibbū cōti/ guū costis dorsum uersus et uersus latera: tectum peritoneo.



¶ Eleuabis tamen cadauer: ac si federet: ut melius uideas eius si/ tum/ qui est infra diaphragma/ imediate ī hypochōdrio: maxime in uiuo: in mortuo uero iacente/ uidetur esse sub costis: quia sua grauitas impellit diaphragma de facili ad superiora: quia pulmo est uacuuus et Rarus/ de facili cedēs: potes etiā aliquas costas mē/ dosas eleuare: ut melius uideas Splenis sitū: sic etiā facies in ana/ tomia hepatis: propter prędictā causam: Cōueniret etiā aliqua/ liter hic modus in demōstrādo stomachi sitū: qui etiā iacendo cadauere propter inanitionē pulmonis/ uidetur esse cū aliquallī sua supiori pte sub ossibus pectoris magisq̃ naturaliter sit ī uiuo.



¶ Figura sua ē quadrata aliqualliter lunata/ Rare substātię: colli/ gatur cordi per māgnas arterias (quas uidere debes) subtiliātes sanguinē grossum/ qui subtiliatus Splenē nutrit: hepati ligatur p ramū portę. Cerebro p neruos: Mesētereo & Omēto p Venas: & Siphac per pāniculū tegentem/ stomacho per plures Venas: aliq̃e quarū nutriūt sinistrum uentriculi: & una emulget ad os eiusdē melācholiā: quātitas sua est nota / sua cōplexio ponit cali/ da & humida: & propter contentū ponit opposita. Numero est unum mēbrū/ iuuat totum corpus expurgando massā sangui/ nariam a fece: & ideo Risum prouocat/ interdū sanguificat/ incl/ tat appetitum/ iuuat digestionē Stomachi/ omne genus morbi patitur: & in eo est aliquādo peculiare cursus & fortis motus im/ pedimentum: & traditur eo exempto per uulnus aialia interdū uiere: & sunt qui putāt sul magnitudine risum adimi: & intredū mutauit locum cum lecinore: sed prodigiose.

De Hepate siue lecinore.

Jecur.
Hepar.

u Iis prędictis cadauer ut supra paruit est eleuandum: ut hepar monstret suū situm / qui est imediate infra dia/ phragma in hipochrōdrio dextro/ in homine magnum: quia est animal calidū & humidū/ lunaris est figure: eius cōcauū est uersus uentriculū / gibbū uero est cōtiguū costis uersus dia /

phragma/superius tamen:& uersus latera et dorsum uersus.

In sua substantia est caro ipsius et Rete ex uenis contextum in ipso dispersis:sua caro est sanguis coagulatus/habet quinque lobos seu penulas/interdum quatuor et tres/interdum duas.

In concauo / est una Vena dicta porta : quę ipsum ingreditur cum quinque Ramis ad minima per totum uersus gibbum dispersis : ut chilus in eis ad minima diuisus / melius transmutetur in sanguinem.

In pcauo etiā ē cystis parua mūdās sanguinē a bili/siue a colera uel fele anteq̃ trāseat ad gibbū. Incōcauo etiā / in Vena portę ingreditur Vena umbilicalis adnutriendū fetum in utero matris.

In gibbo est una Vena chilis dicta / etiam cū quinque ramis ad minima per totū corpus eius dispersis / Minimi rami chilis coarctantur seu uniantur cū Ramis portę / et ab eis sugunt sanguinem depuratum a colera et a Melācholia:mixtum tamen aquo fitati:qui in gibbo ulteriorem acquirit decoctionem.

Hepar euēatur in parte eius gibba a septotrāuerso et a uena chilis per ipsum ascēdente ad Cor:per quā alligatur ei/habet etiā Arterias paruas in cōcauo eius:per quas euēatur:hę Arterię uniunt ab Aorta ibi propinqua cū difficultate uisibiles/alligatur Metaphreno per pāniculum suum suspēdentem : & Abdomini per Venam Umbilicalem/Cerebro per neruum/Mediante tamen pāniculo orto a peritoneo a quo circūuoluitur : Alligatur etiā omnibus membris habentibus Venam / sua complexio est calida et humida. Numero est unum / partes ipsius sunt propria caro: Vena portę et Vena chilis / Arterię: Neruus cum pāniculo: et Cystis cholere: Sua operatio est sanguificatio: Sua propria passio est hydrops: patitur tamen omne genus morbi.

De Vena portę.

Extra substantiā hepatis ē etiā uena portę: teste Gal. sic dicta a uiro uersuto circa naturam: et ab illo remansit nomen usq̃ nunc : quod Hyp. & totus cetus Asclepiadis laudauit/ quia portāt sui rami preelaboratum in Ventre cibum ad totius animalis digestionis locum:quem uocamus hepar.

Hęc Vena extra hepar habet octo partes: duę sunt paruę / sex maiores/ una ex minoribus habet duos ramos/ unus nutrit Duodenum: et alter Mesenterium: Duodeno contiguum.

Cystis parua

Vena umbilicalis.

Vena chilis.

Quomodo euēatur
tetur Depan.

Vena portę.

Vena porta
habet octo
partes.

DE ANATOMIA

- ¶ Alia Vena minor nutrit Ventrículum iuxta portanarium.
- ¶ Prima ex sex maioribus nutrit partem latā exteriorē uentriculi.
- ¶ Secūda cum aliquibus ramis uadit uersus Splenē: a qua pri-
mo unus Ramus uadit ad Mesentereon nutriendum: deinde
unus alter magnus ramus uadit ad Splenē: qui in uia in plu-
res diuiditur ramos/ quorum unus magnus nutrit sinistram par-
tem inferiorem uentriculi.
- ¶ Hic met Ramus sequitur ingrediens Splenē: & emittit a se
duos Ramos/ quorum unus ascendit/ alter descendit/ ascenden-
tis tres sunt partes: una pars nutrit Splenē/ alia nutrit superiorē
partem uentriculi: altera pars transit ad os eius emulgendero me-
lācholiam ponticā pro appetitu incitando: quē ut plurimum
egreditur cum fecibus per intestina.
- ¶ Vena p̄dicta descēdens bipartitur: unus Ramus nutrit Sple-
nē: alter uadit ad Omētum i parte sinistra & ipsum nutrit.
- ¶ Tertius ramus ex sex p̄dictis uadit a sinistris ad Rectum in
testinum suggendum.
- ¶ Quartus etiam ramus ex sex maioribus in capillares spargit
ramos/ quorū aliqui ad dextrā partem Ventriculi nutriendā ua-
dunt: & aliqui uadunt ad nutriendam partem dextram Omenti.
- ¶ Quintus ramus uadit ad Mesentereon i loco: ubi alligat colo-
iuno & ileo cū suis ramis: qui dicuntur Venę meseraicę: & hęc est
satis magna: Substātia harum Venarū est qualis aliarū: Sua quā-
titas/ & suus principalis numerus: et situs: et figura ac colligātia
patent: sua complexio est frigida et sicca/ sed ratione contenti est
calida et humida/ suum iuuamentum est p̄laboratū cibū duce-
re ad hepar: digestionem etiam secūdam inchoat cū suis ramis:
portat etiam nutrimentum Ventrículo: Spleni et Omento / et
intestina nutrit: passiones omnium modorū patitur: et p̄sentim
oppilatiōes et etiam apertionem suarum meseraicarū: et interdū
scissuras: et compatitur hepati in omnibus eius morbis.



Cystis bilis
fel.
Foliculus.
Saccus.

¶ De Cysti (continente coleram siue bilem)
quę a uulgaribus dicitur Fel.

Ystis bilis uel colerę Fel dicta/ est foliculus siue saccus i
cōcauo hepatis adhęrens penulę medianę eius: cōposi-
tus ex substantia pānculari: subtili: solida: carente san-

guine: unā solā hñs tunicā: tectā pāniculo tegēte hepar/ i ea sunt uilli omniū modorū: iterius hēt lōgos et obliquos: exterius latos:

¶ Sua substātia est subtilis: quia non digerit aliquid: et dura est ut resistat acuitati colerē / habet unū porum intrantem folliculum immediate (qui dicitur cōmunis) maiorem aliis/ qui secundum aliquos tripartitur/ et secūdam aliquos alios quatripartitur.

¶ Vnus uadit ad hepar continuatus cū Vena portē: a qua trahit colerā per angustas uias/ in isto poro sunt uilli longi tantum.

¶ Vnus alter porus uadit uersus ītestina: q̄ ē duplex in certa dī/ stātia/ cuius una ps uadit ad Duodenū uersus leiunū: ut mūdet ītestina a phlegmate & fecibus pp acuitatē colerē p eū trāsmisē: et iste porus ingredit̄ diagonaliter in duodeno iter tunicā et tu/ nicā eius: ne colera: et in ītestino cōtēta retrocedāt et oppilēt eū.

¶ Alius secūdam aliquos uadit ad pyluron Ventrīculi/ ad cōfor/ tandū digestiuam cum sua colera/ qui si est magnus/ facit homi/ nem infelicem propter continuū colerē uomitum: et istum po/ rum aliqui negant: per collum cōmune quod ab aliquibus po/ nitur pro quarto ramo/ sit attractio et expulsio.


¶ Sua quātitas et figura patet: Numero est unū mēbrū/ colliga/ tur cordi per Arteriam paruam quam habet: et cerebro per ner/ uum paruū/ complexio eius innata est frigida et sicca.

¶ Sua iuuamenta sunt expurgare sanguinem a colera: et calefa/ cere hepatis digestiuā: & ipsum a putrefactione seruare: confortat etiam Ventrīculum: & ipsum mundat a pituita: & iuuat expulsi/ uam intestinorū/ & interdum homo caret felle/ hic tamē est Va/ litudine infirma & breuioris uitē.

¶ Passiones omniū modorū pati: Sua propria passio est oppil/ tio: p quā causatur morbus regius seu Icteritia: et si est oppilatio in poro cōi: et corpus nō expurget a colera: tūc sūt ēgritudines colericę diuersorū modorū: feces tamen possunt esse coloratę.

¶ Si uero est oppilatio in collo tēdente ad ītestina et ad porta/ nariū: tūc feces sūt discoloratę: & ēt colera nō expurgat a Cysti/ sed regurgitat ad hepar: & cāt diuersas ēgritudines colericas.

¶ Et si in collo uersus hepar fiat oppilatio: feces poterūt esse co/ loratę aliquo tempore: et causabit etiam ēgritudines colericas di/ uersorum modorum: sed durante oppilatione feces erunt disco/ loratę cētera diximus in cōmento supra Mundinum.



Pyluron.

Oppilatio cy

¶ De magna Venâ chili: & Aorta descendentibus: & emulgentibus.

Isis prædictis abiciat Mesenterion: Splenem: et Hepar: de cuius parte gibbosa reserua illam partem: a qua immediate exit cānalis magnus Venę chilis: ut possis uidere eius ortum: reliquendo tamen Ventrīculum detumefactū in suo loco: ut deo eo uideantur etiam aliqua alia.

Parigibba.
Chilio.
Concaua.
Uenarū ma/
ter.

¶ Primo uidebis a gibbo hepatis exire Venā magnā: quę dicē parigibba: & chilis: & cōcaua: et uenarū materia qua ad oēs partes aīalis/mediātibus suis ramis dispēsať sanguis: cuius sunt cōceptacula: Hęc Vena est subtilis/porosa & lenis/non bitunicalis sicut Aorta Arteria/ne plurimū temporis cōtineat sanguinē: qui grossus est: sed ut cito mēbra nutriat: est etiā talis quia motu cāter: Arteria uero subtilem uehit sanguinē/qui ab aliquibus spiritus uitalis nominatur: hęc p̄tinue sistolat & diastolat/ideo dura grossa & cōpacta est ne rūpatur: & est talis/ut diu cōtineat subtile in ea cōtentum sanguinē: qui propter mortū resolutioni disponitur: Huius Venę pars superior ascēdit ad cor & ultra perforando diaphragma: quę uocat chilis ascēdēs: de qua suo loco dicē.

Chilio & Aorta
descēdētes.

¶ Hęc met Vena descendit dorso herens directa: & uocatur chilis descendens: quam concomitatur magna Arteria descendens Aorta uocata: quā cū diligentia uide simul cū Vena: Vena tamen est supra Arteriam/ & sunt ambę peritoneo intolutę.

fascia renū.

¶ In descēsu ab utraq; earū: primo diuidūtur Rami: qui uadunt ad fascias seu pāniculos Renū: cū uero sunt in directo Renum: Vena pariter & Arteria emittūt a se unū notabilem Ramum a dextris: aliū a sinistris: q̄ sunt Renibus cōtinui: hi Rami dicuntur emulgentes: ut plurimū dexter Ramus est altior sinistro: quia debet esse propinquus hepati: ut cito mundet ipsum ab aquositate in chill cōtenta: & sinister est dep̄sior: ut suus Ren cedat Spleni dep̄siori hepate: ista orificia nō sunt sibi directa: ut attrahat a propinquis primo: a lōginqs secūdo: & ne attractio sit se se ipediens.

Uene emul/
gentes.

¶ Ab ista Vena similiter & ab Arteria magna sub Renibus alię multę sepantur Venę et Arterię: quę Rectū/Velicā/Matricem et partes sibi uicinas nutriūt. s. q̄ indirecto cuiuslibet sphōdyli ab utraq; earū/ unus Ramus ipsum ingredit: & spargit in musculis sibi uicinis/ ex p̄dictis etia Rami itra quēlibet sphondylū: ingre



diſtut Ramī ſubtiliſſimi: qui Nucā: pāniculos: & ligamēta ſphon
dylos ipſam Nucam inuoluentes et ligantes cibant: ut in ipſorū
ſectiōe uidebis/ exp̄dictis etiā Ramis/ aliqui uadunt ad muſcu/
los et ad membranā Abdominis.

¶ Hęc Vena pariter & Arteria: circa os ſacrū Infra ſphondylos
Renū bifurcat i duas partes equales ad formā littere gr̄ce: quę
Lambda dicitur/ iſtas Arterias bifurcatas aliqui uocāt ſempiter/ *Lambda.*
nas: in quibus ingreditur duę Arterię Vmbilicales/ una quarū *Arterię ſem*
eſt a dextris/ alia a ſiniſtris: q̄ ad latera ueſicę in ipſas deſcendūt. *piternae.*

¶ Iſtę Arterię et uenę bifurcatę/ una a dextris alia a ſiniſtris uer/
ſus coxas deſcendendo: ſecundum aliquos in quolibet latere in
decem diuidūt partes/ quarū una nutrit inferius doſſi per lū/
bos uerſus Renes diſperſa/ intra et extra.

¶ Et una alia pars in capillares Ramos diuiſa nutrit peritoneon:

¶ Et una nutrit muſculos profundos coxę.

¶ Et una nutrit muſculos ani. & ab iſta oriūt uenę hemoroidales

¶ Et una nutrit collū et os matricis/ a qua etiā duo Ramī uadūt
ad Veſicā: unus ad fundū: alter ad collū ipſius: et qui ad collū: in
feminiſ parus eſt/ in uiriſ uero magnus propter uirgam.

¶ Et una alia de decem uadit ad partes pectiniſ.

¶ Et una alia tēdit ad muſculos lōgos Abdominiſ: cuius Ramī
aſcēdēdo cōtinuātur cū ueniſ pectoriſ deſcēdētibus uerſus ipſos: *Uene ad ma*
et iſti ſimul uniti tēdunt ad Mamillas: & ab iſto Ramo i ſoemina *millas.*

notabiles partes ēt uadūt ad matricē/ a quo duę Venę Arteriſ
nō associatę per abdomen uſq; ad Mamillas aſcēdunt/ per quas
ipſe alligātur matrici. Et ideo in p̄gnātibus et in tēpore retentio
niſ p̄ternaturaliſ menſtruorū: ut plurimum tument Māmę.

*Quare in pre
gnatibus tu/
meāt mame.*

¶ Et una alia ex decem uadit etiam ad matricem in ſoemina: in
Mare uero uadit ad uirgam et ad ſcrotum.

¶ Alia uero uadit ad uniuerſos muſculos coxę.

¶ Et alia pars/ q̄ decima eſt/ etiā ad coxā tēdit: et iſta ē notabiſſiſ:
et deſcēdit per iteriſ coxę: et cū eſt prope genu ſub poplite diui/
ditur i tres Ramos/ quorū unus obliquat uerſus exteriſ cruriſ:
et tēdit uſq; ad paruū pedē: et hic Ramus uocat ſciatica: q̄ula in
ipſius dolore inciſus cōfert/ et ortum iſtius Ramī non cognouit
Mūdinuſ/ unus alter ex tribus predictiſ deſcēdit per iteriſ uſq;
ad pedē: et hic uocat Saphena: Tertiuſ uero Ramuſ tenet me/

Sciatica.

Saphena.

dium inter predictos ramos / qui omnes cibant crus et pedem: et de istis fiet sermo in Anatomia magni pedis.

Plures uene
q̃ arterie et
pp̃ quid.

Aduerte tamen quod sunt plures uene q̃ Arterie: teste Gal. xvi. de utilitate partiu cap. xiii. & xliii. & teste sensu: & ratio est: ga sunt multa mēbra frigida naturaliter euēratione nō idigētia: quibus etiā sufficit paucus spiritus. Ideo nō habēt Arterias multas: & i manibus & i pedibus & i cerebro & in parte superficiali colli: & in cute totius sunt uene aliquę absq̃ Arteriis: Nulla tñ Arteria est sine uena sibi coniuge: aliquę quarū maxime notabiles / sunt alligatę simul per pāniculū orrū ab Arteria: & sunt simul unitę: ut firmētur & fortificētur Venę a pāniculo predicto: et ut Arteria uiuificet uenā: & q̃ uena det sanguinē arteriē i necessitatibus: de quo fit spiritus uitalis & nutrit ip̃a arteria: Arterię uero parue nō sunt ligatę cū uenis p pāniculū p̃dictū quāuis sint iuicē sotie: sed sunt sotie ut uiuificēt & nutriāt mēbra: teste Gal. ubi supra.



Et uene & arterie aporpingoribus locis uadunt ad sua mēbra cibāda / exceptis uenis et arteriis Testiū et Mamillarū: quę a re / motis uadūt ad ipsa: ut sanguis diu in eis moram trahat: per quā melius digeritur et facilius in bonū conuertitur sperma & in lac: et sunt multę arterie et uene sensu impceptibiles / ut quę ad ossa et ad cutem / et quę ad extrema mēbrorum tendunt.

Situs harū Venarū et arteriarū: & ē substantia & q̃titas & figura patēt. Sępē tñ uene mutāt sitū numerū et q̃titatē & iō authores de ip̃is sunt discordes: Numerus Ramorū ip̃arū i pceptibilis est: sua colligātia apparet ex dictis et dicēdis: sua iuuamēta sūt nutrire et uiuificare totū corpus / passiōes omniū modorū patiūtur.



Accidunt tñ eis mōrbi cōpositionales de sūma oppilationū / q̃ sūt deteriores oppilationibus nariū: & intestinorū: & similiū locorū: tñ q̃a sua oppilatio prohibet mēbra nutriri: nō pmltēs sanguinē ad ea fluere: tñ q̃a Regurgitare facit sanguinē ad hepar / q̃ facit in ip̃o oppilationē / uel putrefit / uel aliquas malas iducit egritudines: Sua etiā oppilatio ē mala / q̃a sępē est i cognita: & quia male eis applicātur medicinę / tam itra corpus q̃ extra: suę solutiones possunt esse a causa intrinseca et extrinseca / cuius tres sunt spēs: una cōiter dicitur dyabrosis / q̃ est uene corosio / a dya quod est de seu compositio & brosis seu rosis quod est comestio / alia spēs dicit Rixis / q̃ icisio iēptatur. Tertia dicit Anastomosis / quod

Dyabrosis.

Rixis.

Anastomosis

est idē quod apertio & dilatio uenarū: unde uersus Dyabrosis uenas corodit: Rijs eadē scindit: Anastomasis has apire facit.

Venis uero emulgentibus euenire pōt iter alios morbos debilitas attractiōis soliti sanguinis aquosi: Sicut ēt Renibus/quare aut nō attrahūt: aut debilitat/ & idē euenit difficultas uel totalis urinq̄ ablatio: etiā nō existēte urina in uesica/ in quo casu errant Rudes medici tentātes extrahere urinā cū Siringa: uel alia operatione manus de Vesica: & iste est casus singularis ut plurimū Inferēs mortem. Quem ego uidi pluries: & inter alios cū multis aliis honoratis medicis fui in cura Magnifici ac Illustris. D. Dñi Galeatii de nobili familia Palauicinorū: q̄ ab urinali aquositate i uenis totius aggregata suffocatus est: & hęc aquositas induxit ei squinatia: pro qua applicauimus uētofas sine scarificatione diuertendi causa: & uētofe p̄ poros cutis implebātur pura aquositate: hęc tamen incidēt scripsi ad iuuentū utilitatem et honorem.

De Renibus.

Amis emulgentibus predictis cōtinuantur duo corpora carnea: solida: pitoneo tecta: Renes seu Renones dicta:

Fuerunt. n. duo et nō unus: sicut Cystis colere & Splen: quia aquositas ē maior fece & spuma sanguinis: cui requirit unū magnū expurgatoriū uel duo parua: & non fuit unus Ren magnus/ ne coartaret et exprimeret intestina: & ne dorsum Redderetur in equale: & fuerūt duo/ ut si ledatur unius opatio alterius firma maneat: & fuere solidi: ut occurrāt multo cū paruo spatio: & ne sanguis exeat cū Vrina per aliquē eius porū: & ut nō attrahant nisi subtile suggendo ipsum: & ut resistāt acuitati Urinq̄: fue re etiā solidi: quia corpus spissū est fortius ad attrahendum.

Sua quantitas patet / sua figura est cōspicabilis: quē est similis grano faseoli legumini: sua complexio est calida: colligantur cerebro per nervos: mediātibus pāniculis inuolūtibus: hepati per Venas predictas: cordi per magnas Arterias: Notauit Gal. magnas Arterias in Renibus nō esse solū nutritionis & uiuificatiōis causa: cum Renes sint parua mēbra: quibus sufficebat parua Arteria: sed in eis sunt magnę Arterię: quia ipsę etiā mundant cor ab aquositate & colera: & dixit etiam: multotiens Aorta trahit a stomacho & ab intestinis sanguinem nō purum: immo chilum: quē emulgentes Arterię expurgant ad Renes.

C





Ego ipse etiā uidi Anno .1521. in studio nostro Bon. in anato/
mizato publice Arteriā unā ex emulgētibz facere unū porum
in parte dextra extra Renē/ qui in notabili distantia infra Renē
ingrediebatur porū uiridē a p̄dicto Rene ortū: & ambo p unū
cānale tendebāt ad uesicā. Hęc tamen etiā arteria emulgens in
grediebatur Renē in loco solito: & in isto indiuiduo Renes erāt
cōtinui ac si esset unus Ren: & habebat duas Venas & duas Ar
terias emulgentes: & duos poros uirides cū uno solo pāniculo
inuolvente/ qui occupabat loca solita Renū: & etiā mediū dorsi:
quod est in loco inter Splenem & hepar parum infra ea.

Dimittite ergo Renē sinistrū in loco suo propter uasa spmatica
uidēda: & scinde dextrū in eius cōcauo per mediū secūdū sui lon
gitudinē usq; ad eius centrū/ cōsiderādo locum Venę & arterię
magne ipsius: q̄ Renis substātiā in parte eius cōcaua ingreditū
tura qbus Ren trahit spiritū: & nutrimentū: et supfluitates aquo
sas totius corporis colere mixtas/ hęc omnia mixta per totā Re
nis substātiā licet solidā trāseunt/ quia sunt subtilia. Sanguis. n.
non trānsirer solus ad minimas partes Renū: quia solidi sunt: nisi
esset aquositati & colere mixtus/ quę omnia mixta assimilantur
loturę carnis a Renibus attractę per emulgentes ab hepate et a
corde chili Vena & Aorta Arteria mediante.

Porus uiri/
des cānalis
Uretra.

Hic sanguis multę aquositati mixtus solus retinet a Renibus
pro suo nutrimento: & aqua cū colera simul a sanguine defecata
trāsīt ad cerrā uacuitatē notabilē existētem in centro Renis: itaq;
ad lacunā/ quā fluuius seu cānalis porus uirides dictus eam du
cit ad uesicā: hic porus. Uretra a gręcis dictus: est corpus oblon
gum/ pāniculate/ solidū/ perforatū/ a corpore uesicę (quia ei assi
milatur ut fertur) ortū: & ad Renē terminatum/ quem cū caute
la cōsidera et cōserua simul cum Rene pro anatomia uesicę.



Lacuna i Re
nibus.

Et in Rene non est Rete nec aliud colatoriū pāniculare ut pu
tāt aliqui: sed Renes facti sunt organa cōcaua orificiis aliis quidē
attrahētia/ aliis autē emittētia subtilem aquosam superfluitatem.

Dicebat ergo Gal. 4. de utilita. c. xii. multi deniq; ebrionę apho
ras itegras bibētes & pportionale multitudinis potus mingētes
nō ipediūt circa discretionē/ sed paratissime & fallaciter sanguis
qui uenit ad concuam expurgatur a Renibus totus non tangē
tibus uenam. Prędicta lacuna habet circa se pāniculum solidum

perforatum ultra decem foraminibus magnis: per quę mediāte
certa Renis substantia parua similis papillis mamillarū mulierū
in prædicam concavitatem natura emulget urinam.

¶ Renum colligantia patet ex prædictis / colligantur etiam per
parvū nervū cerebro/mediante pāniculo eos tegente.

¶ Eorū iuvamenta sunt expurgate totū corpus ab aquositate su-
perflua & colera: Principaliter tamen hepar & cor: multa tamen
aquositas etiam remanet in aliis uenis cum sanguine mixta/quę
dicitur uehiculum nutritiū: quę apparet in sanguine phloboto
mato uel alia uia a corpore extracto.

Uehiculū nu-
trimenti.

¶ Patiūtur oē genus egritudinis/ q̄ fere oēs sunt difficilis sanatio
nis: sicut est diabetes. i. quasi cōtinuū urinq̄ stillicidium. Patiūtur
etiā debilitatē attractiue uirtutis/ qua mediāte urinā nō uadit ad
uesicā: & isto modo iterdū suffocatur animal uel alia uia perit: sit
etiā asclitū a tali debilitate. Patiunt̄ etiā lapides/arenas: & pilos:
sed pili generantur seu condensantur in poris uritidibus/ lapides
eius sunt rubei parui sepe oblongi in prædicta lacuna geniti: quā-
do Renes sunt debilitati nō potētes retinere sanguinem / urina
exit sanguinolēta: exit etiā talis: quādo hepar est debile nō discer-
nēs aquositatē a sanguineitate sepatiōe & q̄titate qua oportet.

¶ De Vasis Seminariis.

Stis expeditis in utroq̄ sexu. Primo notabis in uena ma-
gna chili & in Aorta arteria: iterdū supra Renes iterdū
infra: unā uenulā & unā arteriā: q̄ abo ad aliq̄ distātiā uni-
unt̄ se cōtangētes descēdēdo usq̄ ad Testiculos dextri lateris.

¶ Norabis etiam duo similia uasa simili modo descendētia &
unita in latere sinistro: ab emulgente uena sinistri Renis unum:
& aliud ab Arteria Aorta/ istę omnes uenulę & arterię sic descē-
dentes uocantur uasa spermatica preparātia: hęc mēbra sunt cir-
cūtectā a pāniculo orto a pitoneo: a Celso dictus Aegitroides:
superiacet uena: subiācet autem Arteria.

Uasa spermati-
ca preparātia.

¶ Ista uasa sunt latiora & duriora in mare q̄ in fœmina/ excepto
tēpore imp̄gnatiōis & mēstruorū: ut patet ad sensum pp multū
sanguinē tūc in eis retentū/ sed in aliis tēporibus ī mare sunt du-
riora & latiora: & etiā semp sunt lōgiora: q̄ ad longiorē distātiā
habēt ferre suū cōtentū: & sunt talia quia masculinū sperma est
plus & grossius fœmineo/ per quā etiā lōgitudinē uasorū maris:

C 11

DE ANATOMIA

ſuū ſperma eſt magis digeſtū: & ſperma dextrī lateris mares ge-
nerat: quia ſua materia eſt magis digeſta & mundificata ab aquo-
ſitate: ſiniſtri uero ſcēminas/ q̄a frigidū eſt et aquoſum: ab emul-
gentibus prædictis ſanguine aquoſo repletis ueniens.

¶ Hęc uafa in utroq; ſexu conueniunt in loco a quo: ſed diſcon-
ueniunt ad quem: Eorū terminatio in ſcēmina eſt intra corpus:
ut dicetur in anatomia matricis: quę poſtponitur anatomie Vir-
gę & Ani melioris ordinis gratia.

¶ Hęc uero uafa in mare deſcēdūt ab utroq; latere uſq; ad os pe-
ctinis in ſine lliorū ſupra Lumbos: & ideo uocātur etiā Lūbaria:
q̄ uafa ſupra os pectinis deſcēdēdo īgrediūtur ab utroq; latere in
unū uelamen pāniculare ab extremis Siphac pro pte orto: quod
dicitur cōiter Didimus & Cremasteras: & trāſeunt in ſcortū uſq;
prope teſtes: ut pōt uideri i uno ſolo latere relinquēdo aliud latuſ
in tactū pro Anatomia Didimi uidēda. Caue tamē ne deſtruas
ſcortū in aliquo latere: ſed trahe ad ſuperiora uerſus pectinē illud
uaſ ſolū quod uidere intēdis ſimul cū didimo ſuo & teſticulo.

¶ Hęc uafa deſcēdētia uſq; ppe Teſtes ſunt ualde dura: & ſunt ſi-
cut uarices reuoluta/ unde Variciformia uocantur/ q̄ cū obuiant
Teſtibus (circa quos reuoluſi) ne eos ſua duritie lēdāt efficiūt
mollia: & ibi hęc uafa uocāt Epydidima/ & Anēdor/ & Andros.

¶ Ab iſtis uafiſ īmediate trāſit materia ſpmatis ad Teſteſi ſub/
ſtātia quoq; acqrit albedinē & uirtutē generatiuā: & a Teſticuliſ
euomūt iterū ad p̄dicta uafa mollia Epydidima noīata/ a q̄bus
trāſit ad alia uafa īferiora iſtiſ cōtinua: q̄ uocātur deferētia: quoq;
ſubſtātia alba eſt: & aliis durior: hęc Vafa deferētia in mare aſcen-
dūt a teſtibus uſq; ad pectinē cū preparātibus prædictis deſcēdē/
tibus cōrīgata: q̄ deferētia ſic in ſupmo oſſis pectinis aſcenſa ab
utroq; latere ītra uētrē reflectūtur/ q̄ ſimul cū Teſticuliſ cū cau-
tella cōſerua: uſq; quo uidīſti anatomia Didimorū & etiā teſtiū.

¶ Hęc uafa intra uentrem reflexa deſcendunt inter Rectum &
Veſicam: & ibidem ſe diſtāt in plures cauernas ſpermate ple-
na: ideo ibidem hęc uafa uocātur cōſeruantia & deferētia ſper-
ma: & a Gal. duce Eraclēo dicūtur paraſtrata adeniformia/ quia
ipſa circūdat adenoſa caro.

¶ Adextris & a ſiniſtriſ hęc uafa collū neſicę pforāt: & īter Virgā
circa Anū euomūt ſpma/ qđ poſtea extra pellīſ p cānale uirgę.

Lumbaria.

Didimus.
Cremasteras.



Variciformia
uafa.
Epydidima.
Anēdor.
Andros.

Vafa deferen-
tia.

Vafa cōſeruā-
tia & deferen-
tia & paraſtra-
ta adenifor-
mia.

¶ De Didimis.

Aec uasa simul cū Testiculis a fundo scorti usq; ad imū
Ilior; in quolibet latere inuoluuntur uno pānculo/cuius
 maior pars orta est a pitoneo/i fine Abdominis in scor
 to descēdente/quī cōiter dicī Didimus et suspētorū Testiculi:
 grēcis dicī Cremasteras:substātiā cuius cōsidera:q̄ est ex tribus
 & forte secūdū aliquos ex quatuor pānculor; reuolutionibus.

Didimus su
 spensorū test
 culi.
 Cremasteras.

¶ Prima est exterior orta a pānculis spondylorū: alia est orta a
 Siphac: seu peritoneo iuxta semur intra Abdomen cōtento: quē
 Darion a Celso dicitur.



Darion.

¶ Ex istis duabus pp suā fortē colligātiā sit q̄si una pellicula sola.

¶ Alia est ex pānculo imēdiate inuolvente uasa p̄dicta a pe
 ritoneo circa dorsum orta/quē dicitur Aegitroides.

Aegitroides.

¶ Alia est ex cordis musculorū testiculorū: quē exigua est.

¶ Considera etiam quantitatem & colligātiā: complexionem
 & numerum. Figuram habent Cystis: in superiori strictam: in fun
 do latam quantum est grossities Testium.

¶ Iuuamēta sunt suspendere testes & manutene re uasa p̄dicta.

¶ De Scorto: quod aliqui scrotū uocāt.

X istis pānculis & cute cōponitur oscheum seu scrotū. i.
 e bursa testium In qua sunt aliqui nerui sensum ei dātes:
 & aliq; arteriē & uenē illud nutriētes: et scortum a Cel
 so scrotum dictum est unum mēbrū duobus Didimis cōmune:
 et est sinus seu camera Didimis Testibus et seminariis uasis.

Oscheum.
 Scortum.
 Bursa testiu.

¶ Hoc mēbrum est per medium diuisum a leui mēbrana / quē
 ab aliquibus dicitur futura: et taurū: et corda: quē etiā aliquāliter
 apparet in cute exteriori i medio scorti faciēs quādā rugā secūdū
 lōgū corporis: huius mēbri quātitas: figura: situs: numerus: & col
 ligātiā patēt. Sua cōplexio ē frigida & sicca. iuuamēta eius patēt.

¶ Hoc mēbrū cum didimis omne genus morbi patit. Sua pro
 pria passio est dilatatio eorū / qua mediāte multē sunt Ramices
 herniē dicte. i. Zirbalis: Omentalis dicta: alia intestinalis: i scorto
 etiā fit hernia siue hyrnea aquosa: uentosa: humoralis: et carnosā:
 et etiam uaricosa / quē fit per repletionem uasorum seminalium
 factam a sanguine grosso / seu multo et aquoso.

Ramex.
 hernia.
 hyrnea.

¶ De Testiculis.

I Ntra p̄dicta suspensoria ab utroq; latere sunt duo mē

C III

Testiculi.
Oua.



bra glandosa alba similia carni mamillarū / quę uocātur Testicu-
li: quorū figura est Oualis: et ideo etiam Oua dicuntur: caret sua
substantia sanguine et omni sensu: Sentit tamen per suos pānicu-
los: eorū quilibet habet duos musculos pāniculis suis herentes: ut
ipso custodiant et eos eleuent ne laxentur.

¶ Sua quātitas / suus numerus: et situs patent: sua cōplexio inata
est tēpara i actiuis: i passiuis humida. Influxus tñ ē calida / quā me-
diāte teste Arist. trahūt a toto ad se materiā spermatis sicut ueto-
sa: et a medicis ponūtur iter mēbra picipalia: colligātur aliis mē-
bris principalibus / p uenas / p arterias et p pāniculos: sua iuuamē-
ta sunt cōseruare spēm. Passiōes omniū modorū patiūtur.

¶ De Vesica.

Stis expeditis eleua Renes cū poris unidibus a uesica
ortis: itra tunicā eius magis uersus collū q̄ fundū igrediē-
tibus dyagonaliter: ne urina regurgitet ad eos / per istos
poros iterdū trāsit ad uesicā lapillus i Renibus genitus: in eis ex-
tensionē faciens cū intēso dolore / quia sunt neruei ut uesica.

¶ Scinde primo corpus uesicę circa fundū eius / quod est unica
tunica cōpositū / in parte cuius exteriori uadūt duo nerui p fen-
su ipsius: Primo notādo eius sitū / qui est in inferiori parte uētris
in cōcauitate Aqualiculi / in qua est etiā Rectū intestinū dorsum
uersus et matrix in eorum medio / in fœmina.

¶ Notabis etiā suā colligantiā: et quātitatē: et figurā: et nume-
rū: substantia cuius est neruea ex neruis ligamenti / incōsolidabilis
si soluat / in collo carnea est: et ideo ibi cōsolidatur / suū collū ē
uirgē unitū per totū usq̄ ad extremū glandis / unde exit urina:

¶ Sua cōplexio ē frigida & sicca: est circūuoluta uno pāniculo a
peritoneo orto. sua iuuamēta sunt diu retinere urinā ne cōtinue
homo surgat ad eā emittendā: sed quasi cōtinue fluit a Renibus
ad ipsam / suā retentionē iuuāt certę carnes glādose picipiū sul-
coli extra inuoluētes & comprimētes / causantes in ipso collo an-
fractus aliquos / propter quos uesica nō mūdatur ab aquositate
integre / & suā retentionē uolūtariā & ēt expulsionē iuuat unus
solus uesicę musculus os eius inuoluens.

¶ Passiōes omniū modorū pōt pati uesica / q̄ sunt interdū icu-
rabiles / sicut est pre grandis lapidis: & excoriatio in corpe colerico
& in senē. Sua etiam notabilis Solutio est letalis

Aqualiculus.

¶ De Virga

Post p̄dicta mēbra occurrit Virga/ q̄ est de substātia liga-
mentali: neruosa etiam & cauernosa est ut spongia cum
aliquibus tamē musculis/hēt Virga pariter & Lingua plu-
res & maiores Venas & Arterias q̄ aliud mēbrum sibi simile in
magnitudine/ per p̄dictas porositates duce imaginatiua. Vir-
ga sola sepe a spiritu magnificatur & erigitur. In ea .n. est uirtus
naturalis: per quam cū animal mouetur ad coitū inflatur et dila-
tatur: sicut fit naturaliter motus in corde et in Arteriis/ in his au-
tem fit semper propter necessitatē: in hoc uero aliquādo/ & sepe
Inutilis ē: sua origo & situs ē ex p̄te pectinis i medio oībus nota.

¶ Sua figura est oblonga rotunda/ habēs in se cānale: per quod
exit Vrina & sperma/ summa pars eius Glans & caput Virgē di-
cta est: & ibi est cōpacta/ dura/ & obtusi sensus ne i coitibus lēda-
tur. Istam glandem circūdat certa pellis mollis: quē dicitur Prē-
putium obediens reuersioni in omni confricatione.

¶ Hoc prēputiū in parte inferiori i medio tantū per longū alli-
gatur maiori parti glādis per certū pelliculate mēbrum a uulga-
ribus dictum el filello. Numerus & etiā quāritas eius patēt. Sua
cōplexio inata per influētē est calida & humida: colligatur cū
osse pectinis: cū Adenosis parastatis: cū uesica mediante cānali
extra riuante urinā/ com Cerebro mediātibus neruis ad muscu-
los & ad cutim eius uenientibus: cū corde & hepate mediātibus
Arteriis & Venis descendētibz p̄dictis.

¶ Virga hēt i se tria foramina: unū latū quod ē cōe sp̄mati & uri-
nē: & duo parua: p̄ q̄ in isto cōi igredit̄ sp̄ma a uasis seminariis āte-
dictis ueniēs: ista duo orificia seu uasa igrediūt hoc cānale i loco
dicto pineō/ q̄ i mare ē locus iter Anū & radicē uirgē: & i semina-
est iter Anū & fissurā colli matricis ab istis foraminibus ad uesicā
secūdū ueritatē istud cānale dicit̄ collū uesicē: ab hinc usq; ad ex-
tremū glādis/ dicit̄ foramen cōe & cānale uirgē: & ab aliquibus dī-

¶ Habet ē Virga quatuor musculos: duos uersus suū (Vretra.
iferus: ab utraq; p̄te unū iuxta cānale urinē: qui secūdū lōgitudi-
nem extensi sunt & dilatant Virgā & illam eleuant: ut sperma p̄
ipsam cū facilitate penetret. Duo sunt alii eius Musculi a radice
ipsius uersus os pectinis orti: ueniēs trāsuerſi uersus glandem
in parte eius sup̄iori: q̄ cū tēdūtur: Virga eleuatur: & cū cessant a



Glans.
Caput virgæ
Præputiū.

Filello.

Perineon.

Foramē cōe.
Canale virgæ
Vretra.

tenfione deprimitur / q̄ si uni accidit tenfio & alteri non / uirga declinabit ad partem Musculi tenfi.

Aggr nature

¶ Utilitas Virgæ est facta principaliter pro conseruatione sp̄s. Ipsa.n. mediâte mittit sperma in Agro nature .s. in Matrice: quæ si est moderatæ quantitatis, sicut & lingua laudatur & utilis est. Ipsius.n. breuitas nō ducit sp̄ma ad locū debitū: & sua nimia longitudo est causa resolutionis spiritus in spermate.

¶ Virga etiam per colligantiam suam euacuat uesicam ab urina cuius signum est q̄ pediculus orificio eius extremo applicitus mordicando prouocat eam.

¶ Luuamenta preputii & pellicule prædictæ alligantis eum glandi sunt prebere aliq̄ delectationem in coitu: & tueri glandem a nocumētis extrinsecis. Istud preputium eiciūt hebrei in circumcisionibus: operantes contra intentum nature. Passiones omnium modorum patitur uirga. sua propria passio est priapismus.

¶ Ad istā anatomīā bene uidendā prius notatis antedictis & notato situ Recti intestini: scalpro / falce / uel ferra / uel alio ingenio separa os pectinis a sua pte laterali: & simul cū osse separa notabile partē cluniū. s. illā in qua sunt musculi Ani: & eleua Rectū: uesicā: & uirgā cū uasis seminariis & poris uritidibus prædictis: & pone prædicta mēbra prius lora & mūda a stercore & sanguineitate in eis cōtenta supra aliquā tabulā: ut prædicta melius uideas a prædictis mēbris cum diligentia solum os pectinis abiscendo.

¶ Et primo notabis locum pororū uritidorū prædictorū uesicam ingredientium: in eis ponēdo specillum seu radium uel aliquod tale: & uidebis penetrare eum diagonaliter per substantiam corporis uesicæ in suam concauitatem: ut prædictum est.

¶ Istis uisibilibus uidebis etiā uasa seminaria prædicta inter rectum & uesicam ingredi: & cum incisorio aliquo cum cautela separa rectū a uesica / quia in loco isto hæc membra sunt firmissime alligata: & uidebis prædicta parastata cauernosa & lata: & ea incidendo uidebis sperma ibidē contentum pro duobus uel pluribus coitibus: & hæc uasa terminantur in cānali uirgæ.

¶ Et circa istum locum uidebis carnem glandosam notabilem ad latera colli uesicæ / quæ aliquantulum digerit & dealbat sperma ibidem contentum / uel saltem conseruat ne exsicceat: conseruādo etiam in eo spiritum genitium.



Tenent etiam istę carnes ne collum uesicę exsicceetur & etiam uirga : quę prę sua longitudine extra pendens exsiccati & claudi apta est : & propter hoc ista carne carent foemine. Iste etiam carnes cum sua aliquali unctuositate resistunt acuitati urinae.

Istis notatis potes scindere uirgam p lōgum : & uidebis cānale predictum cum orificiis : p que ingreditur sperma / que sunt duo unum a dextris / aliud a sinistris nō multum distantes a concauitate uesicę : uidebis etiam corpus uirgę cauernosum uel porosum ad instar spongię nō multum cauernosę sed cōpacte aliqualer.

De Recto .

Oratīs p̄dictis debes reminisci de loco intestini Recti su Rectum.
pra dimissi p anatomia Anis : quod considerabis esse i cōcauitate Aq̄liculi & terminatur itra Nates i loco dicto

Anus. a quo exēit extremēta primę digestionis ordine naturali. Anus.
Eius pars sup̄ma tendit ad sinistrum ubi itestino colo alligatur. Situs Recti intestini.

Cōsiderabis et suā q̄titatē q̄ patet : & suā figurā : fitū / & numeꝝ uidisti supra : colligatiā hēt cū corde : cū hepate & cerebro : cū uelica in mare / cum Matrice in foemina.

Cōsidera etiam eius cōplexionē / quę est frigida . Ideo est intranates ne lēdatur a frigore .

Deinde seca ipsum per lōgum : & optime lauādo : notabis eius inuersionem / quę est ab exteriori interiorius ascēdens per quatuor digitos uel circa. Videbis . n. sēpe terminū suę iuerfiois : & interdū nō uidebis : hęc iuerfio mūdāt ipsum a fece / q̄a egerendo rectum aliqualer descēdit : & hoc optime uidetur i equis egerētibus.

Extrimitas eius inferior dicitur Anus & podex & Sphicter : Anus.
& alia multa habet nomina a me recitata in cōmentariis super Podex.
Anatomia Mundini. Sphicter.

Sua substantia est carnea et pāniculosa / quę cum musculis redditur magis carnosa / in eo est aliqua pinguedo extra uersus / i eo sunt uilli multi lati & longi / pauci obliqui . longi sunt extra & intra / luuantes expulsionem inferiorius trahendo.

In eo sunt quatuor musculi : unus est in orificio eius extremo : cuti mixto cū ipso p totū dispersus : qui cōstringit Anum unde / quaq̄ quo fit ut stercorea integre ab eo mūdētur : est alter musculus magis itra / uersus caput hominis eleuatus / qui habet duo capita et hic cōtinuatur cū radice uirgę : huius utilitas est extremū



*Causa precipi-
tationis recti.*



*Cōdylomata
Tubercula.
Ficus.
Fungi.
Mariscæ.
Ragadas.
Ragadiæ.*

*Vulua.
Matrix.*



*Cervix.
Collum.
Uterus.
Venter.
Receptaculū.
Fissura.
Pudēdū mu-
liebre vulua
Os genitale.*

Ani arcuare: post istos ē unū musculorū par supra alios trāsuerſa-
liter tēdēs: cuius iuuamētū est rectū sursum eleuare/quo mollifi-
cato sit Recti precipitatio extra inter Nates/ ad certā distātiā.

In extremitate huius intestini apparent plures uenę/ in aliqui-
bus notabiles: in aliqbus occultę/ quę dicuntur mariscę & Aemor-
roidales/ paroxysmaliter fluentes/ quas considera.

Istę Venę oriuntur a Ramis Venę chilis descēdentis qui mu-
sculos Ani nutriunt: multi eorum profluuiū/ uice purgationis
utuntur: nec talde debiles ob id fiunt.

Iuuamēta Ani sunt educere stercore hora debita: sui musculi
iuuāt parastata ī emissioe spmatis ī coitu: cuius signū ē q̄ sūt aliq
coeūtes simul & egerētes: iuuāt etiā uesicā in emissione Vrinę.

Passiones omniū modorū patit Anus/ q̄ oēs sunt difficilis sana-
tiōis: & iter alias/ Recti extremitas sicut & matrix procidit/ quā
stipticis retro ducimus. Cōdylomata etiā seu Tubercula q̄dam:
ficus & etiā fungi īnascūt: Marisca itē & Ragadas seu Ragadię:
q̄ ex īflamatiōe oriri solēt. Hos tñ morbos iterdū lasciua luxurię
peccitasti: & extuās libido ī utroq; sexu diuerticula q̄ritando: ne-
glecta natura/ nō sine ipsius & maiestatis diuine iniuria facit.

De Matrice nō p̄gante.

His mēbris in mare in uētre īferiori cōtentis/ ad foeminā
anatomizādā trāseo: in qua uidēda est anatomia matri-
cis. Suorū Testiū cū uasis seminariis et sua uesica.

Matrix q̄ ē Vulua dicit̄ duas habet ptes. s. Receptaculū: seu
sinū/ uel cōcauitatē: & ceruicē seu collū: & ē mebrū ad propaga-
tionem a natura genitū: substantia sui Receptaculi est neruea/ ex
neruis ligamenti & carne cōfusa mixta: ideo parū sentit: et unica
tunica est cōposita/ circūuoluta peritoneo: et est Neruea: ut ex-
tendatur in coitibus: & ut aggreget apud quantitātē paruam in
partu. Tota etiā sua cōcauitas mouetur ad centrū in acceptione
spermatis: & illud amplectitur et tangit cum suis lateribus.

Substantia uero suę ceruicis seu colli est lacertose carnis: qua/
si chartilaginea cū aliquali pinguedine hñs Rugā supra Rugā:
q̄ dāt delectationē ī cōfricādo ī coitibus. Hęc ps ē satis sensibilis.

Sua cōcauitas dicitur Vterus: Venter: et Receptaculū foetus:
fissura quę est in orificio ceruicis dicitur pudendum muliebri &
vulua: & natura: & os genitale.

In hac ceruice locatur uirga in coitibus.

Inter ceruicem et receptaculū intrinsecus est certa substantia pellicularis carnea satis sensibilis: in medio perforata: dilatabilis et cōstringibilis: os matricis dicta, formā habens capitis mugili: *Os matricis alias Cephalis: siue Tence piscis: seu Cati nouiter nati: quę in coitibus & partibus et in menstruis aperitur ordine nature: in aliis uero temporibus maxime cum pregnans est: sic clauditur ut nec subtilis Acus eam ingredi posset nisi uiolenter.* *ma.*

Ceruicis figura est Oblonga: Rotūda: cōcaua: inuoluta tanta est quāta est uirga secum coeuntis: in uirgine uero est minor.

Huic circa eius mediū est pāniculus uirginalis dictus: ut Rete cōtextus ligamētis subtilibus et pluribus Venis: quo uiolata ca ret: quia rumpitur in primo coitu cum mare: hic pāniculus uocatur Eugion et Cento et Imen. *Pāniculus uirginalis. Eugion. Cento. Imen.*

Exremo ceruicis Additę sūt a laterib⁹ pelliculę: q̄ pputia dñr. *Præputia.*

Intra ceruicem parum uersus os pectinis ingreditur collum uesicę breue: cuius orificium clauditur a certis paruis additamentis carneis et pānicularibus: a quibus et a præputiis antedictis mediante aere fit intermigendum aliquis strepitus. *Singēdo fit strepitus in muliere.*

Figura receptaculi est quadrangularis cum aliquali rotunditate: inferius concava sicut Vesica.

Receptaculo uersus ceruicem est ab utroq; latere unū additamentum ligamentale dorso uersus anchas alligatum cornu lima cę formam habens. Ideo cornua matricis hęc dicta sunt. *Cornua.*

Circa hęc cornua utrinq; est unus Testiculus durior et minor q̄ in mare nō perfecte rotundus: sed ut amigdala compressus: in eis generatur sperma: nō grossum ut in mare: nec calidum: sed aquosum tenue et frigidum. *Testiculi mulierum.*

Isti Testes nō habent unicum pāniculum in quo ambo contineantur sicut est scortū in mare: sed quilibet habet propriū pāniculum ortum a peritoneo eos circa cornua alligantes: quilibet eorum habet unum Musculum paruum a quo mouetur.

Istis Testibus implantantur Vasa seminaia prædicta: quę a Vasa pparāchili et ab Aorta et ab emulgentibus descendunt dicta præparātia: inde alia uasa deportantia nominata: continue se dilatando usq; ad receptaculum ubi ceruici unitur tendūt: et intra Matricis concauitatem circa os ipsius sperma ducunt. *Vasa pparātia & deportātia.*

DE ANATOMIA

**Fossule.
Cotilidones.**

¶ Horū Vāforū plurima orificia fossulę & cotilidones dicuntur / per ea fluūt mēstrua / ab eis foetus haurit nutrimentū per Venas & Arterias Vmbilicales fossulis p̄dictis alligatas.

¶ In foemina non sunt parastata uasa / nec epididimū uas / quia in foemina uasa mollia sunt nō ledentia Testes. sicut in mare propter eorum duritiem.

¶ Matrix tota cum suis Testiculis et uasis seminariis est similis mēbris generationis uirorum: sed membra uirorum sunt completa extra propter suū calorem expulsa: foeminarū uero sunt diminuta intra retenta propter suum diminutum calorem.

**Matrix ē mē
brū cōuersū.**

¶ Et matrix est quasi cōuersum Instrumentum. Collum. n. matri-
cis est quasi ulga: et eius receptaculū cum testiculis et uasis ē
sicut scortum. Scorto. n. inuerso intra ipsum est cōcultas: et ex-
tra ipso etiā inuerso lacent testes et uasa seminaria: sicut recepta-
culo matricis: Virorū tamen testes et uasa sunt maiora.

Perineon.

¶ Situs fissurę matricis est inter Anū et os pectinis: et locus qui
est inter utraq; orificia perineon dicitur.

¶ Ceruix a fissura per uentrem supra ascendit usq; ad receptacu-
lum: cuius locus est inter Rectum et Vesicam. Hęc omnia sunt
in concauitate Aqualiculi per longum sita.

¶ Receptaculi quātitas in puellis exigua est: et minor sua uesica:
nec completur sua concauitas nisi cum cōplemento augmenti
corporis: cuius est / in adultis uero (nisi grauida sit) est nō multo
maior q̄ manu cōphendatur. Crescit tamen propter mēstruas:
parietes quasi carnosos / dēfos et grossos habēs / in p̄gnante uero
est maxime dilatata et subtilis magis neruea apparēs: et tūc ascē-
dit uersus Vmbilicū plus & minus secūdu foetus quātitatem.

**Tantum due
cellulae.**

¶ Vnicam concauitatem seu cellulam habet: quę tamen aliqua-
liter circa eius fundum in binas partitur: ac si essent due matricēs
ad unum collum terminatę.

¶ In pte eius dextra ut plurimū alligāt mares / i sinistra foemine.

¶ Colligatur cerebro per neruos / cordi per Arterias: hepati et
mamillis per Venas / Recto Intestino per pāniculos / Vesicę per
collū eius: quod est breue nō penetrans extra sicut in mare: an-
chis p cornua: sed a cornibus supra: Receptaculū est undequaq;
solutum: & ideo p̄cipitat ad latera: et interdū suū receptaculū
exit totaliter extra corpus per collum seu ceruicem ipsius.



Numerus eius patet: & forte nō errat qui dicit esse duas ma-^{forte duae} trices / quia sunt duę cōcauitates: ut duę manus cōcauę se inuicē ^{albatrices.} tangentes unco pāniculo coopertę ad unū cānale terminatę.

Et ut aliquāliter tibi satisfacias de sua figura: loco: & situ: uide / as infrascriptas figuras imēdiate sequentes / ad quas uidēdas nō ueniat qui non est ingeniosus & expertus in lineis & umbra / seu in pīctura / quę multū iuuat medicos & alios multos artifices. Cōplexio matricis innata actuata per influentem est calida & humida. Sua iuuamēta sunt expurgare corpus a superfluitate sanguinea naturali: conseruare tamen principaliter speciem.

Potest pati omne genus morbi / sēpe procidit: & tota potest extrahi a corpore durante ualitudine: unā Matricem corruptā ego uidi extrahi integre in terra Carpi a genitore meo: quę sanata est & diu uixit.

Ego etiam Bononię extraxi unā aliam integre: quę erat crenata Anno. M.D. VII. de mense Maii / quę superuixit sana.


Unā aliā. s. matricis receptaculū pīcipitatum extra uentrem & corruptum: me pīesente nepos meus ex fratre Damianus extraxit integre in cētū doctorū & multorū scholasticorū Anno dñi M.D. XX. die. V. Octobris. Ista ultima nomine Gentilis: erat uxor Christophori Brianti de Mediolaño / habitatoris Bon. in cōtrata dicta lo inferno / quę hora ista. 1523. decima lunii est sana: & exercet negotia familiaria: & relatu ipsius & sui mariti in coitu emittit semē & hēt mēstrua tēporibus debitis res notatu digna.

Si maiora queris uide cōmentaria mea supra anatomīā Mundi: & ibi habebis de matrice pīegante & aliā multa / & hęc sufficiant de Anatomīa Ventrī inferioris.



Habes hic
 optimā figu-
 ram matricis
 cū suis corni-
 bus anclis al-
 ligata infra q̄
 sunt testiculi i
 suo loco na-
 turali alligati
 vasis semina-
 rijs q̄ vasa ter-
 minantur ad
 corpus matri-
 cis vt vides: &
 oriūtur supra
 matricē circa
 regione renūz
 ab emulgente
 & avena chili:
 vt supra dictū
 est: & hec ma-
 trix est figura
 ta magna ac
 fieset p̄gnās
 in parte cuius
 anteriori natu-
 ra locuit ve-
 sica: cum suis
 poris vitidi-
 bus: & collum
 vesicae termi-
 natur in collo
 matricis parū
 supra fissurā
 q̄ dicitur vul-
 ua: haec tamē
 melius viden-
 tur anatomi-
 zando foemi-
 nā p̄gnantem
 & etiam nō p̄-
 gnantem.





habes in hac
figura tres ali
as matrices/
quarū q̄ est in
medio inuēta
est / i qua in to
to receptacu
to sunt circuli
parui indican
tes capita seu
ora venarū / q̄
cotyledones
vocat / & vi
des quater col
lū ipsius ali
mutas virgae
virili. In alijs
figuris nō in
uenis videre
potes matri
cis naturales
figurā cū suis
testiculis & va
sis seminarijs
simul & liga
mentis cornua
libus quibus
alligat achis
vides et ipsi
collū & os per
q̄ exeunt mē
strua & foetus
& ingredis vi
rile semen in
fundo matri
cis ē certa car
nositas ver
sus os ipsius
elevatione / qua
mediante fit ali
qua distinctio
sinus dextri a
sinistro / nec in
matrice repit
alia diuisio
nec alie cellule
vt putat aliq.

DE ANATOMIA

De Anatomia Ventris medii

¶ **I**sis prædictis scinde Vētre mediū / in quo sunt mēbra uitalia: cū quibus etiā anteq̃ uēter sup̃mus anatomizet̃ melioris ordinis gratia uideb̃s aliqua mēbra partis anterioris colli: & aliquas faciei partes intrinsecas et extrinsecas.

Pectus.
Cassus.
Clibanum.
Thorax.

¶ **P**artes primo uidendę sunt membra Pectoris / quod Cassus: Clibanum & ab aliquibus Thorax dicitur. In eo enim sunt partes continentēs & contentę.

¶ **E**t continentium sicut in Ventre inferiori / alię sunt cōmunes: alię proprię: & alię magis proprię.

¶ **P**artes cōmunes sunt omnes partes circūdantes pectoris uacuum / quarum alię sunt ante / alię a lateribus / alię posterius.

¶ **I**n isto tamen uētre / neq̃ in uētre naturaliū mēbrorū / ponūtur partes superiores / neq̃ inferiores eis determinatę: sicut in uentre sup̃mo: quia partes anteriores laterales & posteriores in uētre naturaliū mēbrorū uniūtur: & faciunt partem eius inferiorem: & pariter faciūt huius uētris superiorē partem. Hic. n. in eius sup̃mo: ille uero in suo infimo loco terminat̃ quasi ī pūcto: & a prædictis partibus hic supra: & illę infra circūdatur. Septū autē trāsuersum seu diaphragma mediat īter istos / & facit partē sup̃mā inferioris uentris / & inferiorē superioris: sed quia septū trāsuersum est ambobus uentribus cōmune: ideo nō ponit̃ proprię & determinate pro aliqua parte cōtinente prædictorū uentriū: sed auctores ponūt ipsum īter partes cōtētas. Est tñ pars cōtēta & cōtinēs: & cōtēta dicit̃ / inquātū est intra corporis uacuitatē: & cōtinens est: quia a sup̃iori cōtinet mēbra naturalia: & ab inferiori uitalia.



Summū dorsi
mediū dorsi.

¶ **D**ico ergo q̃ pars cōmunis anterior & lateralis mediū uentris dicitur Pectus: pars uero posterior dicitur summū dorsi: & ponētes collū indorso hāc partē mediā uentris noīant mediū dorsi.

¶ **P**artes uero proprię / alię etiā sunt ante / alię a lateribus & alię posterius / quę sunt ante / cōmuniter ponūtur tres. s. superior: inferior: & media.

Furcula superior.
Jugulum.
Clauis.

¶ **S**uperior est locus ubi immediate sub collo cōiunguntur duo ossa utrinq̃ lateraliter tendētia uersus humeros / dictę duę furculę laterales: & hęc pars uocatur furcula superior / suscipēs nomen a figurā & loco / paruū occupans locū / maxime in pectoris longitudine: & hic locus ab aliquibus dicitur jugulum & clauis.

- ¶** Subiſta immediate eſt pars media / noīe proprie Pectus / ſic di-
cta / q̄a pexa eſt inter emiñētes mamillaz partes: & hęc pars eſt a
prima p̄dicta pte infra uſq; prope ſeptūtrāſuerſum p longū: in la-
tū uero eſt tāta / quāta eſt latitudo oſſiū pectoris / coſtis exceptis.
- ¶** Inferior uero pars / eſt locus ubi p̄dicta oſſa pectoris terminan-
tur circa regionem ſeptitrāſuerſi: & quia talia oſſa lateraliter ten-
dunt furculā etiā faciētes: ideo hic locus dicitur furcula inferior: *Furcula Inferi*
in medio cuius eſt carthilago ſcutalis: dicta pomū granatū: quia *oz.*
aſſimilatur parti balauſti. i. floris mali granati. *Domū gra-*
natum.
- ¶** Partes uero laterales dicuntur coſtatus: & latera: & mamilla / *Coſtatus.*
Latera.
- ¶** Partes uero poſteriores: Alię ſunt medię: & alię la- *Crū regio.*
terales / Medię dicuntur interſcapiliū & metaphrenon: & noton: *Interſcapiliū.*
laterales dicūtut ſcapulę / ſpatulę & ſcapilium: Aliqui tamen uo- *Metaphrenō*
cant laterales cum mediis / metaphrenon / & noton. *Noton.*
Scapulae.
Spatulae.
Scapilium.
- ¶** Partes uero magis proprię: Alię etiam ſunt anteriores / alię la-
terales: & alię poſteriores.
- ¶** Quę ſunt āte / ſunt primo cutis / pinguedo / aliqui muſculi: oſſa
& carthilagines: & pāniculus pleura.
- ¶** Partes uero laterales / ſunt cutis / pinguedo / mamillarū ſubſtan-
tia / muſculi multi: Coſtę & etiam pāniculus pleura.
- ¶** Ultimo ſunt ptes poſteriores. ſ. cutis / aliqua pinguedo / muſcu-
loſa caro: & nō muſculoſa ſimplex replens oſſiū uacuitates aliq̄s:
duodecim ſphondyli coſtarū ſiue pectoris: & pāniculus pleura.
- ¶** Partes cōtēte / ſunt muſculus diaphragma ſeptūtrāſuerſum di-
ctus: qui ſecūdū aliquos eſt iter cōtenta pectoris numerādus. in
quātū ſua principalis opatio eſt ſeruīre cordi / mediāte ſuo motu:
per quē pulmonē mouet. Eſt deinde pāniculus mediāſtinus: ca-
pſula cordis: Cor cū ſua Aorta Arteria: & Pulmo cum ſiis uaiſis:
Vena chilis aſcēdens / Nerui deſcēdentes: & aſcēdentes Reuer-
ſui dicti / glandula dicta Timū & Morum / Gula. i. cibi ab ore ad
uentriculū uia / cū pāniculis p̄dicta membra tegentibus.
- ¶** Subſtantia huius uentris eſt pelliculoſa / pinguis / oſſoſa / carthi-
laginoſa / muſculoſa: & pānicularis.
- ¶** Oſſa enim eiꝯ nō ſunt unita ſicut in capite / ſed diuiſa / ut pe-
ctus ſit obediēs motui anhelitus: & ideo propter mortū in eo ſunt
muſculi. Dixit Gal. 7. de utilitate: ſi pectus eſſet factum ex ſolis
muſculis / illi caderēt ſupra Cor & Pulmonem: ut igitur ſpatium

D

DE ANATOMIA

fiat aliquod Intus: simul autem & moueatur totum organū: Musculi ossibus alternatim positi sunt.

¶ Hic Venter Pectus dictus / quantitate est insignis / quia seruit multis & magnis mēbris: habet tñ maiore cōcauitatē posterius q̄ ante / Initiū culus uersus posterius / est a primis spondylis infra colū alq; ad septūtrāuersum / q̄tū cōtinēt duodecim costę: sed antē rius occupat tñ prē ptētā iter furculā supiorē & inferiorē iclusiue.

¶ In homine Pectus est latum / nō carinatū sicut ī maiori parte brutorū: latius tñ est in Mare q̄ in foemina / ad portādos autē foetus: uēter inferior est in Foemina maior q̄ in Mare: & pp hoc regio Renū: Ossis sacri / & Ancharū / in foemina est ualde lata.

¶ Figura / & numerus / & situs pectoris patent / sed eius cōcauitas interior est similis cōcauitati semi Oui oblique per latū icifi: cuius pars magis acuta est uersus collum: est etiam similis ungulę Bubalinę / sicut est pulmonis figura.

¶ Colligat cum toto corpore / complexio eius est secundum suas partes: Sua complexio innata actuata p influentem est calida: iuamenta eius: sunt custodire cor & pulmonem principaliter. passiones omnium modorum patitur.

De Mamillis.

In parte anteriori pectoris uersus latera / sunt duo membra rotūda Mamille a sua figura nomen sumētes ab antiquis Rume dicta / in medio cuiuslibet eorū / est unum tuberculū parū quod Papilla dicitur: per quę ifans papat / circa quas est circulus / qui est rubricetus seu rosetus & interdū nigricans / Fos gręce dictus / substantia quarū / est ex Venis / Arteriis: & neruis. Inter quas est uacuitas / quā replet caro glandosa / alba sensu carēs: & propter suā albedinē / quādo morat in eis sanguis albificat & fit lac: & Mamilla cōuertit sanguinē ad albedinem & facit lac sicut hepar pūertit chilū ad rubedinē: & facit sanguinē. Vñ quodq; n. eorū / cōuertit humiditatē in eo cōtentā ad similitudinem suam / in natura & colore: huius sanguinis albificati: una pars nutrit Mamillas / alia est lac: et hęc est superfluitas utilis.

¶ Ad mamillas ueniūt descēdendo a regione ascellarū circa costas / suę Venę et Arterię: et etiā a regione pectinis ueniūt Venę per abdomen / quas seruasti superius / istę Venę et Arterię optime apparēt in corpore demacrato / in pingui uero occultę sunt.

Mamille.
Rumae.
Papilla.

Fos.

Quid Lac.

sed optime uidentur in foetu trium uel quatuor mensium.

¶ Numerus Mamillarū & quātitas patet: sunt tñ maiores ī foemina q̄ in mare/ propter lac generādū/ suus situs/ est in pectore: quia est latū/ nō carinatū/ in quo possunt locari cōmode: & etiā quia superfluitas mēbroꝝ supiorū nō trāsit in crines/ nec in dentibus/ nec ī cornibus: ut ī brutis. Colligātur cerebro per neruos: cordi per arterias/ hepati & matrīci per Venas: a matrīce tamen suscipiūt maiorē partē sanguinis / ex quo fit lac/ ideo lactātes nō hñt mēstrua / nisi raro & pauca: & nō mēstruātibus tēpore debito/ tumēt Māmē/ tument etiā & dolēt Māmē/ parū ante tēpus mēstruorū: quia matrix & Venę secū alligatę sunt plene.

¶ Iuamēta eaz/ in mare sunt ad decorem: & ad tutelā mēbroꝝ pectoris: & reuerberāt calorē ad cor: & itērdū in mare fit lac propter abundātiā nutrīmēti/ maxime ī habēte magnas & fortes Mamillas. In foemina etiā habēt prēdicta iuamēta: sed principāliter sūt pro lacte generādo: ut nutriat eo nouiter natus: usq; quo possit deglutire cibū solidū: & lac est proportionatū nutrimentū nouiter nato/ quia fit ex sanguine a quo prius nutrebat in Ventre. Passiones omnīū modorū patiūtur.

¶ De Musculis Pectoris :

¶ Iis & notatis prēdictis/ potes excoriare cutem totius pectoris/ relinquēdo Musculos in loco suo/ & scindere Mamillas: ut uideas eius substātiā/ maxime carnem/ in qua sunt Venę & Arterię per totum disperse: & uidebis Papillas habere plura foramina exigua ualde/ a quibus exit lac/ ad quę foramina: secundum aliquos terminātur extremitates Venarū prēdictarū/ per quę exit lac: & secūdum alios/ lac exit a spongiositatibus carnis Mamillę terminatis ad foramina papillę: & non a uenis immediate: utrūq; est possibile.

Unde exeat
lac.

¶ His uisīs/ notabis in pectore multos Musculos/ qui mouēt pectus uoluntarie: quīs etiā pectus naturaliter moueatur. sed motum cordis & pulmonis/ ut in nostris cōmentarijs diximus/ quorū aliqui sunt exteriores/ alii inter costas/ & alii intra pectus.

¶ Exteriorū/ duo sunt sub furculis superioribus/ cōtinui cū costa prima/ qui ad caput spatulę tendūt: & cum istis unitur unū aliud par: cuius unūquodq; ipar/ est duplans primū par: & faciens ipm in duas partes/ pars cuius superior cōtinuatur collo: & ipm mo/

D II

uet/ inferior uero pectus mouet: & hoc par/ cōtinuatur cum uno pari / quod est cōtinuum cum quinta & sexta. costa .

¶ Postea est Aliud par in cōcauo spatulaz cōtinuatū cum uno pari ueniēte a sphōdyli usq; ad spatulas: & isti oēs sunt sicut unū par: qui p̄tinuātur cum costis posterioribus .

¶ Postea est aliud par/ ortū a/ sexto sphondylo colli: & a primo & a secundo superiori sphondylo pectoris / p̄tinuatum eisdem costis: & isti Musculi sunt oēs dilatātes pectus .

¶ Postea est unū aliud par/ sub radicibus costarum supiorz exten sum: qđ descēdendo unī cū suis extremitatibus uni pari/ qđ ē cir ca furculā inferiorē/ p̄tinuatū cū musculis lōgis abdominis/ supra qđ par/ sūt duo paria/ q̄ ipm̄ cooperiūt: & isti oēs p̄stringūt pectus .

¶ Musculi uero itra costas/ sunt dilatantes & p̄stringētes/ inter se differētes in ope; & hi qui sunt inter costas/ inter costam & costā sunt quatuor: scilicet Musculi duo uersus exterius/ & duo uersus interius / quos leuiter sepando cognosces per incessum suorū uil lorum/ primi duo superiores/ habent ullos transuersales: & dilla tāt pectus. Secūdi uero inferiores hāt uillos latos: & sūt p̄stringētes.

¶ Musculi uero intra pectus/ est solus unus. s. Diaphragma seu se p̄tūtransuersum/ qui cum quiescit/ p̄stringit pectus/ per accidens tamē: & cum mouet/ dilatat illud/ motus tamē diaphragmatis/ est compositus ex uolūtario & naturali .

Quot sūt mu
sculi pectoris.

¶ Numerus quoq; in totū est/ centū & quinq; musculi/ exceptis Musculis p̄dictis dorsi & colli, s. duo primi sub furculis superiorib; & duo alii p̄tinuati cum quinta & sexta costa. Postea Muscu li duo a p̄cauo spatulaz ueniētes p̄tinuati costis posterioribus / po stea duo a sexta sphōdyli colli: & a prima & a secūda pectoris eis dem costis p̄tinuati. & isti sunt octo in totum/ omnes dilatantes. Sūt etiā totidē p̄stringētes/ excepto diaphragmate/ qđ ē dilatat.

¶ Et de p̄stringētib; primo sunt duo sub costis superioribus: & duo circa furculam inferiorem/ supra quos/ sunt quatuor alii eos cooperiētes/ qui oēs simul cum diaphragmate/ sunt decē & septē. Postea sunt inter. xxiii. costas. xxii. spatia: & pro quolibet spatio sunt quatuor Musculi/ qui sunt in totū inter costas. lxxxviii. & si mul cū. xvii. p̄dictis/ faciūt numerū centū & quinq; musculorū .

¶ Sed ut ista omnia bene uideātur/ excoriādē sunt etiā spatulz: & dorsum; & primo uidebis Musculos exteriores/ secūdo musculos

Inter costas. Diaphragma uidebitur inferius loco suo: hæc tamen
latius a me sunt dicta in cōmentariis super Mundinum.

¶ Aduerte lector q̄ motus pectoris sunt qua tuor .s. exspiratio
uiolenta/ & inuiolenta: & inspiratio inuiolenta: & etiam uiolenta:
quibus obediunt Musculi prædicti.

¶ In motu inuiolento inspirationis/seruiūt Musculi iter costas di
latātes pectus/seruiūt etiā ei motus cordis & pulmonis. Dum.n.
diaphragma mouet/ trahit pulmonē: qui ut clibanū aere replet:
adiuuāte motu cordis dilatatiuo: & pectus dilatat. Istū motū ad
luuāt etiā duo primi Musculi: q̄ sūt iuxta furculas supiores: & iste
motus ē mixtus ex uolūtario & naturali: naturali tñ uincēte.

¶ Ad uiolentam autem inspirationē concurrūt cū prædictis oēs
alii Musculi pectus dilatantes/ simul cum diaphragmate: & iste
motus est etiam compositus ex naturali & uolūtario/ uolūtario
superante/ stante ualitudine cordis.

¶ Ad motum autem inuiolentum expirationis/ cōcurrunt (le
uiter tamen) Musculi interiores costarū: & omnes alii Musculi
constringentes/ sed principaliter hic motus est naturalis/ quia fit
a corde & a pulmone/ ad expirationis uero uiolentum motum/
iuuant/ cor & pulmo/ sed principaliter iuuant omnes musculi cō
stringentes pectus: & etiam Musculi Abdominis.

¶ Ex prædictis patet colligantia Musculorū pectoris / & figura:
situs & quātitas & eorum substantia. Numerus est dictus. Com
plexio sua est calida & humida: iuuamenta dicta sunt. Passiones
omnium modorum patluntur.

¶ De Ossibus Pectoris.

Ssa pectoris nō sunt unum continuū sicut in capite: sed
o plura cōtigua/ ut possit dilatari/ quę sunt ante & a lateri
bus/ proprie sunt ossa pectoris: sed quę sunt posterius:
sunt magis appropriata dorso/ ossa pectoris lateralia/ a latinis di
cuntur costę/ dictę gręce ab aliquibus pleura & chondros: Nu
mero sunt. xxiii. duodecim In quolibet latere/ de quibus decem
inferiores ab utroq; latere quinq; / gręce Rhoas dictę: aliis sunt
breuiores: & secundum aliquos parum ossosę/ sed carthilagineę/
quę a latinis mendosę et incompletę dictę sunt: superiores uero
completę et integre sunt: et uocantur uerę Costę/ quę in quoli
bet latere sunt septem: quibus continuatur utrinq; os pectoris

Costa.
Pleura.
Pleuron.
Condron.
Rhoas.

D III

predictum: quod os in medio est durū: & uersus costas carthilagi-
neum. s. q. inter os pectoris & costas est carthilago.

¶ Hoc os secundū aliquos/est ex septē ossibus cōpositū/quibus
utrinq. uniantur septē costę uerę: & secundū aliquos alios est ex
quindecim. s. septē in quolibet latere: & unū in medio: & secundū
alios est ex. xxi. s. ex septē in medio: & utrinq. ex septē carthilagi-
nibus/qbus uniūť costę uerę. Anno tñ. 1523. i anatomia publica:
una colla uera apparuit duplex/ubi ossibus pectoris iūgebaf.

¶ Sua figura ē lunata. Sua substātia: & gr̃itas: & situs patēt. Co-
stę colligātur duodecim primis sphōdylis ifra collū: & ossibus pe-
ctoris p̃dictis: & pāniculis eas tegētibus. Sua cōplexio frigida est
& sicca. Sua iuuamēta patēt. Passiōes omniū modoz patiūtur.

¶ Suā Anatomia optime uideres: si in uno indiuiduo eis solis
uacares/nō habendo respectum mēbris spiritualibus.

¶ De Pleura Pāniculo.

Pleura.

¶ Inter mēbra cōtinētia / ponit pāniculus imēdiate costis
& ossibus pectoris hērens/q. dicit Pleura/cuius substan-
tia est neruea/dura & subtilis a qua oriūtur pāniculi mē-
bra in isto uētre imēdiate regentes. Sua figura est plana/extensa
per totū in circūferētiis pectoris: & etiā circa diaphragma uersus
suū superius extēditur per totū ipsi firmissime hērens. Sua quāti-
tas ex p̃dictis patet/occupat totam cōcauitatē pectoris: excepta
certa parte anteriori eius/quę occupata est a mediastino.

¶ Numerus/ & etiā situs: & colligātia: & sua cōplexio patēt. iuua-
mēta sunt uestire & tueri mēbra pectoris: & ligare sua ossa iuicē:
& mediare iter ossa & mēbra p̃tēra i pectore/ ne molle ledaťa du-
ro ualde. Passiōes omniū modoz patiūt. Istū pāniculū nō uidebis
p̃fecte/nisi icidēdo costas ap̃ias pectus eo mō quo ifra dicet.

¶ De septo trāuerso seu Diaphragmate.

¶ His partibus cōtinētibus/cōtenta occurrūt: & primo est
uidendus Musculus pānicularis diaphragma dictus. Se-
cūdo pāniculus Mediastinus. Tercio pāniculus Capfu-
la & receptaculum cordis dictus. post ista mēbra/uidebitur Cor:
& residuum contentorum in pectore.

¶ Dico ergo quod intra corpus/inter uētre Imū & Mediū/est
certa substātia pānicularis & carnea: dorso circa duodecimū sphō-
dylum alligata/quę dorso ante uersus alligat semp extremitatē

bus costarū mēdosarū usq;quo terminetur & alligetur extremo
furculę inferioris pectoris:& sic diuidit mēbra naturalia a uitali/
bus:& hoc mēbrū nominat Septū trāuersum:& Paries:& Phre *Septū trāuersum.*
nes:& Diaphragma:quod est musculus & non pāniculus:fungi/
tur tamen officio pāniculi in tuendo Cor & membra superiora a *Paries.*
uaporibus olidis eleuatis a mēbris nutriti / sua pars carnea *Phreno.*
est ad extrema eius:& sua corda est in eius centro pulmōni uni/
ta:quia habet cum tali situ,illum mouere. *Diaphragma.*

¶ Huic uersus superius/per totū alligatur Pleura:& eodē modo
Inferius Siphac est ei alligatus/perforatur uersus dorsum/a chilī
Vena ascendēte/a qua in ipso/una a dextris/alia a sinistris/rema
nent duę Venę ipsum nutriētes/perforant etiā ipsum uersus dor
sum Aorta Arteria descēdens:& Gula seu Meri/quę uersus uē/
trem inferiorem alligatur Ventrículo immediate.

¶ Sua figura & quātitas patet/sua substātia & colligantia & si/
tus dicta sunt. Alligatur tamen per paruas Arterias cordi:& ce/
rebro per tria paria neruorū quorū duo ueniunt a Nuca:& unū
a cerebro/& illi apparent interdum notabiles.

¶ Sua cōplexio ē calida & humida. Iuuamēta sua sunt pro pte di
cta Gal. tñ dixit i ipso esse originē respiratiōis & omniū uiriū cor
poris:& hęc iuuamēta ipse inuenit primo. Iuuat etiā in expellēdo
a Vētriculo/& ab intestinis/& a Matrice aliq̃ sua p̃tēta: puocat ēt
risū:secūdu aliquos mouēdo mētē p̃ter uolūtātē i titillatiōibus.

¶ Passiones omniū modorū patitur:sua solutio est letalis.

¶ De Mediastino.

Ost Anatomia diaphragmatis occurrit pāniculus me/
diastinus:sic dictus/quia diuidit cassum pectoris secūdu *Mediastinus*
lōgū p mediū:Gal. uocat ēt ipsum cooptoria descēden *Cooptoria de*
tia & Aui. pāniculū mediū:ad quē uidēdū:primo a dextris & si/
nistris separa ossa pectoris a costis:taliter ne ledas cōtenta in pe/
ctore:sepa etiā diaphragma ante uersus ab ossibus pectoris:& ui/
debis istū pāniculū/ab imo ad summū:& ab ante retro diuidere
pectus. Sua substātia ē pānicularis:sua figura & quātitas patēt:
situs est dictus:numero sunt duo pāniculi/ uersus anterius nota
biliter distantes/habētes in se notabilem uacuitatem/sed uersus
dorsum apparet unus solus:colligat pleure/a quo secūdu aliquos
oritur:colligatur etiam diaphragmati:& dorso/& pulmōni me/
Mediastinus
Cooptoria de
scendens.
Pāniculus
medius.

D 1111

DE ANATOMIA

diāte pāniculo a pleura orto/colligat etiā meri teste Auic. & etiā ossibus pectoris: colligatur ēt cerebro p nervos/ cordi p arterias: hepatis per Venas. Sua cōplexio est frigida & sicca/ sua iuamēta sunt diuidere pectus & pulmonē per mediū/ ut si contingat uni parti nocumētū/ ne ptingat alteri: tue ēt etiā furcas supiores: ab eo etiā fit cōseruatio caloris cordis. Passiōes omniū modorū patit.

¶ De Capsula Cordis.

u Isis p̄dictis/ debes eleuare ossa anteriora pectoris sepa-
rādo ea a parte āteriori pāniculi mediastini: quē dimitte
in loco suo usq̄quo uidisti Anatomia pulmonis. Eleua
etiā utrinq̄ costarū sūmitates/ ut locū amplū habeas pro aliis ui-
dendis: & in ista sectione bene cōfidebis ossa pectoris: & etiam
pleura: totū tamen diaphragma in loco suo ubi potes p̄mitte alligatū:
maxime dorso: ut uideātur nerui ad eū ueniētes a superio-
ribus: & ut uideatur gulę siue meri cum ipso colligantia.

Capsula peri-
cardia.

Simia Gal.



¶ Istis eleuatis/ uidebis pulmonē/ in medio cuius ē unus pānicu-
lus mediastino alligat⁹: q̄ ē durus & grossus/ ut melius tueat Cor
ab extrinsecis: figura cuius ē sicut est cōtentū ab eo uiscus/ cor no-
minatū/ qui cōcauus est: & similis marsupio: & dicitur capsula: &
pericardia i quo ē cor ipsum / & aqua i notabili quātitate / ipsum
irrorans & prohibens ne exsiccet a forti calore/ quę si exausta sit
cardiacus morbus efficit: quo aīal ad tabē pducit: ut cōtingit Si-
mię Gal. hęc capsula est ualde sensibilis: & forte cōpletue primo
genita corde: Substātia/ situs/ figura: & iuamēta sua dicta sunt:
Numero est unus: quātitas patet: colligatur radicibus pāniculari-
bus cordis/ & pleurę/ & mediastino/ et diaphragmati: per pellicu-
las suas: hepatis per Venas/ Cordi per Arterias: Cerebro per ner-
uos. Sua cōplexio innata est frigida et sicca: influēs uero calida:
quia cordi proximus: Passiones omniū modorum patitur.

¶ P̄dictā capsulā/ et mediastinū/ et diaphragma dimitte i loco
suo usq̄quo uidisti Anatomia neruorū descēdētū: qui descēdēdo
ad uētrē īferiorē/ mittūt ramos ad p̄dicta mēbra: ut dice ē infra.

¶ De Corde.

Ost Capsulam Occurrit Cor: in culus Anatomia et pul-
monis: et etiam aliquarum capitis et colli partium pro
per ipsorum artificiosam compositionem et operatio-
nem uberius procedam.

- C** Cordis enim dignitas aliis particulis preualet. Omnium enim membroꝝ est principalissimū: et dicitur sol microcosmi. Alia enim membra suo spiritu illuminat. Huic enim ē præcipuus calor/palpitat certet: et quasi animal motum habet: Ideo nascentibus primum in utero formari fertur: Deinde cerebrum et hepar/ tardissime uero (ut aliquibus placet) oculos: sed hos primo mori/ cor uero ultimo: solū hoc mēbrum uitis nō maceratur: nec supplicia uitę substat: sed lesum notabiliter illico mortem affert: et ceteris corruptis uitalitas i eo durat: et propter hoc nō decolat animal: in cuius corde repiat nocumentum sicut est in aliis particulis.
- C** Aialia. n. quibus cor paruū est/ audacia sunt: pauida uero sunt quibus ē pergrande/ ut proportiōe Muribus/ Lepori/ Asino/ Ceruo: et oībus timidis/ aut propter metum maleficis: magnū tamē cor multo spiritu pollens/ audaciores ceteris reddit.
- C** Hirto corde nasci quosdā homines fertur: et hi sunt aliis audaciores fortioresq: ut i exēplo est Aristomenes Messanius qui. ccc. occidit lacedemonios: et ipse conuulneratus captusq: / tandem per uulpiū cauernā fugiens euasit: iterū captus / audax aufugit: tertio laqueis apprehensus/ lacedemonii pectus dissecuere causa uirilitem eius uidendi/ hirsutūq: cor eius repertum est teste Plinio. Cor item ē omnibus animalibus septūtrāsuersum et sanguinē habentibus teste Aristo. ii. de hyst. cap. xv. In aliquibus tamen pre sua exiguitate cerni nequit.
- C** Situs cordis in medio pectoris est intra pulmonem/ homini tātum cum sua ima parte ad leuam papillam declinat / ne obuier ossibus pectoris/ nō carinatis ut i brutis: sed in latū cōpssis.
- C** Figuram habet pyramidalem/ gibbam tamen/ nō talem principaliter: quia sit calidum ignis sequēs formam: sed quia est mixtum perfectū animatū possidet formam operi suo cōpetentem.
- C** Sua summa pars qua supriora petit et dorso alligat lata est: et hęc pars est nobilior aliis partibus cordis/ quia mediantibus duobus orificiis arteriarū sinistri lateris ab ista parte ueniētibus pseruatur uita aiali: Ima uero i acutū se colligit/ exitq: pene iu mucronem: et in anteriora est eminens.
- C** Sua pars etiā gibbā supiora pectoris spectat: et est talis formę: ut sua fabricatio supior & inferior sit bona: et nō sit in ea supfluitas apta impedire suū ptinuū motū / et ut in eius cuspide sit agre

Sol micro/
cosmi.

Cor primo
formatur.

Cor ultimo
moriatur.

Corde hirto
aliqui.

Corde for/
ma.

DE ANATOMIA

gatum ad pñctum unum/ut illud quod leditur tactu offium: sit minus partium eius/ut minorem suscipiat lesionem.

¶ Sua substātia est ex carne simplici ubiq; solida / habet autē sui mucronis & partē eius sinistrā spissioris carnis/ut spiritū ibidē locatū pseruet:& ut sua gravitate egpolleat pōderositati sāguinis i dextro uētriculo pteri/ cuius pletes sūt leuiiores sinistri uētriculi.

¶ In suis cauis sūt ligamēta plurima alba carūculis multis ibidē existētib; & pelliculis siue offiolis uenę chilīs & arteriosę uenę alli

¶ Cor etiam subtili firmaq; inuoluit mēbrana cum pin/ (gata/ guedine quadā / quę ipsius substantiam & calorem conseruant Corroborantq; & exsicari ipsum prohibent.

Auriculae.

¶ In sūmo eius ubi dorso hēret/ sunt duę pelliculę rugosę & cōca uę dicte auriculares/ q; sūt domiciliis seu uētriculis eius/ dextro. s. & sinistro unitę/ eius spiritū & sāguinē supfluētē tāq; bonus oeconomus accipiētes & pseruātes/ & postea i necessitatibus reddentes/ in quartū dextra sāguis in sinistra uero spiritus & aer seruāf.

¶ Istas auriculas ordinauit natura/ ut sāguinē ac aerē extrinsecus uenientem/ spiritūq; uitalem interdum in corde superfluentes susciperent/ supplentes uices magnitudinis cordis/ per quam occupasset aliorum membrorum sibi uicinorū loca.

¶ Sua etiā magnitudine fuisset graue motui ineptū: & sēpe etiā si esset magnū ualde: propter spiritus & sāguinis penuriā esset uacūū:& cōsequēter debile/ ut est in timidis aīalibus magnū habentibus cor. s. proportionē sāguine & spiritu uacuum.

¶ Eius radices sūmo ipsius sunt alligatę/ quę solidę sunt ac durę & quasi carthilagineę/ ut sup his sit agilis suus cōtinuus motus.

¶ In corde etiā sunt Inuli multiformes & diuersimode locatī/ ut continuos & fortes sustineat motus: qui sunt naturales: & non uoluntarii:& ideo in eo non est lacertus aliquis.

*Vena nutritio
Cor.*

¶ In sūma pte eius p exteriorius / est una uena a chili orta oblique uersus mucronē unde q; ad minima se ramificās/ q; ipm nutrit.

¶ Ibidem etiam sunt duę pulsantes uenę/ ortę ab aorta per exteriorius discurrentes/ una est eodem situ quo est non pulsans pēdicta/ quę ipsum uiuificat: Alia in sinu dextro spargitur:& ei uirtutem uitalem affert: sāguinem etiam ibidem cōtinue intrantem concoquit et uiuificat: et ista mediāte/ per chilim hepar in suo gibo euentatur: et uitalitatem propriam conseruat.

Sinū triplicem seu cauū alias domiciliū uel uētriculū possidet: dexter est sinistro maior: & sinister usq; ad extremitatē suę cuspi- dis peruenit. Dexter aut sub illo modicū finitur loco.

Inter istos: ē paries densus & spissus: a Gal. diaphragma dictus: i quo sunt foramina plura parua: a dextro sinu in sinistrū tendē- tia: latiora a quo: q̄ ad quē: ista foramina dilatātur dū abbreviat & aperit Cor: & p̄stringūtur dū elōgatur & cōstringit: hinc san- guis subtiliatus & preparatus a dextro in sinistrum meat / ubi in spiritum uitalē complete mutatur.

Paries i cor/
de dicitur dia-
phragma.

Hęc orificia: a medicis habetur pro sinu medio: istū sinū teste Auic. Gal. uocat foueā & meatū: & nō uērem / ut sit receptacu- lum nutrimentū quo nutrit cor: quod nutrimentum est spissum for- te: simile substantiē ipsius: & ē minera spiritus generati in ipso a san- guine subtili: & subdit q̄ tēperatior sanguis est in medio uentre:

Dexter uero sinus: i eius summo duas habet uenas: una quæ- culus tunica simplex ē / est ceteris uenis maior: a iecinore ueniēs chilis: & cōcaua: & audax ascendens dicta. & hęc per grādis est. quia oībus aliis uenis intra cor & extra sanguinē tribuit: ab eis ni- hil susciplens: & ideo plus de sanguine in cor ducit q̄ reducat. Est etiā pergrādis: ut pluries multum fluentem & resluentem conti- neat sanguinem: & ut eum breui spatio cordi afferat: ut concoqui possit commodius ab eo.

Chilio.
Concaua.
Audax ascen-
dens.

Hic sanguis sic coctus tripartit: una pars ex subtili bilioso mi- nor ceteris ad pulmonē nutriendum uadit.

Altera p̄dicto maior & subtilior per diaphragmatis p̄dicti fo- ramina ad sinistrū ubi spirituat sinum tendit.

Reliquū uero eius: nō sic subtilis: & quod etiā longe plus ce- teris est: pluries in dextro sinu ingressum & egressum: ut integre coquatur & uitalitatem susciplat: per eādē chilim ad omnes ani- malis particulas transit: & eas nutrit.



Auicena tñ ponit quartā partē in uentre medio: quā dicit esse temperatam: sed hęc est oculis meis incognita: forte q̄ in pariete medio cordis penetrat sanguis eū nutriendus: sed breui spatio tran- sit in substantiam nutriti, quia ibi nō est sanguis extra uenas iudi- cio meo: nisi in uentre dextro & sinistro.

Huius uenę certum orificium: cordi terminatur: dum cor di- lataē & trahit sanguinē apitur: & dū cōstringitur eū expellēdo



Ostiola vene
chilis & Arteriose vene sūt
solida / sed in
cōplete clau/
dunt Lor.

Uena Arterialis.

Ostiola C formia.

Aorta est
Sexcupla ad
venam.

clauditur: sed nō integre / quia pro parte remanet apertum. Ideo
semper in eo tanq̃ thesaurū & caloris minerā natura retinet aliq̃
feruentis sanguinis portionem / qui denuo aduenientem sangui/
nem in sui naturam mutat ei se uniendo.

¶ Et hoc orificiū aperitur & clauditur a tribus pelliculis nerueis:
seu ligamētalibus / quarū color est albus ad parietes p̃dicti sinus
p̃ ligamēta alba & solida / suis extremitatib⁹ supioribus alligatis.

¶ Istę pelliculę ostiola noiata / aperiantur ad intra sinū integre:
cedentes sanguini intranti: & claudūtur ad extra / nō integre tñ.

Et istę pelliculę solide & dure sunt: pariter & pelliculę arteriose
uenę: ne ī magnis & cōtinuis cordis motibus eis adueniat disru/
ptio: q̃a alligātur ī suo sūmo ligamētis eas cōtinue extēdētibus.

¶ Pelliculę uero aortę arterię / & uenę arterialis / sūt istis min⁹ du
re / q̃a p̃ ligamēta aliq̃ nō extēdūt: & iō disruptiōis timore carēt.

¶ Alia uena ad pulmonē uadit / huius nomē ē uena nō pulsans:
siue quieta. Dicit̃ etiā uena arterialis: & dicta ē uena / quia portat
sanguinē ad pulmonē nutriēdū: & dicta est Arterialis quia duas
possidet tunicas / ut sit fortis & cōpacta propter sanguinem bilio
sum & subtilem in ea manātem: & ne rūpatur propter eius cōti/
nuū motū: in cuius orificio sunt tres pelliculę / siue ostiola / intra
sinū se integre claudentes: & extra se apiendo: exeūtī sanguini ce
dētes: in dilatatione cordis claudūtur integre / ne sanguis ad pul
monem regurgitet: in cōstrictione uero aperiūtur: & herēt parie
tibus uenę / nec alibi ut primę per ligamenta sunt unite.

¶ Harū substātia est pānicularis: Sua figura est similis uacuitati
quę est in littera. C. ideo uocantur ostiola. C. formia. Habēt etiā
illam formā circularem quam habet unguis humanus / quę pelli
culę cum sua parte circulari alligantur corpori uenę.

¶ Sinister uero sinus aliis nobilior (quia ei primo famulātur dex
ter & medius: et etiā pp̃ cōtētū spiritū aliis p̃ualet) ī eius summo
duas habet uenas: unā magnā chili p̃dicta nō multo minorē: q̃ ē
uelut stipes ad totū corpus distributa / & hęc est pulsans: & bitu/
nicalis / cuius spissitudo teste Erophilo / ē sexcupla ad uenā: & hęc
dicit̃ arteria aorta / & magna: cuius tunica interior durior est exte
riori / q̃a obuiat pcussiōi & substātię spiritus / cuius itēdit custodia.

¶ Ista ad totū animalis corpus uitalem spiritum ducit: & illud in
uita conseruat. Per istam. n. arteriam dicebat Gal. omnia mēbra

pulmone excepto/inspirant & expirant/ne eorū uitalitas suffocetur:uenę autē/uelut repositoria cibi sunt / diastolari neq; systolari indigentes:& ideo eorum corpus/est subtile/porosum & lene. Pulmo autē īspirat & expirat propter motū cordis & pectoris.

Hęc Arteria seu Rami sui raro sunt sine chili sibi socia:& Aorta ascendēdo parū supra cor bipartit/ una pars obliquatur inferius & descendit/quę in pectore & in imo uentre usq; ad pedes a se multas emittit fibras:& eorū mēbra uiuificat. Sub isto Ramo Inferius obliquo/ascēdūt a sinistris nerui uocis/qui dicūtur reuerſiui:& hic locus dicit flexor & gurgilus / de quo alibi dicitur.

Aorta descen
dens & ascen
dens

Alta ps ascēdēdo circa pulmōis prē & glādulā timū/ sūmū pectoris/brachia/collū & caput/ac eorū ptes uitalitat & spū replet.

Flexor.
Gurgilus.

Et semp illę Arterię q̄ sunt alligatę uenis/p multos poros siue fibras paruas inuicem unīūtur seu coactomātur : & uena imbibit arteriā:& ecōtra arteria imbibit uenam:& a Vena in arteriā trāsit sanguis:qui ibidē spirituosaf ī necessitatibus:& ab arteria in uenā trāsit spiritus uitalis cōcoquēs sanguinem eius:& ipsum cōseruans in sua uirtute: Tunicę etiā earū nutriūtur & uiuificātur ab earū cōtēto:& hęc arteria supra cor ē minor q̄ īfra teste Gal.xvi. de util.c.xi.& facta ē talis q̄ a corde īfra sunt plures aīaliū particule q̄ supra ipsum:& tāto ē maior hęc arteria descēdens ascēden te p dorsū/quāto & multitudo īferiorę particulę excedit supio res/& in hoc cognoscit nō parua nature iustitia/ uena chilis descēdēs debet etiā esse maior ascēdente propter eandē causam.



Arteria Aor
ta ē maior su
pra cor q̄ īfra.



Nutritum.
Ostiola. L.
formia.

In huius pulsantis uenę orificio quod auritiū dicitur: sunt etiā tria ostiola. C. formia/ eo tempore & eodē modo se aperientia & claudentia/quo aperitur & clauditur uena arterialis.



Alia est in isto uētriculo uena nō pulsans/ sed geta/arteria uenalis dicta:& dicta est arteria/ quia portat & reportat spiritū siue aerem ad cor:& a corde ad pulmōē/ a quo extra pectus mittit: & dicitur uena/ quia simplicem tunicā possidet / in huius orificio sunt tantū duę pelliculę/ seu ostiola: eisdē modis alligatę:& incōplete: ac se aperietes & claudentes in cordis dilatatione & cōſtrictione quibus faciūt ostiola in orificio uenę chilis exiētēs. Hęc etiā arterialis uena / plus ad cor portat de aere q̄ extra ducat/ quia ex sanguine & aere ab ipso introducto / spiritus generatur uitalis: qui per Aortam ad omnes aīalis particulas transit.



Arteria uen
alis.

DE ANATOMIA

Et ut tibi melius satisfacias habes hic tres cordis figuras in quibus potes cognoscere Venā chilī & Arterīā & alias cordis venas & aliq̃s alias ipsi⁹ partes.

Habes in hac figura duas cordis formas: in quibus vides vētriculū dextrū in vna quāz videtur vena chilī cordi unita / i cuius orificio cū ingreditur cor: sunt tria ostiola pellicularia alba aligata substantiæ cordis p̃ certas fibras vt vides & hec ostiola non perfecte aperiūtur nec claudūtur vt supra patuit. In alia figura habes tria ostiola & foramina q̃ etiā sūt in vētriculo dextro cordis in orificio venę Arterialis: q̃ portat sanguinē pro nutritione pulmonis.






¶ Vides in
hac figura
partem ven-
triculi sinistri
in quo vides
duo ostiola
arteriae venae
lis / q̄ integre
nō clauduntur
vt supra patet
it̄ causa di-
cta est in secū-
da habes cor
diminute ap-
tū / in quo vi-
des. Auriculā
dextrā ipsi ser-
uientem / & vi-
des qualiter
vena chilis
cordi vnitur /
vides & ra-
mos aliquos
notabiles ve-
ne nutrientis
cor q̄ per exte-
rius substantiā
ipsius ingreditur.

Claves in
 hac pagina cor-
 dis figurā in
 qua vides i fi-
 nistro ventri-
 culo tria ostio-
 la C formia q̃
 claudunt inte-
 gre tempore
 debito officii
 Aortae Arte-
 riae / & ecōtra
 aperiantur in
 cordis constri-
 ctione / vides
 etiam Aortā
 ascendente / &
 vides quali-
 ter bifurcat : &
 vnus ramus
 ipsius descen-
 dit / sub cuius
 reflexione ner-
 uus reuersus
 finistri lateris
 supra flectitur
 tāq̃ corda su-
 per tota : & hic
 locus appella-
 tur Birgilius :
 Vides etiam
 in hac figura
 Auriculā fini-
 stram ipsius
 cordis..

NERVVS
 REVERSVS



¶ Ex p̄dictis/cordis figura colligãtia & cōplexio ac eius iuuamē/ta patent. Sua quãtitas est cōspicabilis: Numero est unū: licet iã sit repertum cor simli habere duo capita prodigiose tñ: fertur etiã in paphlagonia bina perdicibus corda esse. Et potest accidere omne genus morbi: illos tamen non patitur si diu durant.

¶ De Pulmone.

Iso corde occurrit pulmo/ flabellū/ & uentilabrū/ latine *Pulmo.*
dictus/ & gr̄ce pneumon. Hic. n. est spirandi artifex/ & *Flabellum.*
aeris officina: unde alitur anima sicuti cibus corpus/ hic *Uentilabrū.*
circa cor/ pectoris cōcauū replet quinq; suis penulis/ siue lobis: *Pneumon.*
quarū duę sunt a sinistris: & tres a dextris magis: ex istis tribus: *Lobus.*
una est alius minor/ dorso h̄rens quasi i medio q̄ paruas habet si-
stulas: sed nullum fere motum: & h̄c est culcitra ascendenti chilis:
& iuxta istam penulam uersus superius est etiam certa adenosa
caro: quę est simul eū p̄dicto lobo culcitra seu stragulū p̄dicti/
etę uenę: & h̄c caro est notabilis magnitudinis & ab auctoribus
uocatur Morum & Timū: et a uulgaribus nominatur Animel/
la et lacticinū: et est in cibariis usitatis saporosi gustus/ maxime
illa quę reperitur in Vitulis et hedis lactantibus. *Culcitra.*
Stragulum.
Morum.
Timum.
Animella.
Lacticinū.

¶ Pulmonis substantia/ mixta est ex carne rara/ leui/ leni et ru/ bea ad albedinem declinans/ similis sanguinis coagulatę spumę: et ex tribus uasis seu sistulis: p̄ oēs eius partes irretitis: eodē modo quo in hepate sunt rami uenę chilis & portę: h̄c cōpositio/ est fauo mellis et etiã spōgię similis: ideo est sanguinis et aeris capax. Est. n. pulmo ceu quoddā prōptuariū aeris ad cor/ ambobus motibus/ dilatatōis uidelicet et cōstrictōis famulari aptus.

¶ Sua quidē caro rara est: ut in eo cōtinue multus sit sanguis et aer. Multitudinē sanguinis indicāt duo uasa/ in ipso/ illū cōtinentia/ q̄ in pulmone sunt maiora q̄ in alio mēbro sibi pari/ corde ac hepate exceptis/ in quibus uasa sanguinem continentia/ maiora sunt/ nō pp se qdē: sed quia oibus mēbris sp̄m et sang. tribuūt.

¶ Hic sanguis in pulmone est multus/ q̄a pp motū cōtinuū re/ soluit ex eo abūdās copla/ cui multitudo resistit cōtinue: et ē subtilis: ut cito ad oēs pulmonis penetret ptes ad eū nutriendū. Et etiã subtilis/ ut leuis sit/ ne grauitate ipediat pulmonis motū.

¶ Multitudinem etiam aeris in ipso semper esse indicat animalis longa in aqua absq; suffocatione submersio: et longē ac continuę

E

DE ANATOMIA

uocis et flaminis emissio/ab acceptiōe noui aeris impediens/aut cum quis eū abhorret propter foetorē uel alias causas. Hic tamē aer in submersiōibus et in foetoribus prēdictis cōseruatur in ore et in faucibus:adiuuātibz Tonsillis cum suis pelliculis.

¶ Huius aeris cōtinue attracti iuuamentum est ut ab eo prius alterato cor refrigeretur et cōtemperetur in necessitatibus: et etiā ut euentetur cor ne suffocetur:eius etiam utilitas est ut ex ipsius nō modica parte generētur spiritus pro esse et bene esse necessarii:et iuuamentum expulsiōis aeris attracti superfluentis calidi et fumosi/est ad introitū aeris minus calidi/in pulmone prius et in mēbris per quē meat alterati.

¶ Hic fumosus aer tāq̃ superfluitas spiritus adusta perpulsantem uenam in tracheę ramis pellitur in cordis constrictione: et hinc postea adiuuante pulmonis systolatiuo motu / per tracheam et per nares et os exit ab animali.

¶ Aer uero ingreditur ad cor alterationis habet initium/in naribus:in ore.in faucibus:in trachea & i Ramis ipsius:dispersis in pulmone pari ordine quo nutriendus ex cibo & potu habet in ore in gula & uentriculo/ac hepate.



¶ Pulmonis .n. in aere alteratio cōparatur hepatis alterationi in chilo/ab hepate.n.ex chilo fit sanguis:qui integrā in corde cōcoctionem suscipit/a pulmone uero preparatur ex aere spiritus/qui uere in corde uitalis fit/hic supiora petens/in mirabili rete seu in minimis arteriarū ramusculis iuxta cerebrum iterum alteratur:inde cerebri intrans uentres integre uere animalis spiritus efficitur/qui lucidus/leuis & purus/est spiritus.

¶ Caro etiā pulmonis leuis est/ne ipsius motū impediatur: est etiā lenis:ut eius uasa a ruptura tueatur:& est rubea clara/ad album declinans/propter aeris dominiū super illud:quo nutritur:& etiā propter eius frigiditatem.

¶ Hanc pulmonis substantiam uelat pāniculus rarus ex pluribus mēbranis a suis fistulis / & a pāniculis pectoris enascentibus quo mediate sentit.

¶ Pulmonis fistulę sunt tres/una ipsarū/sicut & alię/semper minuendo/ad oēs eius partes usq̃ ad inuoluētem pāniculū inclusi ue/a farynga seu epiglottide p partē anteriore colligulę unita descendit/hęc est dura:& semper aperta:ac etiā aliis maior:& est ex

pluribus cartilaginibus cōposita/ quāq̃ q̃libet una est iuxta aliā
per pānicularia ligamēta unita: & hęc uocatur trachea: & aspera
arteria: & laringa: & brōchiū/ suę cartilagine in pulmone inte/
grę sunt: & etiā ānulares: in collo uero sunt incompletę: & C. for/
mes: A sua magnitudine & figura/ iudicat̃ i earū creatu an ulce
ra sint in pulmōis partibus extremis/ uel mediis/ uel in collo.

Trachea.
Aspera arteria.
Laringa.
Brōchiū.

¶ Inter has cartilagines: & i tota trachea itra & extra ē pāniculus
medię substātię pfecte circularis: faucib? & ori alligat? i quo sūt
uilli/ tracheā elōgātes & abbreviātes/ i pulmōis & ipsius tracheę

¶ Huius pāniculi iuuamētū ē etiā has cartilagine (motibus.
tueri ab extraneoꝝ ingressu: & egressu: est etiā uocis lenitiuus.

¶ Hęc fistula nō sanguinē: ut alię: sed solū aerem ducit/ per hanc
etiā solam extranea in pectore contenta expurgātur: ingressa
ipsam tempore dīlationis pulmōis per pāniculū Rartū ipsum
inuoluentem. Ideo fit ad os/ & extra saniei ac aliorum extranco/
rum: non molestato corde expulsio.

¶ Hęc fistula etiā inter alias situm medium possidet: A dextris
eius est uena quīeta/ a sinistris uero uena pulsans. Pulsans tamen
in anteriora extra Cor immediate pulmōis substātiā ingredi
tur/ ne propter eius motum (quia subtilis est) soluatur: Non pul
sans uero uena/ quia bitunicalis est & ualida/ nō immediate pul
monem ingreditur/ sed circūdans prius tracheam in posteriora
tendens pulmōem etiā intrat.

¶ In hoc solo uiscere non sine causa pulsans uena cum non pul/
sante substātiā & cōtentū cōmutauit. Nō pulsans. n. uena arteria
lis dicta: in aliis mēbris simplex/ i pulmone bitunicalis est. primo
ne rūpatur/ pp eius cōtinuū motum/ secūdo ut etiā sanguinem
subtilem cōtineat/ pulmōis carnem & etiā tracheā cibantem.

¶ Pulsans uero uena arteria uenalis dicta. simplicis est tunice/ in
motu agilis/ ut breui spacio dilatationi & cōstrictioni serulat/ hęc
aerē ad cor ducit & educit/ in ista ē etiā spirituosus sanguis: ut ali
quibus placet/ etiā pulmōē nutriēs/ magis tñ eū uitalitās: sui ra
mi unīfūtur/ seu coasomātur cū ramis tracheę: p quos pulmo cor
di aerē dat/ cor uero nō ingratū uitā ei & nutritionē donat.

¶ Huius uenę ramī adeo angustī sunt: ut per eos nō penetret ad
tracheā sanguis: Et ideo aerī sunt peruli/ & sanguini inuili/ qui si
notabiliter aperiātur/ ab eis ad tracheam fluit sanguis: & forte: ut

E II

DE ANATOMIA

aliquibus placet / a ramis nō pulsantibus uenę / etiā in tracheā fluit sanguis / quo fit sanguinis sputum / absq; pectoris uenarum solutione: Vena tamen pulsans ad hoc magis apta est .

¶ Vnūquodq; predictoꝝ uasoz / in primo pulmonis ingressu in quinq; diuiditur ramos per omnes eius partes semper minuēdo: & ramos multiplicādo: duo sunt ī sinistris: & tres a dextris / quorū minor cęteris / ad paruū lobum / in dextro magis dorso herētem uadit / qui ut supra diximus / stragulū est ascendēti chili .

¶ Pulmōis figura ē bubalinę ungui similis: Numero aliq; putant q; sint duo membra ī unum unita: taliter q; apparet unus pulmo cum quinq; lobis: similes ī duas diuisas partes: ut lesa una: altera firma maneat: ī posteriori longior est q̄ ante / septi trāsuerſi sequēs situm: Numero est unus / ipsius quātitas / situs: & colligantia parent: Sua complexio ē calida / ex parte sui contenti & loci: accidē taliter tamen propter flegmata in eo existentia ponit frigida: sua iuuamenta sunt preparatorie & latorie seruire cordi: seruit etiam anhelitui & uoci / pariter & loquele: & suus paruus lobus famula / tur ascendenti chili. Passiones omnium modorum patitur.

¶ De Anatomia aliquaz partiū colli & uenarū pulsantū & quētarū ab hepate et a corde ascendētū usq; ad caput & manus inclusiue.

u Iſis p̄dictis in partiali sectione primo occurreret trachea & epiglottis & etiā gula. Hęc tamē de p̄ſenti nō possunt bene uideri nisi p̄ponat aliquaz colli et faciei partium anatomia: quibus uis de p̄dictis fiet sermo. Expedito igit pulmone: ipsius aliquā supremā partē carneam pro uidēdo troncho tracheę arterię reliquū deponendo serua / excepto quinto ipsius lobo / qui dorso heret. Serua etiā certā glādulā sibi propinquam: q̄ mox et timū uocat: ut super his uideatur situs chilis et arterię ascendētis: qbus hęc duo mēbra sunt stragulū. Cor etiā: et ipsius capsulā / ac p̄aniculū mediastinū: et uentriculū simul ac septuū trāsuerſum seruabis in locis suis propter alia de eis inuelliganda: ¶ Iſtis seruatis melioris ordinis gratia primo de collo sermonem aggredior: et dico collum esse mēbrū organicū nobile et ualde necessariū homini pp mēbra in eo ptēta / quod teste Aristo. 3. de

Collū quid ē
propter quid.

partibus cap. 3. est factū pp tracheā pulmonī serulētē & pp gulā.
¶ Sed Gal. 9. de iuuam. cap. 1. dicit q̄ est principaliter pp pulmo/
 nē/ quoniā carētia collo catent pulmone: ut pisces/ subdit tamen
 q̄ collū est uia illoꝝ mēbroꝝ q̄ descēdunt ex sup̄iori ad inferius:
 & illoꝝ quē ascendunt ex inferiori ad sup̄erius: quē descēdūt sunt
 nerui/ gula/ aliqui muscoli & nuca: Ascēdētia uero sunt uenę pul/
 santes et quietę: & nuca cōtinetur a sphondylis: ut sit tutta a no/
 cumētis extrinsecis: & illud uacuū quod est iter partes uenarū &
 arteriarū implet p glādulas ibidē existētes: & oīa ista custodiūtur
 a cooptoriis et ligamētis: deinde oīa tegūtur cute: & illud quod
 cōponitur ex oībus istis est collū/ quod ē posītū propter cānam
 pulmonis/ per quā fit uox & anhelitus/ collū etiā i aliquibus ani/
 malibus est loco manus/ quia capiunt cibum ex terra adiuuāte
 collo propter longitudinē suorū pedū. Huiusmodi uero collum
 principaliter nō est nisi propter cānam pulmonis: & ipso mediā/
 te ad brachia & ad palmas & ad diaphragma & ad alia membra
 duce nuca tendunt nerui/ & ideo propter originem neruorū fue/
 rūt positi sphōdylī inter pectus & caput/ ex qbus cōponit collū:
 hęc Gal. qui tamen nō dicit an trachea ascēdat uel descēdat: &
 quāuis dicat gulā descēdere forte quod etiā ipsa ascēdit/ nec suus
 descēsus pōt probari magis quā ascēsus: neq̄ tracheę: quia mani/
 festū nō habēt ortū/ sicut uenę: & arterię: & sicut nerui.

¶ Dicamus igitur collū de presenti summi pro illa parte/ super
 qua substinetur & uertitur caput/ q̄ seruit uētri sup̄mo/ medio: &
 etiam inferiori mediātibus neruis a cerebro & a nuca descēdenti/
 bus: cuius situs est ante a furculis sup̄ioribus pectoris: & posterius
 a sup̄mo sphōdylī costarū: & a lateribus ab humeris supra usq̄
 ad os capitis: basilare dictum: & cōmuniter pars ipsius posterior
 ceruix dicitur: de qua alibi fiet sermo. Anterior uero uocatur col/
 lum: & ab aliquibus Guttur: & quia hoc mēbrū est principaliter
 propter tracheā/ ipsa erit nobilior harū partū: propter cuius no/
 bilitatē anatomia colli est secū ponēda: & quia trachea ē pars pul/
 monis: q̄ est de principalioribus partibus uētris mediū antedicti:
 Ideo anatomia colli de p̄senti uenit cū anatomia uētris mediū.

¶ Hęc pars trachea noiata a multis dicit Guttur/ & farynga: licet
 faryngē/ secūdū aliquos sint uenę quę irumescūt in magnis uocl/
 bus: & istę uenę a Celso granges & fragitides dicūtur: & ab aliqui

Trachē.
 Guttur.
 farynga.
 Branges.
 fragitides.

DE ANATOMIA

Sfragitides.
Guldez.
Apoplexie.
Somni.
De istis.
Spermatice.
Iuueniles.
Iugulares.
Organice.
Sagorides.
Carotides.

Jugulum.
Gula.
Clauis.
Clidas.
Clidia.



bus sfragitides: et istę uenę apud arabes uocatur guldez: et apoplexie et somni: et ab aliquibus pēiles/et spermaticę/et iuueniles/et iugulares/et organice: et a Gal. in libris de utilitate partiū uocatur sagorides ga sunt iusta uia cibi: et ab aliqbus carotides siue somni. Celsus tñ solas arterias ibidē existētes uocat carotidas a caros dicte/ q̄ ē somnus/ ga ut plurimū secūdū aliquos/ i ramis istarū arteriarū sit oppilario causans somnū et etiā apoplexiā.

¶ Et istarū uenarū / utrinq̄ est una imediate sub cute / quę cōmuniter dicitur guldez manifesta: utrinq̄ etiā infra aliquos musculos notabiles collis: est una uena quę dicitur guidez occulta et profunda: quę arterię carotidę est socia.

¶ Istis arteriis et uenis profundis utrinq̄ associatur unus neruus notabilis magnitudinis / qui dicitur descēdens / a quibus utrinq̄ oriūtur reuersiul / de quibus omnibus parum infra fiet sermo.

¶ Pars etiā anterior colli ab aliquibus dicit iugulū: et ab aliquibus gula / licet male / quia gula est uia ciborū et potuū: et iugulū est ea pars / quę est imediate supra furculas supiores pectoris: Aliqui tñ uocāt furculas p̄dictas iugulū / et clauē / et clidas / et clidia: harū furcularum extremitas uersus spatulas dicitur Epomis: altera uero pars uersus medium pectoris uocatur paraffagis.

¶ Notatis p̄dictis / occurreret post cutem anatomia musculorū mouentiū collū & caput / sed nō possumus ipsorū habere inuestigationē integrā / nisi destruat istorū neruorū uenarū ac p̄dictarū arteriarū anatomia. Ideo super his ponat silentiū: remittēdo legētes ad Gal. ad Auic. & ad alios auctores. Hi. n. musculi sūt multi numero & diuersimode locati: & ideo essent cum diligētia uidendi: ad inuestigationē quo & ipsis solis esset uacandū: quia cū diffcultate anatomizārū & pp hoc Gal. xii. de util. partiū. c. viii. ubi loquit de istis musculis / dicebat. P̄exercitari cōgruit diligēter eū / qui studet certitudinaliter assequi ea quę hic dicūtur. Dicit ēt ibidē / q̄ solus sermo nō sufficit i anatomia / sed requirit tactus & uisus. Et ideo ad p̄dictos auctores sit refugiū / quia soli collo & capiti esset uacādū / in quibus sunt musculi multi / tam circa sphondylos quā alibi / qui in cōmuni anatomia uideri nō possunt.

¶ Capiti. n. mediante collo cū suis ossibus & musculis sunt multi motus / quorū aliqui teste Aulc. primi sunt proprii capitis: & aliqui cōes ipsi & quinq̄ sphondylis colli / per quos est motus.

cōpositus ex declinatione capitis & colli simul / & isti motus aut curuāt antērius / aut posterius / aut a dextris / aut a sinistris : & iter ipos est motus cōuersionis seu circūductionis : & isti muscoli sunt multi / quoniam multiformis est eorum positio : & magni quia magnos & fere continuos habent motus : & ideo Gal. ubi supra dicebat ipso undiq; circū dare caput / quod mouent ad quācūq; partem uolueris illud declinare : De numero ipsorum est discordia inter Auic. & aliquos sibi socios contrariantes.

Relicta igitur ipsorum partiali inuestigatione / cutem a lateribus colli scinde / denudando laterales & anteriores musculos / supra quos imēdiate sub cute notabis uenā guidez manifestā : quā seruasti illesam / seca deinde illos musculos magnos ab auribus descendentes oblique usq; ad furculas superiores uersus mediū pectoris / sub quibus utrinq; est una glādula interdū maior uni q̄ alteri : ad formā quasi amigdalę : quę est replens loca uacua ibidem inter uenas & artarias iuxta inferiorē partem epiglottidis existētia. Et ideo equatrix partium colli dicitur : quas etiā humecrat in necessitatibus : Notabis etiā sub istis glādulis utrinq; unam uenam guidez notabilē : & pariter unā arteriā sibi sociā / quę dicitur occultę / & apoplecticę / quarū noīa multa superius dicta sunt.

Iuxta prędictas arterias & uenas notabis etiā utrinq; unū neruū / pluribus uillis cōpositū : hi nerui uocantē descendētes : & ab his oriūtur nerui reuersiui / de quibus infra fiet inuestigatio pulchra.

Nerui descendentes.

Istos ueruos / & ramos arterię p̄dictę : & utraq; uenā : occultā .s. & manifestā / serua usq; quo uidisti uenas & artarias a corde & ab hepate ascendentes usq; ad istū locū : ad quas uidendas opator circa regionē gibbi hepatis iterum reuertatur : & ibidem notabit magnum truncum uenę chilis ascendētis / quę in suo ascēsu primo perforat septū transuersum : & ibidem utrinq; plures emittit uenulas / quarū duę septū trāuersum cibant / alię uero / costas inferiores : & membra sibi uicina nutriunt.

De uenis & arterijs ascendētibz.

Etius uero pergrandis ramus ascendens usq; ad cor unde quaq; solutus / sine arteriā sibi sociā tendit : & per istum ramum : hepatis gibba pars euentatur : & forte uiuificatur.

Hic ramus tripartit / unus quorū aliis satis minor / circa cordis radices igredit : & p̄ substantiā ipsius disseminat : & ipsam nutrit.

Uena nutritio Cor.

E IIII

DE ANATOMIA

*Ex his vena i
Cor.*

*Vena Arte/
riale,*

*Arborum.
Lignum.*

*Vene nutrien
tes mamillas
& portantes
materiã lactis*



¶ Alter aliis maior/ domicilio cordis dextro unltur & ei copiosif
time sanguinem affert.

¶ Ab isto ramo secundum aliquos illa uena/ quę pulmonem nu
trit dicta arterialis trahit ortum: de his tamen uenis aliqua dixi/
mus in cordis sectione.

¶ Tertius ramus ex predictis/ q̄ etiã insignis est/ a cordis regione
etiã supra ascendit / sub quo est certa caro glãdosa dicta mortũ &
timũ: & hęc simul cũ quinto pulmonis lobo: qui dorso h̄eret ut su
pra diximus est culcitra p̄dicto ramo ascēdenti usq; ad sup̄mã
pectoris furculã/ ubi in duos hęc uena partit ramos: a dextris & a
sinistris trãsuertē uersus spatulas tendentes. Isto etiam modo ma
gna arteria dicta Aorta ascēdens/ tendit trãsuertaliter uersus spa
tulas: & ut melius uideas istas uenas & arterias depone furculas
superiores: **Caute** tamen ne membra sibi uicina soluas.

¶ Istis expeditis/ p̄dictas uenas & arterias uidere debes: notando
primo: q̄ harũ q̄libet in duos p̄tis ramos/ unus quorũ tã uenę q̄
arterię utriq; p̄ collũ uersus caput ascēdit / a quibus oriuntur oēs
uenę colli guidez dictę: quas seruabis postea melius uidendas.

¶ Alter Ramus etiã utrinq; in quinq; diuidit partes / unus eorũ
nutrit sup̄iores costas: & unus spatulaz locũ: & un⁹ musculos sub
mersos colli/ & unus penetrat in sphondylis colli sup̄ioribus/ & in
de ad caput trãsit: & istos p̄comitãtur rami pulsantis uenę.

¶ Alter ramus oĩbus p̄dictis quinq; maior ad ascellã tēdit: & hie
in quatuor partit ramos: eorũ unus in musculis supra pectus loca
tis qui spatulas mouent spargit / & unus ingredit in carne laxa:
& i certis p̄aniculis ascellaz/ & unus trãsit a sup̄mo pectoris circa
mamillas descendēdo uersus abdomen: & hic secũdũ aliquos nu
trit ipsas: & pro pte eis porrat materiã lactis: & hic i abdomine co
pulat (ut alibi diximus) cum uena ascēdente ab inguinibus & a
matrice ad mamillas & de isto ramo Gal. xliii. de util. c. viii. loq̄t:
dicēs q̄ a thorace tēdũt uenę ad hypochondria & ad totũ epiga
strũ & copulãtur uenīs/ quę ab inferioribus ferũtur ad matricē col
ligatiã habētes: ut qñ in matricibus auget aĩal: illi irrigent nutri
mētũ quo nato rursus mamillas iflant / qua propter nō p̄tingit
mēstrua fieri bene & lactare simul.

¶ Alter uero ramus predictis maior in tres utrinq; partit ramos:
unus tēdit ad musculos qui sunt in spatulis: & unus ad musculos

ascellæ: alter uero p̄dictis maior tēdit p̄ partē domesticā uersus
adiutoriū: & hinc ad paruā manū uadit/ hic ramus uocat̄ ascella
ris/ & basilica/ q̄ phlebotomatus i pectoris morbis cōfert pp̄ suā
colligatiā propinq̄ ad ueras costas & ad totū pectus: hęc etiā ue
na dicēta uulgarib⁹: uena hepatis/ q̄a ē ipsi p̄pingor q̄ cephalica.

Ascellario.
Basilica.
Uena hepatis.

Ex primis uero ramis/ quos dixi te seruare/ a q̄bus sūt guidez: *Guidez manifestæ & ocul*
utrinq̄ unus ascēdit: & anteq̄ multū ascendāt/ in duas utrinq̄ di
uidūtur p̄tes: una eaz̄ uocat̄ guidez manifesta: q̄a est prope cu
tim uideri apra de facili/ q̄ i uiuo itumescit i forti uoce/ altera ue
ro q̄a ē i fra aliquos musculos/ uocat̄ guidez p̄funda & submersa.

Et guidez quidem manifesta illico cū supra furculā ascendit:
utrinq̄ diuidit̄ in duas partes/ quaz̄ una ascendit/ alia uero circa
furculā inuoluit̄/ a qua plurimi rami enascūtur/ p̄tes sibi uicinas
nutrientes/ & istoz̄ ramoz̄ aliqui iterū ascendūt: & cū p̄dicto pri
mo ramo guidez manifeste iterū unīūtur/ sed anteq̄ unīāt: unus
ramus notabilis ab spatulā tendit: & per exterius sub cute adiuto
rii/ usq̄ ad paruā manū terminat̄: & hęc spatularis/ humeralis: &
cephalica uocatur/ quia a capite ducit propter colligantiā proxi
mam/ quam habet cū sua guidez/ quę caput nutrit: de ista tamē
uena cephalica: & etiā de basilica: & de arteria sibi socia/ dicetur
latius in anatomia particulari magnę & parue manus.

Spatularis.
Humeralis.
Cephalica.

Et guidez manifesta p̄dicta utrinq̄ notabilis est immediate sub
cute/ supra musculos colli/ q̄ cū suis ramis nutrit mādibulā supio
rē: & i feriorē: & liguā/ & caput p̄ exterius circa aures ascēdēdo.

Iuamenta
guidez mani
festæ.

Et aliqui uolūt q̄ isti rami guidez manifestę q̄ sunt circa aures
nominentur uenę spermaticę/ quia dicūt ab ipsis uenire sperma
a cerebro/ & isti sunt moti a dictis Hipp. i libello de aere & aqua:
qui dicebat: quibuscūq̄ uenę post auriculas scidūt: p̄i ultra pror
sus ab omni generatiōe orbātur/ sunt tamen aliqui/ qui putāt ta
les uenas eē ex ramis guidez p̄fundę/ q̄ nutriūt musculos inter
primū & secundū sphondylū colli existentes/ & aliqui/ qui dicūt
Hipp. itelligere p̄ uenas/ ipsas arterias/ quia sunt magis aptę ad
bonū sp̄ma q̄ uenę/ ibidē tñ Hip. dicit sp̄ma etiā uenire a toto: &
Auic. xx. tertii cap. iii. dicit quod Gal. nesciuit an incisio harū ue
narū faciat i currere sterilitatē an nō: dicit tñ mīhi uero uidetur q̄
nō oportet ut sit sp̄ma ex cerebro solo/ quāuis eius fomētū sit
ex cerebro/ p̄ bonā tñ anatomia uasoz̄ spermaticoz̄ elicif qd̄ harū

Nota de ve
nis spermaticis
ab Hippo.



DE ANATOMIA

Iugulamenta
Guidez pro-
fundae.

Torcular.
Platea.
Fovea.
Palmentus.
Lacuna.

Arteriae caro-
tides & suae
ascensae.

uenarū post aures incisio nō facit steriles pp spma per ipas descēdens: possunt tñ istę uenę icisę debilitare cerebrū raltier q̄ debite nō trās mittat spiritū animalē pro cōceptione: & hoc magis possunt facere guidez profundę q̄ manifestę / & Arterię magis hoc possunt q̄ uenę / q̄a sunt spiritus asserētes / utriq̄ tñ est possibile.

¶ Guidez uero profunda utrinq̄ iuxta meri siue gulā ascendit infra musculos p̄dictos / quos secasti: & in suo ascēlu emittit ramos Gulani & musculos faryngę nutriētes. Nutriūt etiā musculos existētes inter primū & secundū sphōdylū colla: a qbus oriūtur secundū aliquos uenę spmaticę ab Hipp. recitatę / q̄ sunt post aures / de qbus adhuc sub iudice lis est. Nutriūt etiā p̄craneū: p̄ ipm ascendēdo ab imo usq̄ ad summū capitis: & ibi p̄forādo craneū / descēdūt i durā & piā matrē. eis portādo aliqđ nutritiū.

¶ Ex p̄dicta etiā uena profunda oriē ramus unus utrinq̄ os basilare p̄forans in directo commissurę lambdę: & sublentatus a dura matre ascendit usq̄ ad capitis sūmū: & ab isto ibidē multi exeunt rami per poros cranei: qui etiā nutriūt p̄craneū / ex p̄dictis tamē ramis ascēdentibus intra craneū cum dura matre maior pars trāsfit in piā matrē: Cū quibus etiā trāsēūt aliqui rami guidez manifestę p̄dictę a sumitate capitis ab extra ad intra craneū penetrantes: & ab hinc trāsēunt in substantiā cerebri & ipsam nutriunt.

¶ Ex p̄dictis etiā ramis aliqui in directo cōmissurę sagittalis & lambdę igrediūtur durā matrē ibidē duplicatā: & hic locus ē tāq̄ torcular / a quo ex p̄dictis uenis exprimūt sanguis in certū locum amplū ibi prope uersus exterius existētē: qui platea: fovea: palmētum & lacuna dicūt / circa quā platea: sunt certę uenę sanguinem in ipsam expressum sugentes / q̄ cerebri centrū ex eodē nutriūt: & istę uenę oēs itra craneū simul cum arteriis sunt illę: ex quibus fit rete dictum secundū: quod aliter uocatur pia mater.

¶ Arterię uero p̄dictę carotides nūcupatę in collo existētes prope uenas guidez profundas & neruos descēdētes: utrinq̄ a lateribus colli ascendendo / cū aliqbus ramis ante & etiā retro disperse tendūt: & ad linguā / & ad mādibulas supiores & inferiores: et in tota facie: et in occipitio: et aliq̄ notabiles circa aures in tēporibus: cū suis ramis ad cacumen capitis tēdūt: et aliq̄ etiā ad musculos tendētes circa iuncturā cōmunē collo et capiti disseminantur / ubi est magnū foramen / a quo exit spinalis medulla: ab istis

forte ramis Hipp. dicebat sp̄ma descēdere a cerebro/qa antiqui uocabāt etiam arterias uenas:et ideo dicebat Auic.xx.tertiū:has uenas cōtinuari nuchē:ut nō elōgētur a cerebro:in qbus est sanguis leuis lacteus/q primo uadit ad renes:deide postea ad uenas ad testiculos tendētes:et harū arteriarum unus notabilis ramus utrinq̄ pforat os basilare uersus anterius/et unitur piē matri ut/ talitando cerebrum:et portando spiritum ad uentriculos ipsius.



Ex isto ramo utrinq̄ ascenso immediate supra hoc os basilare secūdu medicine cardines sit rete mirabile:quod est secūdu ipsos notabilis magnitudinis.s. quod est ante/retro:et a lateribus.

De Rete mirabili.

Et p̄dictę uenę Cerebrū nutriendes in suo ascēsu debent sustentari ab aliquo corpore solido/ sicut est p̄craneū/et dura mater/ quia per se nō possent ascēdere/pp ipsarū simplicē et mollem tunicā:et sanguis in eis est magis aptus descēdere q̄ ascēdere/qa grauis est. Arterię uero nō appodlant alicui corpori solido/ sed p se stātes ascēdūt ad intra craneū/qa bitunicales sunt et durę.

Et nō fuit necesse eas ascēdere:et postea uertere sua capita infarius sicut uenę/qa suus sanguis leuis est:et ascēsu aptus magis q̄

Istę tñ uenę et etiā arteriarū aliquarū ramos melius uidebis in Anatomia mēbrorum subsequēntium.

Venarū substātia & arteriarū alibi dicta est. Sua cōplexio ex earū cōpositione iudicatur/ figura sua ē nota:colligātur toti corpori:sua magnitudo ē etiā nota/ sunt maiores ī uno corpore q̄ in alio. Situs tñ multarū earū sēpe uariat:et ideo ut alibi diximus aucthores de ipsis uidēt discordes:Numero sūt ipceptibiles:qa multę earū occultę sunt:Sua iuuamēta sunt cibare oīa mēbra. passiōes ēt omniū modorū patiūt. Sēpe tñ ipsis accidit coartatoria oppilatio a plectoria rectius plethora sang.cāta/ q̄ si fiat ī ramis uenarū guidez:semp seq̄ somni p̄fūditas:apoplexia:et suffocatio extre-



Ista uena guidez iterdū phlebotomat:Raro tñ ī regione et etate nostra/sua incisio cōfert leprę nō cōfirmate:et in forti squinātia/in acuto asmate:in cōstrictiōe anhelitus:in raucedine uocis ex supabūdāti sang.ī pulmonis apostemate euacuatiōis et diuersiōis gratia pro antecedēte cā in p̄cipio et augumēto:hęc tñ incisio uenę guidez est siēda a docta manu/cū phlebotomo habēte aliq̄ obstaculū ppe cuspidē ne p̄fundēt oīa latera uenę:qa hęc uenę sūt labētes ī tactu earū/qa nō sunt ānexę carni sicut

Instrumenta phlebotomie Guidez.

DE ANATOMIA

Modus phlebotomandi
guidez.



alię multę: tū ē p p glāduas molles & lubricas sub eis existentes: tū ē ne phlebotomus pūgar neruū uel alia mēbra ibidē locata: **¶** Modus aut phlebotomādi has uenas talis est, s. patētis primo stringat uēter inferior iter ilia & hypochondria cū zona decēter stringēte: teneat etiā os suū clausum in expellēdo aerē a pectore: deinde patēs declinet caput ad partē cōtrariā ptis phlebotomā dē/ quia sic faciēdo itumescit uena: ut corda extēsa: & cū istrumēto apto tenēdo uenā firmā cū manu uel alio ingenio debet pso rari uena in loco eminētiori: Authores laudāt sectionē talē fieri debere secūdu latū: ego tñ facerē secūdu obliquū/ & q̄ntitas sanguinis non sit supflua/ neq; fiat secūdatio: Et opator habeat secū pulueres sanguinis cōstrictiuos/ sicut bolū armeanū: sanguinē draconis: pilos leporis/ mumiā/ alias pissasphalthos: nō carnē humanā sicā qua utūtur moderniores/ cortices thuris/ aloes & similia: & inter omnia habeat uitreolū seu colcotar/ fuligo etiam laudatur & fabę cōbustę & charta/ et coria cōbusta & his similia/ superposito semper oui albumine bene cōtuso/ & sup oīa decenti ligatura: & patiente iacente capite eleuato/ per octo dies cum leui somno & decenti diēta/ pro ut uidebit Medico legitimo.

¶ De Anatomia Neruorū descēdētū & reuersiuorū.

Xpedita anatomia uenarū ascēdētū ab hepate supra:

c In qua etiā multa dicta sunt de arteriis ascēdētibus: ad neruos descēdētes a quibus oriūtur reuersiui redeo: & dico/ q̄ in partibus lateralibus colli parū sub auribus/ inter seu sub aliquibus musculis: sunt uenę & arterię notabiles: ut supra patuit/ quibus utrinq; hēret unus notabilis neruus descēdens uocatus. Hos neruos antiqui uocabāt apopleticos. & male/ q̄ nō cognoscebāt ipsorū opationes: teste Gal. in libro de uoce & anhelitu: & hi nerui a sexto pari neruorū cerebri principaliter & etiam a tertio oriūtur: & descēdunt perpendiculariter/ q̄oia taliter debent mouere membra.

Nerui apople
ti licet male.

Nerui descen
dentes.

¶ Hi nerui sunt cōpositi ex multis ramis/ quorū aliqui teste Gal. descēdendo disseminātur ad cor/ ad eius capsulā/ ad mediastinū: & etiā ad pectus in radicibus costarū: & quidā satis notabiles, ad os uētriculi: & ad diaphragma. & aliqui minores ad hepar/ ad splenē/ ad renes: & ad alia mēbra sensibilia uentriū inferiorū/ ad quę etiā uadunt aliqui nerui oblique descēdentes a nucha & ab istis

neruis descendētibz aliqui notabiles rami superius iterū refle /
ctūtur/qui Reuerſui & Retro redeſites uocātur/qui cōiter dñr
nerui uocist & tendunt uerſus epiglottim ſe alligādo certis mu /
ſculis ipſius/ quorū capita ſunt ad inferiora corporis ſita.

Nerui reuerſi
ui ſunt uocis.

C De p̄dictis etiā neruis deſcēdentibus: exceptis iſtis reuerſiuis :
aliqui rami deſcēdēdo uadūt etiā ad aliquos epiglottis muſcu /
los: quorū capita ſunt uerſus ſupius uerſa: & reuerſui ut aliquibus
placet cū ſuis muſculis claudūt carthilaginē cymbalarē & Glotti
dā: ſed muſculi neruorū deſcendentīū mouēt alias carthilagines
& etiā cymbalarē apiunt. A ſeptimo etiā pari & a nuca ueniunt
nerui ad muſculos epiglottis: teſte Gal. qui oblique eā mouent.

Cymbalarie.
Glottida.

A ſeptimo
pari ueniūt
nerui ad epi /
glottim.

C Iſti nerui ſunt duo/ unus dexter/ alter ſiniſter/ ſunt tamē i plu /
res uiſlos ſeu ramos diuiſi: ut patet pp mēbra multa. ad q̄ uadūt.
Sua quātitas & color patet/ ſua complexio & ſubſtātia eſt qualis
alioꝝ neruorū. Reuerſui tamē ſunt ſicciores & duriores/ q̄a hñt
ſufferre notabiles & quaſi cōtinuos motus/ maxime qñ claudūt
epiglottim/ ad quā clauſurā requiriť fortior motus q̄ ad aptionē
eius/ quia plures ſunt muſculi aptētes q̄ claudētes ipſam: motus
etiā cordis/ pulmōis & pectoris aperit ipſam: & ideo ut tales ner
ui ſint fortes/ natura elōgauit eos a cerebro humido/ a quo quā
to plus diſtāt/ tāto ſunt ſicciores: & tranſeūt prope cor circa arte
riā/ ubi forte pp ipſius calorē acquirūt ſiccitatē & duritiē: & ſunt
reflexi ad ſupius: ut trahendo inferius claudāt epyglottim/ q̄ qñ
relaxātur adiunātibz aliis multis muſculis aperit epyglottis.



C Situs ipſorū eſt a lateribus colli deſcēdēdo ad p̄dicta mēbra:
Sed nerui qui uocātur Reuerſui/ in parte ſiniſtra icipiūt reuerſi
ad ſuperius/ cū obuiant magne arteriē Aortē in loco parū ſupra
cor/ ubi primo talis Arteria biſurcať: & incipit reflecti per pectus
ad mēbra inferiora/ circa quē magnū ramū deſcendentē ſit mo /
tus attractiōis & relaxatiōis taliū neruorū: & iſta biſurcatio arte
riē ē iſtis neruis ſicut Rota/ ſuper qua cū corda hauriť aqua a pu
teo: & hic locus tam a ſiniſtris q̄ a dextris/ circa quē mouētur ſeu
cui inherēt in ſuo motu tales nerui reuerſui/ a Gale. uocatur
Dyablū/ & Flexor. Vocat etiā ab aliquibus Girgilus & Bachā:
& Gal. viii. de iuuam. cap. ii. aſſimilat iſtā neruorū reuerſionē illis:
qui cū equis in cāpo reuertūtur ad uiam a qua uenerūt prius: &
dicit q̄ eſt quaſi reuerſio rei ſupra Rotā paruā: & vii. de utilitate

Rota.



Dyablum.
Flexor.
Girgilus.
Bacham.

DE ANATOMIA

cap. xiiii. dicit / qd ipse primus omnium inuenit istos ueruos taliter si-
tos: & suos musculos capita eorum ad inferiora habentes.

Nota contra
Aristo.



Inquit etiam qd reuersio istorum neruorum monstrat neruos oriri a ce-
rebro & non a corde: ut putabat Aristoteles. quia si nerui orirentur a cor-
de: illi reuersui uenirent ab ipso & non a cerebro: ut sensui patet.

Et istis neruis reuersiuis partis dextre / natura fecit etiam Girgi-
lium seu Rotam illam quam fecit in parte sinistra / de uno satis notabili
ramo arterie ascendente obliquate uersus axillam dextram / circa fur-
culam pectoris superiorem dextre partis / que Arteria uadit ad bra-
chium dextrum / cui ramo adiunxit alias pelliculas ibidem existen-
tes / ut sit fortis / quia hic Ramus non est eque magnus / sicut est il-
le / circa quem reflectuntur nerui reuersui sinistri lateris antedicti.

Et sub isto ramo dextre partis a pelliculis predictis fortificato:
ascendunt per collum nerui Reuersui dextri: & tam dextri quam fini-
stri: ascendendo implantantur cum pluribus ramis ad musculos
epiglottidis: ut sensui patet / quibus mediatis uoluntarie mouetur
Epiglottis seu Laryngem / sicut equitans mediante freno & ha-
benis: quando uult / mouet equum.

Nerui uocis.



Iuuamenta neruorum predictorum descendunt / sunt dare sensum:
& secundum aliquos aliquem motum membris / ad quem uadunt in suo
descensu / de quibus supradictum est / & iuuamenta Reuersiuorum sunt
pro danda uoce / ideo uocantur nerui uocis. Passiones omnium
modorum patiuntur tam descendentes quam Reuersui: & si ipsorum com-
plexio notabiliter mutetur: ut interdum contingit in eorum detectioe
gratia ulceris / maxime descendentiis: & forte Reuersiuorum amitti-
tur uox & alie sue operationes: si non ab latere: saltem diminuitur: & si
soli Reuersui incidantur integre utrinque: amittitur uox & loque-
la: si uero in uno latere solo: medietas harum operationum leditur: sed
si incidantur descendentes / quorum Reuersui sunt partes secundum
aliquos ledentur illae quinque operationes: de quibus meminit Gal.
4. interiorum cap. xvi. s. exitus aeris a pectore cum anhelitu: & flamen
sine ictu seu strepitu: & flamen cum strepitu: & uox: & loquela. Vo-
lunt tamen aliqui: qd ad incisionem descendentiis amittatur sola
uox & flamen cum ictu. De istis tamen neruis uide commentaria nostra.

His uisis / dimitte neruos Reuersiuos in loco suo in collo: ut per
ipsos melius uideas musculos epiglottidis: quibus alligantur. Dimitte
etiam Ventricle partem superiorem: & totam gulam siue merum: & partem illam

pulmonis supiorē / quā seruasti pro trachea uidēda. Dimitte etiā talē partē uenarū & arteriarū ad brachia & ad caput tendentiū: ut ipsaū possis loco suo uidere anatomiā. Cor uero & alia mēbra inferioris & medii uentris / q̄ prius fuere uisa & seruata pro uenis: arteriis & neruis antedictis uidēdis: abiciās: & anteq̄ ulterius pro cedat in p̄senti ordine anatomię sunt aliqua dicēda de facie: & de aliquibus p̄tibus eius: deinde ad epiglottim & ad gulā deueniēdū.

¶ De Facie.

Acies a Romanis / a Gręcis Prosopon dicta / quę est soli ^{facies.}
f hominī / est pars āterior capitis oibus nota. Hęc pars ue- ^{Prosopon.}
niet magis anatomizāda cū uētre supmo quā cū me-
dio / sed per accidens de ipsa in p̄sentiariū fit sermo: quia in cōi
anatomia gula & Gutur nō possunt inuestigari: nisi prius de par
tibus aliquibus faciei fiat mētio: & diciē facias quasi faciens homi ^{facies unde.}
nē. Per ipsam. n. fit uniuscuiusq̄ p̄sonę cognitio: & distinctio.

¶ Hęc pars facies dicta uocatur etiā Vultus a uoluēdo: & a uolen- ^{Vultus unde}
do dictus / quia per ipsam cognoscitur animi affectus: in quibus ^{dicatur.}
ip̄ius mutatur color / uel propter uerecūdiā / uel p̄pter aliquod
crimen cōmissum: uel p̄p timorē / uel ēgritudinē. Sunt tamen ali
qui: quibus Vultus raro mutatur: & hi appellātur uultuosi.

¶ Mutatur etiā Vultus de etate in etatē: & differt facies a Vultu ^{Vultuosi.}
in hoc: q̄ facies stat semper eadem: & uultus mutatur: licet pro
etate facies mutet colorē: & quātitatem: & notitia faciei multum
cōsideratur a physionomo. Cōsideratur etiā a medico: ut primo
prognosticorū: in primis ēgrī faciē cōsiderabis. Iuuat. n. in cogno- ^{facies iuuat}
scendis multis morbis / sicut lepram / peripleumoniā / ictēritiā / ca- ^{in prognosti-}
cessiā alias cachexiam / & tempus menstruorū in scēmina. In ipsa ^{cando.}
etiā cognoscitur simulātes ēgritudinem / sed nō semper.

¶ Eius situs ē anteriori parte capitis capillatē subiectus. Sua sub
stātia est ex cute rariore & leniore quacūq̄ alia cute corporis / ua
porū a toto ad ipsam ascedētium & decoris gratia / sub ipsa cute
sunt multi muscoli / & uenę pulsantes / & quierē / nerui / p̄nīculi: li
gamēta / carthilagine & ossa: Numero ē unū mēbrū organicū.

¶ Numerus partiu ipsius ē Frons / Tēpora / Aures / Supercilia / in
terciliū / Nasus / Oculi / Palpebrę / Cilia / Maxille / siue Mā
dibulę / q̄ in p̄senti sunt synonyma / Os / & Bucca / Labia / Gelati
ni / Mystax / Lacuna sub naso: & Mētū cū sua Lacuna. Sua quāti



DE ANATOMIA

tas/sua figura/& colligãtia patent:sua cõplexio est qualis cõplexio partiũ ipsius: iuuamenta sua sunt etiã ab ipsius partibus sumenda. Passiones omnium modorum patitur.

¶ De Frõte:& aliis faciei partibus/exceptis Naso/Oculis/Palpebris/Ciliis/& Ore cũ suis partibus.

Frõs ⁊ unde
dicatur.

f Rons est tota ea pars media suprema faciei pilis nuda: quę est supra oculos: ab aliquibus tñ dicit̃ oculos esse in frõte:& ideo teste Varrone dicit̃ frons a foratu oculorũ.

Ruge i frõte.

¶ Sub cute frõtis est unus musculus dilatatus uillos suos habēs secũdũ lōgũ corporis/quibus mouet supercilia:in frõte etiã sunt rugę secũdũ ipsius latũ tēdentes:secũdũ quãrũ situm errabundi medici secāt exituras/sed male/quia tunc cadunt supercilia. De bent igitur fieri sectiones in fronte secũdũ longũ corporis.

Uene i frõte.

¶ In fronte sunt uenę aliqũę/quę in diuersis morbis secantur:& Sanguisugę etiã ipsis applicantur sub musculo prædicto & panniculo pericraneo est os frontis coronale dictum.

¶ De Temporibus.

Unde dicant̃
tempora.

¶ Ad latera frontis sunt tēpora sic dicta:quia in ipsis cognoscitur anni multorũ aialũ. Primo.n.canescũt in homine:sed nō semper. Cauãtur etiã diuturnitate tēporis:in tēporibus sunt ossa parua oblōga per trãuersum capitis tendẽtia/quę intra se & craneũ custodiũt musculos tēporales:hęc ossa ab Auic.ossa paris dicũt̃:& ultra; prædictos musculos in tēporibus sunt etiã aliqũę arterię et uenę insignes/quę in aliquibus morbis secantur.

Ossa paris.
Uene in tēpo
ribus.

¶ De Supercillis.

¶ Supercilia sunt omnibus nota/quorum situs est in fine frontis:congenita sunt cum homine ornatus causa/intenta a natura ut tueantur oculos a puluere descēdente:& a pluua & a similibus:nō crescunt sui pili/sicut hi qui capitis:gratia boni finis.

¶ De Intercillis.

Interstitiũ.

¶ In confinibus frontis est certũ interstitiũ diuidens supercilia in ipsorum medio. Diuidit etiã frontem a naso:& huic parti tãq̃ ad centrum cõterminatur nasus & infima ac media pars frontis:hic locus uocatur Glabella siue Glabra. Glaber.n.dicitur sine pilis:hic locus etiã dicitur lepor nasi. In isto loco incipit sepe herispila uel herispella sed rectius herispellas:alio nomine a iunioribus uocata Guta rosea.

Glabella.
Glabra.
Glaber.
Lepor nasi.
Herispella.
Guta rosea.

¶ De Malis.

¶ Male sunt illę partes rotundę in facie: quę etiā poma dicuntur: & sunt infra oculos a lateribus nasi: & sunt soli homini: & genę proprie uocantur. licet maior pars faciei nominetur gena huius partis: cutis est rarior omni alia faciei parte / quę defacili rubet & mutat colorē suū naturalē in animi affectibus / qui cōiter in bene complexionatis est roseus: istę Male ornant faciem & sunt tutela ad oculos & ad nasum: & quęlibet ipsarum habet unum muscolum latum firmissime suę cuti unitum: qui seruiunt ipsis & labiis: ut inferius in sectione labiorum dicetur.

Malae.
Poma.
Genae.

¶ De Barba Gena dicta.

¶ In facie est etiam pars barbata / quę proprium habet nomen & uocatur gena a gennao uel genero / quia ibi pili generantur. Hęc pars etiam ab aliquibus dicitur Mistax siue Mustax.

Genā.
Mistax.
Mustax.

¶ De Mento.

¶ In inferiori parte faciei est mentū ab eminēdo dictum. Dicitur etiā anthereon. A gula. n. eminetia quo dicit morbus mētagra: Sua pars suprema incipit a radice superioris labii: & finē habet ī infima faciei parte: & propter talem locū potest dici mentū. quia infimi in cunctis rebus: si nō sunt: debent esse mites.

Mentum.
Anthereon.

¶ In medio menti: est certa cavitās ab aliquibus buccula & buccella dicta: dicitur etiam typos.

Buccula.
Buccella.
Typos.

¶ De Gelasinis.

¶ A lateribus oris utrinque in cute in aliquibus indiuiduis: & maxime in pueris & in sceminis est certa fossula / quę apparet in risu: quę indicat decorem & uenustatem: & ideo uocatur talis fossula Umbilicus ueneris & Gelasinus: uocatur autem umbilicus ueneris: quia assimilatur concauitati repertę in foliis illius herbe: quę uocatur umbilicus ueneris & cotyledon.

Umbilicus
ueneris
Gelasinus.
Cotyledon.

¶ De Lacuna sub Naso.

¶ Sub naso ī medio labii inferioris: ē certa uallecula / quā Lactāti Firmianus pp similitudinē suę cavitatis: uocat lacunā / ab aliquo dicta phyltron: et spheriō: et hyspia: De naso: oculis / ciliis / palpebris / ore et suis partibus loco suo dicitur / ad anatomia oris initium sume

Uallecula.
Lacuna.
Phyltron.
Spherion.
Hyspia.

¶ De Anatomia Oris & partium eius.

¶ T igitur trachea: epiglottis: et Gula possint inuestigari cōmodē sicut pmissimus / ad oris et partium ipsius sectionem

Quid os et
vñ dicatur.

F

DE ANATOMIA

deuenio: & dico: q̄ os est illa pars cōcaua in facie imēdiate itra labia existens: p̄ quā primo cibus: et potus: et pro pte Aer intra corpus ingreditur: et p̄ quā exeūt sputamina: et uoces: et in qua fit loquela: et dicit̄ os quasi ostiū ad p̄dicta itra et extra mittēda.

Bucca.
Buccae.

¶ Bucca uero seu buccę sunt illę partes in facie seu ore: quę naturaliter a spiritu possunt inflari. f. ipsa cōcauitas oris / quę spiritu a pulmone reuocato: et oppressis labiis in ore retento inflatur.

¶ Oris partes sunt labia: dētes / gingiue / maxillę / palatū / uuea / lingua: tonsillę: et fauces.

¶ Ex p̄dictis patet oris substantia: situs & figura: quātitas sua oībus nota est: Numero est unū mēbrū: Numerus p̄tiū ipsius dictus est. Sua colligātia sumit̄ a p̄tribus suis / Et etiā sua iuuamēta. Sua p̄plexio est q̄lis sunt suę p̄tes: passiōes omniū modorū patit̄.

¶ De Labiis.

Labia.
Labia.
Prochilū.
Prostomion.
Prostoma.
Brochi.

Abia quę etiā labra dicunt̄: aliquibus sunt grossa / aliquibus subtilia: grossa cōmuniter arguūt igeniū ruditatem: labiorū pars prominēs prochilū noīat̄. Eorū dē p̄tinuus cōgressus: prostomion uel prostomia dicitur: & hi quibus prominent labia simul & dentes: brochi uocant̄: in medio labiorum est fissura: quę proprie os appellatur.

¶ Labiorū substantia est cōposita ex carne musculosa: cute & p̄aniculo gulę p̄tinuo: harū partiū unio est taliter cōpacta q̄ difficillime unū seperati potest ab alio: & est talis: ne p̄p grossitiem impediat̄ suus agilis motus: q̄ ē ad oēm positiōis differētiā: & iō i ipsis sunt quatuor p̄p̄rii musculi: & duo cōes ipsis & pomis faciei.

¶ Et p̄p̄rii sunt parui proportionē labiorū: qui anteq̄ cuti uniātur sunt inuicē cōcatenati: taliter q̄ suę partes sunt inseparabiles sine ipsorū laceratiōe / quorū unū par pendet sub pomis faciei oblique uersus labia / aliū etiā duo pendent oblique ab inferiori mandibula uersus labia.



¶ Et licet sint tantū quatuor musculi lablis: sunt tamen octo motus teste Gal. xi. de util. c. xvi. f. quatuor recti: & quatuor obliqui: nā quilibz istorū: dū mouetur: oblique mouet / quia situs cuiusq̄ ipsorum obliquus est: sed q̄n duo ex eis equaliter mouētur recte mouent / sicut est in ipsorū apertione: in qua est unus motus rectus: Alter uero motus rectus in labiis est quando inuicem clauduntur seu comprimuntur.

¶ Sunt etiam duo alii motus recti in labiis: unus est quando ipsa extra uertuntur: & alter quando intra plicantur: & isti motus sunt a uillis rectis: quorum quidam sunt intrinseci ad ipsos musculos labiorum: & quidam extrinseci: & quando extrinseci tenduntur: tunc labia extra uertuntur: & quando intrinseci: tunc sub seu intra plicantur: & quomodo motus obliqui fiat ab unico musculo: & recti a pluribus: facile est iudicare: si in inspicatur clausoria unius buccae: quae quando simul trahuntur: recte & uniformiter aperiunt os buccae: cumque unicum ipsorum trahitur: os buccae transversaliter mouetur.

¶ Auic. tamen quauis dicat predictum situm musculorum: non ponit nisi quatuor motus: sicut sunt quatuor musculi: & dicit ipsis sufficere quatuor motus. Inquit quod unaquaeque ipsorum pars: cum mouetur ad suam mouet partem: cumque duo ad duas mouentur: ad duas dilatantur partes: adest ergo eis complementum motus ad quatuor partes: neque ullum habent motum nisi istos.

¶ Et tam Gale. quam Auic. loquuntur de motu proprio: quia motus communis pomis & labiis fit a duobus musculis latis: qui sunt in unaquaque mandibula: & sunt lati maiores predictis: & isti teste Gal. sunt extrorsum a malis usque ad spinam colli: ad quos uadit nervi a pectore: & a clauibus. id est a furculis superioribus pectoris: qui implantantur malis & labio inferiori per uillos rectos: & aliqui alii uilli a clauibus etiam oblique tendentes: & aliqui alii magis obliqui predictis a scapulis ascendentes: apud latera labiorum pomis implantantur: & adhuc aliqui alii a loco retro aures (quas interdum mouent) ad istos musculos tendunt. Isti tamen musculi non cognoscuntur manifeste: quauis multitudinem nervorum habeant fere ab omnibus colli partibus. Cognoscuntur tamen: si clausis mandibulis ad suum ultimum conatum moueantur labia & faciei poma: non quod partes ossosae pomorum moueantur: sed sua pars carnea musculosa predicta mouetur cum cute: quae est proprie pro solo motu labiorum: ad quam & etiam ad ipsa labia uadit musculi predicti lati: quomodo mouet labia & mala: & hic uocat communis motus. id est labiorum & pomorum.

¶ Aliqui etiam uolunt quod male in sui superiori parte moueantur aliqua liter a musculo lato mouente frontem: & aliqui dicunt quod isti musculi lati mouentes malas et labia: iuuant etiam masticationem.

¶ Et istorum musculorum motus optime uidentur in uiuis: maxime in extenuatis. Et ideo de ipsis facio mentionem omittendo multorum

DE ANATOMIA

musculorū anatomlā / quia nō possunt ulderi in uiuis: neq; in cōmuni anatomia monstrari / narrabo etiam linguę & mandibularum musculos propter eandem causam.



¶ Hęc labia intra se: & etiā totū os tegūtur pānculo tegente gulā siue meri: & uentriculū: & pp hoc in futuro uomitu tremitt labiū inferius. Hic tñ pānculus durior & grossior est i ore: q̄ alibi: & grossior in meri: q̄ in uētriculo: & semp descēdēdo efficit lenior & subtilior / q̄a i ore primo obuiat cibariis aliquāliter duris / quę descēdēdo semper efficiūtur molliora: teste Gal. 4. de util. & iuxta illud Aulc. nutriēs masticatiōe aliquālē suscipit digestiōē.



¶ Labiorū figura. situs. quātitas. et numerus patent. sua cōplexio ponit calida / colligātur cerebro per neruos / hepātī per uenas / cordi per arterias: et ideo interdū in ipsorū cōpressionē: cognoscūtur animi affectus. Exporrigūtur etiā: et cōpescunt labia uolūtaria: Colligātur etiā uētriculo & meri / et toto / mediāte cute: Sua luuamēta sunt multa: sūt primo ad tutelā dētiū: et ad bonā faciei formā / ad loquelā exprimendā / ad cibū et potum sumendū: et sunt ori sicut ostiū domui se apiendo et claudendo in necessariis: prohibēt etiā aerem frigidū ingredi ad cor per se et p accidēt: reti nēt etiā aerē a pulmone reuocatū in necessitatibus.

¶ Passiones omiū modorū patiūtur: et iter alias patiūtur fissuras alias ragadias: et sepe cācros: et tremorē in crisi bus et in febribus per cōmunitatem a cerebro et a uentriculo.

¶ De Dentibus.



Isis antedictis: primo quātū potes apias os / secādo bucu **¶** cas i altero laterū: ut melius dentes: ac gingiuas uideass primo notādo substātiā dentium / quę ossilā est: et teste

Celso est durior osse. Aliqui tamē dicūt ipsos esse de natura carnis: et ossis tū quia sentiūt: tū quia renascūtur: crescūt etiā gratia finis toto tēpore suę pmanētię / quia si nō crescerent / nō durarēt: et masticatio esset mala: ex qua ulta esset breuis.

¶ Numero sunt. xxxii. s. in uno ordine secundū utrāq; genā. xvi. sunt locati / sūt etiā sepe solū. xxviii. quia tūc deficiūt quatuor posteriores / qui Neguegid dicūt ab Aulc. et hi sunt duo i quolibet latere: et interdū deficiunt i totū sex: et Neguegid sunt ultimi in ortu / qui uocant etiam dentes intellectus / sensus et sapiētię: q̄a i aliqbus nascūt i iuiritate / uel senio: et teste Arist. secūdo de na

Neguegid.

Intellectus.
Sensus.
Sapiētię.

tura/seu de hystoriis animalium:maribus sunt plures dentes:q̄ scē/
minis:ut in genere hominum:ouium:suū:& caprarū patet.

¶ Eorū nomina : sunt alia a Celso/alia a Gal. alia ab Arist. alia
ab Auic.alia a Mūdino. Et primo ista sunt nomina Auic. in qua
libet.n.parte siue superiori/siue inferiori. a medio oris ante uersus:
incipiēdo i medio:primo sunt duo satis lati & quales/duales dicti
a lateribus quorū utrinq; est unus/qui dicūtur incisui a Mundi/
nois:& ab Auic.dicūtur quadrupli. Gal.tñ uocat duales incisuios:
quos duos duales : & duos incisuios Celsus uocat quaternos : &
istos oēs Arist.uocat acutos/ut secēt : & cōuenit cū Gal. a lateri/
bus istorū utrinq; est unus/qui cōiter cinodētes seu canini dicunt:
& ab aliquibus gelasini dicti sunt/qa apparēt in risu magis aliis.

Maribus sūt
plures dentes
fœminis.

Duales.
Incisui.
Quadrupli.
Quaterni.
Acuti.
Cinodētes.
Canini.
Gelasini.
Molares.

¶ Sunt deinde secūdū Auic.oēs molares a molēdo dicti / qui in
aliquibus secūdū ipsum utrinq; a lateribus caninorū sunt quatuor:
& i aliquibus sunt quinque:& isto mō sunt/uel.xxxii.uel.xxviii. nu
merādo sic/duos duales:& duo quadrupli seu incisui:& duo cani
ni/q̄ oēs sunt sex:& molares secūdū Auic.sunt.x.uel octo: si.x.in
qualibet pte.s.superiori uel inferiori/i totū sunt.xvi.& ut sic sunt.32.
si uero sint octo/sunt in qualibet parte.xiiii.& sic sunt.xxviii.

¶ Mūdinus tñ in numero.xxxii.ponit duos duales suplus:& to/
tidē inferioris:& duos incisuios/& duos caninos:& quatuor molares:
& sex maxillares:tñ nec Gal.nec Arist.ponūt noīa p̄cularia om
nīū dētū:sed Celsus ponit quatuor caninos : utrinq; duos iuxta
quaternos superius:& totidē inferioris:Celsus etiā ponit octo ma
xillares supius:& octo inferioris.s.quatuor utrinq; iuxta caninos.

Maxillares.

¶ Sua figura est diuersa : alig.n.habent unū solū caput acutū : &
unā radicem:ut oēs duales:& quadrupli seu incisui:& canini. Mo
lares uero inferiores habēt ad minus duo capita/& duas radices:
& interdū tres:& tot capita:& maxime ultimi/superiores uero ha
bent ad minus tria capita:& totidē radices : et interdū quatuor:
et maxime ultimi:qui sunt tāq̄ murus tenētes alios firmos:et dē
tiū supiorū radices sunt curuę : ut sint firmiores/ne sua grauitate
cadāt/& foramina i qbus figūtur:sunt mirabiliter ipsis adq̄ta .

Figura dētū
diuersa.

¶ Et ab ossē maxillę oritur pro quolibet dente unū additamen
tū rotundū firmās dentem mediantibus ligamentis fortibus/et
ista additamenta Gal.uocat p̄sepla:quę nō solum sunt in loco
gingiuarum:sed in extremo suarum radicum.

Præsepla.

Et molares habent plures radices aliis / quia sua operatio est magis cōtinua aliis / & quia masticādo nō mouētur secūdu superius & inferius solū / sed lateraliter mouētur seu circulariter.

Omnibus dentibus teste Gal. & Auic. est aliquis sensus.

Sua quātitas & situs patent / colligātur mandibulis & gingiuis / & cerebro p neruū: sua cōplexio est nota / iuuamēta sunt prēpare cibū p stomacho: modulāt ēr loquelā: sūt etiā arma naturę

Patiuntur omne genus morbi: quod patiuntur alia ossa. in eis fit dolor / cōmotio / corrosio / putrefactio / cōgelatio / coloris alteratio: & elongatio a suo naturali loco.

De Gingiuis.

Ost dētes uidēdę sunt Gingiuę: sic dictę a gignēdis dētibz / & sunt carnes simplices / durę / in quibus sunt infixi dentes: i ipsi sunt tot foramina / quot sunt dentes.

Numero sunt duę / una superior / alia inferior: Sua figura patet quę sequit figurā suę maxillę. Patet etiā situs / & quātitas / & colligantia. Sua iuuamenta sunt firmare dentes: & circa ipsos uestire ossa mādibularū: & suo calore illa cōfortare / & carentibus dentibus / prebent iuuamen masticationis: eis etiā est sensus notabilis per colligantiam cum cerebro mediātibus neruis per eas dispersis. Passiones omnium modorum patiuntur.

De Palato.

Ost Gingiuas secūdu uerū uniuersalis Anatomie methodū: occurrit palatū / quod est pars oris teste Arist. primo de hystorlis. c. xi. & est illa pars in ore siue apto siue clauso / quę est supra linguam.

Hęc pars ossosa est: ex ossibus mandibularū superiorū constituta: est tamē recta aliquali carne cum suo pāniculo tegēte / in quo sunt nerui aliqui dantes sensum gustus & tactus: et hęc pars in ore assimilatur cōcauo testudinis / seu cēlo fornacis: Ideo dicitur cēlum & altum oris: & dicitur palatū / quia in apertione oris nobis palam ostenditur / uel quia manifeste latum uidetur: & palatum teste Gal. est tāquā campana pręiacens laryngi seu epiglottidi: in quo fit uocis intonatio.

Suus situs: sua figura / quātitas / & numerus / ac colligantia patent / sua cōplexio frigida est: quia ossosa est a prędominio / i isto mēbro nō est aliquod foramē colatorio seruilię: ut putāt aliqui:

Gingiue vn /
de dicantur.



Celum.
Altū oris.

Campana.

Nota de colatorio.

quod expurgentur supfluitates cerebri: sed tale foramen seu foramina sunt in offe basilari supra nares: ut alibi dicitur.

Ipsius iuuamenta sunt: ut clauso ore & etiā apto ibidē retineat aer / ad hoc ut calefiat si frigidus est / ne talis suo ingressu ledat cor: Retinet etiā Aerē a quo refocilat cor ī necessitatibus / iuuat etiā in retinēdo aerē uocalē: & ideo palatū rugosum est / ad hoc ut aer exeat undosus. Palatū ēt sua ꝑcavitare iuuat reuolutionē cibi in ore masticationis tempore / mediāte etiā sua cōcavitare lingua agilius mouetur ꝑ suis opatiōibus / cum sua etiā pellicula iuuat digestionem / adiuvante ei pellicula totius oris & forte sputo in masticatione cibariis misto.

Passiones omnium modorum patitur / & inter alios morbos patitur in febribus colam seu alcolam.

De Vuula seu Vuela.

In fine palati iuxta fauces uersus caput in opposito Radicis lingue est unū mēbrum carneum / Rare substātię / membrana tectum / cuius quantitas & figura est equiparata grano uue: & ideo uua: uuigena: et uuigera dicitur. Dicitur etiā Columella et etiā Columna: et ab aliquibus Gargareon: Gargar et Gurgulio / dicitur etiā fundibulū / Crescit tamē hoc membrum ꝑter naturaliter in longū et latum: ab humiditate replente: et interdū assimilatur caudę muris: ut ego sepe uidi: et interdum induratur / et interdum strangulat teste Aristo.

*Uua.
Uuigena.
Uuigera.
Columella.
Columna.
Gargareon.
Gargar.
Gurgulio.
Fundibulum.
Vuela est soli homini.*

Hoc mēbrū est soli homini. Sua substātia ē dicta / in qua sunt aliqę uenę et Arterię: et ideo si soluat notabiliter sanguinē ducit. Sua complexio calida est: et humida / numerus / situs et colligantia patent / hoc mēbrū cedit locū deglutitis: nec motū habet uolūtariū. Ideo caret musculis: iuuat in Refrāgēdo & in alterando aerē: ꝑ os pectori seruiēt: et secūdū aliquos in modulādo uocē: ꝑhibet ēt sitim ꝑhibēdo aerē exsiccatē īgredi fauces uolēter.

Passiones omniū modorū patitur: et ꝑsertim corrosionem: et mollificationem / quibus sepe requiritur cauterium.

De Lingua.

Ingua interdū accipit ꝑ uarietate sermonū: ut gręca / arabica / latina et id genus. Multa ēt alia significat / de ꝑnti tñ capis ꝑ mēbro ī ore cōtēto. Et lingua dicitur a ligādo: quia ligata ē ab uno extremo ad aliud ītra īteriores mādibulas.

Lingua rñ / de dicatur.



De musculis
lingue.

Huius membri substantia naturaliter Rara/fungosa:ac mollis est. Est etiā accidētaliter mollis:propter humiditates a capite:& a uētriculo ad ipsam descēdētes. Caro etiā glādosa ī ipsius radice in qua sunt fontes saliuales humectat ipsam mediante saliuā: ē etiā ipsi multitudo neruorū/ tū pp sensum tactus & gustus: tū pp motū/ nerui q dāt gustū/ uenūt a tercio pari neruorū cerebri/ q uero motū/ ueniunt a septimo:& hi nerui sunt notabiles/ quia lingua indiget excellenti sensu:& etiā motu/ plurimo etiā idiget calore:& nutrimento. Ideo habet (similiter & uirga) plures:ac maiores pulsantes & quietas uenas quocūq; alio mēbro sibi parī magnitudine/ & nerui dātes ipsi motū: sunt distincti a dātibus sensum/ sed qui dant sensum tactus: dant etiā gustū/ & gustus facilius corrūpitur tactu/ quia gustus est uirtus subtilior tactu:& situs neruorū sensus ē superficialis: situs uero neruorū motus est acētratus magis: plus & minus secūdū locū musculorū/ q cōiter ponūt nouē. s. quatuor paria:& unus solitarius/ quibus mouet ad oēm positionis differētiā:& lingua in sua radice est ampla: grossa & fortis/ in anteriori uero est subtilis & acuta: ut promptior sit ad motus.

De pēdictis musculis duo sunt a lateribus lingue utriq; unus qui latitudinales uocantur/ procedētes ab ossibus acutis capitis post aures positis/ a quo loco ēt pro parte ueniunt uilli illius musculi/ qui est cōmunis pro motu labiorū/ & pro motu pomorū faciei:& hęc ossa uocātur sagittalia:& acularia: sunt etiā duo longitudinales dicti: nati a supremo ossis lambdę/ qui cū medio lingue cōtinuātur:& alii duo musculi sunt: q ex trāuerso mouēt linguā pcedētes a latere: quod ē iserius ex d' obus ossis lābdę lateribus & isti penetrāt inter pēdictos longitudinales et latitudinales.

Sunt etiā duo alii ipsam cōuertētes: et resupinātes et istorū uilli sunt in latū expāsi sub pēdictis: et hi sunt cōtinuati cū ossē mandibulę iserioris: Auic. rñ. xii. aīaliū dicit istos ultimos ēē supra alios: est deinde musculus unus solitarius dictus/ q ptnuat linguā ossi lambdę: et trahit unū ad aliud/ et hic musculus pellit linguā ad exteriora ipsam elōgando: ipsam etiam retrahit et abbreviat.

Sūt rñ multi dicētes q lingua ad exteriora nō mouet uolūtarie: sed mere naturaliter ab imaginatiua/ sicut uirga: et alig dicūt ipsam et ēē uirgā moueri a musculis/ et ab imaginatiua simul: et alig ab imaginatiua sola/ q mediāte spū cāt uērositatē dilatātē

& erigētem ulgā pariter et linguā cū eductiōe extra os: hęc tñ sunt tacta a Gal. p^o. de moribus ligdis: et ab Aul. prima pⁱ. c. de musculis lingue: & ibidē expositores soluit dubia/ quos uide.

¶ De Osse Lingue.

Inguā i sui radice habet os/ cui annectit et ligatur: et tāq
I sup sua basi firmat in multis suis motibus: et hoc os i ma
gnis aialibus ē quadri laterū nō multū durū: sed ē quasi
carthilagineū: et uocatur os hyoideū & lābdē/ quia assimilāt ipsi Os hyoideū.
litterē gręcę: duo ipsius latera minora sunt uersus linguā/ q̄ sunt Lambdæ.
i forma litterē p̄dictę bifurcata: et duo etiā taliter formata: primis
maiora sunt uersus carthilaginē peltalē epiglottis/ quā amplectū
tur et ei alligātur: ne labat hinc inde/ ut melius hoc os firmet mē
bra alia sibi alligata: et nō solū alligatur epiglotti: sed etiā ad Me
ri per ligamēta allqua. Hoc tamen os in homine raro habet qua
tuor latera/ sed duo tantum uersus epiglottim.

¶ Et hoc os non fuit oblongē/ seu rectę figurę. quia grauitas lin
guę traxisset ipsum ad unū latus tantum: et tunc nō fuisset bona
loquela/ nec bona masticatio: et hoc os uocatur Hyoideū a Gal.
et os lambdę: et ab Aulc. Alfahic.

¶ Iuuamēta huius ossis a Gal. sunt posita multa / quā sit paruū Alfahic.
os: primo: ab ipso ad linguā ueniunt plurimi muscoli: et etiā mu
sculi aliqui epiglottis: et ab ipso uadunt aliqui ad spatulas: et aliq
ad pectus/ et aliqui ad mandibulas: ab ipso etiā/ seu a suis ligamē
tis oriūtur cordē musculorū sibi propinquorū: et est etiā defen
soriū peltalis carthilaginis Epiglottis: et hoc os ē principale fun
damentum/ super quo uertitur lingua in suis motibus.

¶ Huc ossi sunt tres sibi proprię musculorū cōiugationes. s. unū Quot muscu
par pcedēs ab extremitatibus mādibulę inferioris uersus illā p̄tē: li ossi hyoi
cū qua cōtinuāt radici lingue/ quorū unus ē a dextris/ alter a fini
stris: et istud par dum cōtrahit/ trahit ipsum uersus mādibulā.
deo.

¶ Secundū par oritur sub mento: et trāsīt ad istud os sub lingua:
et ipsi colligatur uersus partem superiorem. s. uersus epiglottim:
et istud os trahit ad partem mandibulę.

¶ Tertium par oritur ab additamentis acularibus ossis capitis. s.
a duabus extremitatibus ossis acutis / quę sunt post aures: et
isti muscoli cōtinuātur cū extremitate istius ossis/ quę est uersus
linguā/ et trahunt ipsum ad superiora uersus posterius.

Duae venae
sub lingua.
venae virides
Rubeae.
Nigrae.
Raninae.
Fôtes salivae.

Silellum.



- ¶ Alii omnes musculi huic ossi continuati sunt cōmunes ipsi & membris: ad quē vadunt.
- ¶ Sub ipsa lingua sunt duę notabiles uenę: utrinque una: q̄ i multis dispositiōibus phlebotomatur: p̄sertim i synāge: q̄ sūt rubeę: iterdū nigre: & iterdū uirides: & uocāt ab aliquibus Raninę.
- ¶ Sub lingua etiā: ubi ipsa alligat̄ ori sunt certę cauernę notabiles bipartite: q̄ uocātur Orifitia: seu ora: uel fontes saliuę: quę ab Auic. uocātur generatiua saliuę: i q̄bus de facili igredit̄ stilus: hęc orifitia apert̄ & claudūt ad istar burse: saliuā multiplicāte & deficiēte. Hi fôtes termināt ad carnē glādosam p̄dictā i radice lingue locatā: a qua cōtinue humiditas saliuālis i p̄dictis fôtib⁹ refudat.
- ¶ Sub lingua est etiam certa pellicula in medio eius per longum tendens: quę uocatur a nostris uulgaribus il Filello: quę in aliquibus est magna: & obstetrices ipsam uel Chirurgici secant in etate infantie: quę si non incidatur: trauculos causat.
- ¶ Complexio lingue est calida & humida. Sua figura: & situs ac colligātia ex p̄dictis patent. Sua quātitas est cōspicabilis. Alia enim teste Aristo. est lata: alia angusta: alia mediotris: sed illa est laudabilis: quę est secundum potentiam loquendi comensurata in sua longitudine & latitudine.
- ¶ Numero licet uideatur unum mēbrū. Sunt tamen duo membra: apparet tamen unū ex duobus similibus cōpositum. Cōmuniter. n. natura creauit sensus duplices: ut si cōtingat uni partinocumētum: q̄ altera pars illesa maneat: & nō fuit diuisa sensibiler in duas partes ab inuicē distātes: propter masticationē & loquelam: sed est unita mediāte uno pāniculo ipsam tegente. Hic tamen pāniculus est diuisus per longū in duo latera sub & supra: unitus tñ: & firmissime alligatus lingue. Et hic pāniculus est cōtinuus cū pāniculo tegēte uētriculū: & Meri: & totū os intrinsecus.
- ¶ Inuamenta lingue sunt principaliter ad uocis distinctionem: & ad literas articulandas. Et ideo Gal. in libro de uoce & anhelitu dicebat uoci & orationi posita sunt tria mēbra. s. trachea: Epiglottis: et lingua: et unūq̄q; hēt glādulas humiditatē ipsis tribuētes.
- ¶ Et glādulę tracheę sūt i collo ipsam humectātes: et colli partes.
- ¶ Et glādulę epiglottis sunt illę q̄ dictę sūt arcę aeris. (equātes).
- ¶ Est etiā certa caro pinguis glandosa circa illud cooptoriū eplglottidis: quod dicūt Glottis: quod est uocis principale organū:

lingua tamen habet gládulas/ quibus uadūt uenę ipsi portātes
saluā: alię uero carēt uena/ sed suapte natura replent humiditate
fursū & deorsum ad ipsas fluēte/ & i epiglottidi generat humidit
tas: qua humectat: a capite etiā ad ipsam fluit humiditas aliqua.

Lingua etiā iuuat ad discretionē gustus. iuuat etiam ad reuolu
tionē cibi in ore: taliter ut omnis ipsius pars cōteratur. iuuat etiā
deglutionem. Passiones omniū modorum patitur.

De Amigdalīs.

N supiori parte laterali linguę circa ipsius radicem sunt
certę carnes adenosę seu glandosę/ utrinq; una/ a multis

amigdalę noiatę/ q̄ simul cū uuea añdicta: & Galsamac:
& etiā Alfahic. ix. tertii ab Auic. ponūtur inter partes gutturi ad
ditas: & p guttur Auic. iterpres: itelligit spatii: i quo sunt meatus
cibi & anhelitus/ sed male/ q̄a guttur cōiter a latinis capitur pro
trachea arteria. Capiť etiā pro parte anteriori colli: q̄ est a fauci/
bus ad ingulū: & ideo Celsus dicebat uenās grāges. i. guidez/ eē
in dextra/ sinistraq; circa guttur/ & teste Plinio guttur ē homini
tm/ qđ itumescit plerūq; uitio: & hic tumor botiū dicit & ēt stru/
ma/ licet struma idicet etiā scrophulas & aliquos alios tumores.

Istud ergo spatii: qđ est post uueā & pdictas amigdalas & gal/
samac & alfahic: dicit faux/ & faux seu guttur i uia Auic. ix. tertii
nō est mēbrū aliquod/ sed ē illa uacuitas ad quā terminat sūmū
Gulę & trachę/ i cuius cōtermino uersus āterius ē uuea/ & ami
gdalę: & alfahic/ & galsamac/ in suo uero cōtermino supiori ē illa
uacuitas q̄ terminat p supra palatū ad nasum/ & ad os basilare
uersus anfractus sub collatorio existētes/ de qbus isra fiet sermo:
Faux ēt uocat collū ab iterpre Gal. i lib. d uoce & anelitu dicēte/
Et uoco collū locū illū q̄ ē iter supius epiglottidis & supius oeso
phagi usq; ad radicē linguę: dicit tñ q̄ i isto loco sūt musculi brā/

Et pdictę gládulę: de quibus i p̄senti intēdimus/ tōsil/ (choz.
lē cōiter dicūtur: & Celsus uocat ipsas gládulas: & Mūdinus fau
ces/ licet male/ & gręci uocant Antiadas & paristhmia.

Harū amigdalarū substātia ē carnea & neruea. i. cū pelliculis:
quibus alligat lateraliter: a radice linguę ueniēs uersus palatū: &
ipsi mediātibus uniūtur pdictę amigdalę palato: & istę pelliculę
nerueę simul cum gládulis sunt tāq; auriculę cauernosę: & ideo
uocantur Arca: & repositorium aeris. Istę. n. arcę sunt notabiles



Amigdalae.
Galsamac.
Alfahic.



Guttur ē ho/
mini tantū.
Botium.
Struma.

Faux.
Sula.
alberi.

Tonsillae.

Antiadas.

Paristhmia.

Arca.
Repositoriū.

DE ANATOMIA



In Cynocephalis intra quas seruāt nō solū aerem: sed interdū ut ego uidi cibum: ut sunt castaneę / cicera / auelanę / fabę / uel simi-
les. Iste tamen amigdalę cū suis pelliculis melius uidetur in uno:
q̃ in alio: sed melius i uluo / quia in mortuo animali retrahuntur.
Et iste Arcę seruant aerem magis in egressu / q̃ in ingressu / ut to-
tus nō exeat a uia cordis & pereat animal: & ut in submersiōe in
aquis: & infetoribus ex isto aere retento reficiatur.

¶ Et iste solę pelliculę secundū aliquos sunt illę: quas Auic. uocat
Galsamac seu Golzama / sed iudicio meo nō sunt nisi Arcę p̃di-
ctę / quia Auic. dicit. q̃ supra Galsamac: ē Alfahic. s. os lambdę: &
hoc os est anexū linguę & epiglotti ante sub istis pelliculis: & si
iste pelliculę sunt Golzama seu Galsamac: littera Aule. est corru-
pta. s. illa: q̃ dicit / & Alfahic est supra Galsamac / nec ibidē ē aliud
mēbrū uersus palatū nisi uuea: & pelliculę glandularę: de quibus
p̃terit sermo: q̃ faciūt Arcā pro Aere retinēdo: & ideo ibidē nō
est Galsamach: sed iudicio meo Galsamac est lingua fistulę dicta
epiglottida. s. illud coarptoriū pelliculare: qđ claudit epiglottim /
ne cibaria & alia extranea ingrediātur ipsum: ut infra dicemus.

¶ Ex p̃dictis patēt Amigdalas iuuamēta. Apparet etiā sua col-
ligātia / figura / q̃titas: & numerus / situs suus optime uidet de p̃ssa
lingua: & apto ore i sul ultimo / sua cōplexio ē calida & humida.

¶ Passiones omniū modorū patiūtur: & nūc i certo morbo epidī-
miōso / qui a uulgaribus morbus Gallicus nominat / apostemāt:
induratur / ulceratur: & de facili suscipiūt Reumata a capite: & in
istis fit squinātia: seu synange nō uera: q̃ uocatur Brāconcellus: &
ideo dictē ad fauces brācus: ad nares coryza catarrhus / uocat
etiam Dragōzellus & forte corruptę: & Bononię a uulgaribus
uocatē strāgoioni: quia strāgulare apti sunt: uocatūr etiā Gaioni.

¶ Istas Amigdalas: & etiā linguā: uidebis etiam melius ex corla-
tis Mādibulis: eo mō ut infra dicet / quia ponam Anatomā suorū
musculorū & mēbroꝝ totius faciei: & etiā totius cāne pulmōis /
ut possint uideri ad libitū opantis / q̃a Raro mōstrāti sectiōe cōl.

¶ De Mādibulis seu Maxillis inferioribus.

Istis Amigdalis: mihi placuit de duabus Mandibulis infe-
rioribus determinare: ut colli reliquum commodius: & di-
ligētius Anatomizet: de superiorib⁹ loco suo dicet: & mā-
dibulę a me i p̃nti sumūt p̃ illis osib⁹ capitisi q̃b⁹ iuxta sūt dētes.

Galsamac.
Golzama.
Alfahic.

Alfahic.
Galsamac.

Morbus
Gallicus.
Squinātia.
Synange.
Brāconcellus.
Dragōcellus.
Strāgoioni.

Que sint mā-
dibulę.

Et primo est notanda cutis tegens suos musculos/que in ulris est comuniter pillis plena/ post quam sunt sui proprii musculi ser uientes tribus moribus. *In mādibul*
motui aperiēdi os: & motui ipsum clau *lis sunt tres*
dendi: & motui masticandi & molendi/ motus aperiēs facit mā *motus.*
dibulas inferiores descendere: & claudens ipsas elleuat: & molēs
ipsas circuire & ad duas partes declinare facit: est igitur necessa/
rium ut motus claudendi sit per musculos/ qui a superius descen
dunt & ad superiora trahunt: & aperiendi motus: sit econtrario
modo: & molendi cum transuersione.

Musculi claudētes: sunt duo magni/ & magnas hñtes cordas:
qui musculi tēporū uocātur: qā i tēporibus alligātur iter craneū
& ossa paris/ & in hoīe sunt paruine grauarēt caput: & etiā quia
homo masticat res nō multū duras: & isti musculi habēt magnas
cordas/ terminatas extremitati iseriori mādibulaz: & sunt ualde
molles/ qā sunt prope cerebrū/ a quo habent tres neruos/ duos a
tertio pari/ & unū a quarto: & p psequēs ipōz solutio est pessima: *Solutio mu/*
& ideo Gal. xi. de util. c. iii. inquit: si igit sicut Hipp. dicebat/ que *sculoz tēporū*
sunt propinqua: & cōmunia: & prima/ maxime malignātur/ non *pessima.*
aut propinquius q̄ tēporales musculi/ nec per plures neruos cere
bro magis cōmunicat alius musculus: Rationale ē exaudire eoz
passionis principiū: & pp suā nobilitatē natura locauit ipsos in an
tro tēporū inter ossa unde quaq̄ ipos custodiētia. Musculi oculo
rū sunt etiā ualde nobiles/ quia sunt propinqui cerebro: sed non
habēt tot neruos sicut isti: & isti duo tēporales musculi adiuuant
a duobus aliis musculis/ qui p interiorē partē buccę incedunt ad
mādibulas p̄dictas: & istoz musculoz tēporaliū corde: nō oriun
tur ab extremitate musculi: sed a medio ipsius: ut sint fortiores.

Musculi uero apiētes oriuntur a loco dicto arabice Alhiliricti: *Alhiliricti sūt*
que sūt duo ossa acuta: acularia: & sagittalia dicta: addita occipiti: *ossa post au/*
& ista ossa sunt post aures: & hi duo musculi descendēdo unīūtur *res.*
& efficiūtur unus musculus/ postea sepanē: & exipsis sit corda: ut
fortes sint/ deinde iterum ramificātur: & carne replētur: & fit mu
sculus: deinde mandibularū reflexioni obuiat: & cum contrahit:
trahit mandibulā retro: & quia mandibulę sunt graues per se de
scendentes: sufficiunt eis duo musculi tantum.

Masticatorii uero musculi sunt duo utrinq; unus/ qui sunt triā
gulati: & ualde neruosi sub pomis: & sunt tales: ut icōtrahēdo di



DE ANATOMIA

uerfos habeāt motus: ad hoc ut per ip̄os molitio & masticatio cōpleat: & isti musculi cū una sua basi sunt circa ossa parisi: & cū una alia uersus faciei poma: & cum alia uersus mādibulas, quilibet tñ Angulus p̄dictorū musculorū cōmiscet firmissime partē faciei in directo ip̄os: ut diuersimode moueāt mādibulas: & aliq̄ uoluereteste Gal. q̄ quilibet istorū musculorū esset tres musculi: & carnofitas illa q̄ est circa poma faciei: est ab istis musculis pro parte.

¶ Lingua etiam exceptis istis musculis iuuat masticationem: reuoluendo cibum.

¶ Et musculi eleuantes mandibulas sunt magni / quia habent magnum motum: & sunt molles / quia sunt cerebro proximi.

¶ Et musculi deprimentes sunt parui / quia facilius est deprimere mandibulam q̄ eleuare: & eleuatam tenere.

¶ Masticatorii uero sunt medii: quia mādibularū circūductio est facilius eleuatione: & depressione difficilior.

¶ Mirabit̄ aliq̄s / q̄ natura fecit i hoīe maiores dētes masticatiōis: & plures q̄ icisiōis / dicēdū q̄ natura p̄parauit nō solū dētes ad i cidēdū cibū: sed ordinauit rationē / & artē / q̄bus utit̄ ad incidēda cibaria: fecit etiā masticatorios maiores: & plures: q̄a actus masticatorius est fortior & pmanētior / quā masticationē ut plurimū: nisi forte p accidēs in egrīs: nō facit ars / sicut incisionē ciborū.

¶ Visis musculis: ut os lambdē & caput Meri: & epiglottim melius uideas / ab utroq̄ angulo illius fixurę / q̄ os uocat / secabis trāuersaliter cutē: & musculos p̄dictos uersus aures / i qua sectione si potes: cōsidera p̄dictos musculos: & etiā alias faciei ptes: exceptis naso / palpebris / oculis: & auribus / de q̄bus loco suo dicet̄. Exconando prius ab ipsis cutē cū diligētia / q̄bus uisis denudabis mandibularū inferiorū ossa a iūcturis suis superioribus usq̄ ad medium mēti / i quo ip̄e p unā iūcturā sunt firmissime unitę. Vniūtur etiā ossa p̄dicta utrinq̄ capiti: p unā iūcturā laxā circa aures. Notabis etiā suū sitū / numerū / figurā / colligatiā / & quātitatē. Sua substātia / cōplexio & iuuamēta patēt. Passiōes omniū modorū patiūt̄.

¶ De Anatomia Gutturis & Gulę.

¶ Istis mādibulis ip̄as cū diligētia falce: ferra / uel alio instrumento integre a suo loco moue: ut Guttur / & Gulā melius uideas. Lingūā tamē illesam et os lambdē serua: ut possis horū mēbrorū uidere colligantiam / mādibulis amotis: in /



uestigato sitū gutturis: & Gulę: & ossis lambdę: quod est locatū
iuxta radicē linguę & caput gutturis/hęc mēbra tñ nō moueas:
nisi prius uidebis ipsorū musculos/sed anteq̃ ipsos uideas Anato
mię gutturis/et gulę ē uacādū. Ista. n. mēbra sunt adeo p pānicu
los et ligamēta iulcē colligata/ q̃ unū absq̃ alio iuestigari neqt.

Guttur. s. uia aeris sub faucibus usq̃ ad pulmonē pendens an
teriolem possidet sitū. primo ut sua duritię sit tutela Gulę. Secū
do q̃a p istū sitū est magis directū ad pulmonē/et sic melius et
facilius ipsi seruit. Tercio est anterius/q̃a Gula est ipso lōgior: que
si esset ante guttur/uel obliquasset a fine gutturis usq̃ ad uentri
culū et deglutio esset mala/uel quod a fine gutturis etiā usq̃ ad
uentriculū uersus dorsum esset aliqua incōueniens uacuitas.

Et Guttur est corpus oblōgū/ rotūdū/ cōcauū ut cāna/ cuius
substātia cōposita est pluribus carthilagibus annularibus. Sūt
tamē imperfecti circuli/ sicut Armillę: et assimilātur litterę. C. ideo
dicūtur carthilagine. C. formes/ et semi circulares/ sunt tamen
semi circulo maiores/ et secūdum partem non circularē obuiant
Gulę mediāte pāniculo leni/ et aliquāliter duro/ pfecte spherico:
ipsas intra et extra tegēte et ligante/ et ultra pāniculū intrinsecū
tegētem guttur a summo ad imū: sunt alia ligamenta cōplentia
guttur uersus Gulā/ ubi carthilagine sunt incōpletę. Istę tamen
carthilagine absq̃ pāniculo sunt proprie instrumentū uocis.

Gutturis ps supior cōiter epiglottis/ Larinx et nodus guttu
ris: et iterdū Gurgulio: et Brōchi et gutturis caput dici: reliquū
uero ipsius sepe uocatur Trachea Arteria/ et spiritalis fistula/ et
Arteria uocalis/ et aspera Arteria/ et pulmonis cāna/ et farynx
a findēdis uocibus ut aliquibus placet/ uel a fando dicta/ et Gar
garet Gargareon: sed Larinx ut plurimū ab interp̃te librorum
Gal. de util. partiū i latīnā linguā capitur pro ipsius parte supre
ma/ cōiter tamen pars inferior dicitur Trachea: et guttur a gar
rien lo dicta/ quia inde garritus uenit/ et Auic. prima primi cap.
de musculis gutturis: per guttur intelligit hoc mēbrū. Sed nona
tertiū: per guttur intelligit illud spatīū quod est post palatū: quo
est uia cibi et anhelitus/ quod a latinis faux seu fauces dicitur.

Hoc mēbrū uocatur etiā brōchiū seu brōchū ad similitudinē
certi pīscis/ et etiā uermis terrestris brōchiū dicti: cuius corpus est
oblōgū/ carthilagineū seu squamosum et ānulare sicut ē uipa.

Guttur.

Guttur uere
quid sit.
Armillae.

Epiglottis.
Larynx.
Nodus Gut
turis.
Bronchi &
Gutturis ca/
put. Arteria.
Trachea.
Spiritalis fi
stula.
Arteria uocalis
Aspera arteria.
Pulmonis cā/
na. Farynx.
Gargar.
Gargareon.
Fauces quid.

DE ANATOMIA

Huius mēbri ima pars in binas diuisa est partes a dextris una/alia a sinistris/ quā superiorem pulmonis partē ingrediē: & ab hinc per totā pulmonis substantiam semper minuēdo: per centrū ipsius usque ad extrema in infinitas partitur fibras/ ad ipsum totū & ad cor ducendo & reducēdo spiritū: eo modo quo patuit in pulmonis inuestigatione.

Hoc mēbrū nō ex una sola est cartilagine/ sed ex pluribus cōuexis exterius & cōcauis interioribus/ una iuxta aliā cū aliquali distantia/ ligamentis & pāniculis unitis: ut mediātibus pāniculorū uillis: qui sunt longitudinales: & suorum musculorum neruis/ possit extendi & retrahi in suis motibus: & est durū moderate & leue: ut sit sonorū: & est sensu priuatū: ut resistat extrinsecis lēdētibus: & est sphericū: quia est minus aptū lēdi: & suę cartilagine uersus Gulā in cōpletę sunt: ut sua duritie resistent deglutitis: iō cōpletę tracheę cānalis posterius/ a ligamentis & pāniculis p̄dictis/ quā sua mollitię obediūt deglutitis: & per hoc in necessitatibus: gutturis cōcauitas intra ipsam cēdētibus ipsius pāniculis seruit Gule in buccellis magnis deglutitis: & Gutturis pāniculi facilius obediūt in deglutionibus: quia hora anhelitus et deglutiōis est diuersa: & nō solū guttur in hoc seruit Gule: sed etiā Gula gutturi in anhelitu/ quia tēpore anhelitus Gula est uacua/ sicut guttur est uacūū spiritu deglutiōis tēpore: quia in deglutionibus semper claudit epiglottis.

Gutturis ē pars posterior nō fuit cartilaginea: sed pānicularis ut humectaretur facilius: aliquid humidū bibēdo/ uel labēdo: sicut sepe p̄tingit in magnis caloribus & in febribus: & ut etiā facilius p̄screatū educant materię in pectore p̄tēte/ sicut p̄stat in pleuretico morbo:

Et hoc mēbrū sagaciter fuit cartilagineū & pelliculare mistū: per duos. scilicet per sonū seu uocē: & per anhelitū. Ideo seruit ipsi et uoci: et nō est sonorū uersus Gulā: quia ibi est lene et quasi carneum: et Ideo si trachea: et epiglottis nō sunt sicca decēter sed humida: sit raucedo: teste Gal. in libro de uoce et anhelitu: ut p̄stat ante potū: uel cibū liquidū/ quod uox clara est et sonora/ sumpto uero potu per Gulā humectate tracheā ipsi proximā et unitā: nō clara uox reddi: et si superflue humectet potu/ uel reumate: sit raucedo: Et ideo senes per hanc partem humiditatem rauclī sūt: et corpora sicca clariores et magis sonora habent uocē humidis: et si uia uocis instrumēta aplātur: tūc subito mustus exit Aer: et iste est anhelitus: et si cōstringatur/ cū anhelitu: ē aliquod audibile/ diuersum diuersitate



instrumētū p̄strictū: & si epiglottis p̄strigif: sit uox / si uero sola cāna: fiet quoddā: q̄ ē iter anhelitū & uocē: & hęc ē raucedo. hęc Gal.

¶ Ex p̄dictis patet gutturis substātia: cuius p̄niculus interior est satis solidus & durus / ut resistat catarrhis: & sreatibus malis & uapori capnoso respirato a corde: & ut resistat motibus gutturis in uoce. Situs / figura / & colligantia / & numerus & iuuamenta gutturis: ac sua quātitas / sunt conspicabiles. Sua complexio est frigida & sicca. Passiones omniū modorū patitur.

¶ De Capite Gutturis / quod Epiglottis dicif.

Isis p̄dictis ad supremū Gutturis deuenio / huius mēbrī substātia principalis est ex carthilaginibus pluribus: arti fitiose & magna diligētia inuicē cōiunctis / ex q̄bus resultat uox & uitę cōseruatio / has carthilagines inuicē ligāt musculi: ligamēta & p̄niculi tegētes totā trachēā itra & extra.

¶ Hoc mēbrū teste Gal. non est ex una sola carthilagine / sed ex pluribus dissimilibus figura & quātitate / ut merito numeri dilari possit & cōstringi p̄p anhelitū & uocē. Et suę carthilagines sunt ad minus quatuor: quāq; una nō ē pura carthilago / ideo aut hores cōmuniter ponūt in epiglottidi tres carthilagines. q̄ sunt purę: Prima pura carthilago est dicta peltalis seu scutalis uel scutiformis / quia formā gerit scuti / ipsius cōuexum est ante uersus: cōcauū uero est cōuersum ad epiglottidis cētrū: scilicet ad uiam aeris / & hęc est aliis maior / quę a nobis i anteriori parte colli sub cute uidetur emlnens notabiliter.

In epiglotti sunt quatuor carthilagines tres pure.

Peltalis.

¶ Post scutalē uersus Gulā seu Meri est secūda pura carthilago: quę nomine caret / nec a gręcis / nec a latinis nomen habet: & ideo uocatur carthilago innominata / seu nomen nō habēs / hęc secūda habet suā partē inferiorē perfecti circuli / cū qua est retro: ante & a lateribus: unita cum supremo circulo trachę arterię: & uersus anterius est cū sua circulari parte sub scutali firmiter unita: & scutalis habet duo additamēta notabilia: quibus amplexitur secūdā: & istę duę simul unitę cōponunt totū portū aeris circularē / ante / retro: & a lateribus totaliter carthilagineū & durum.

Nomen non habens.

¶ Tertia carthilago etiā pura uocatur cōmuniter cymbalaris: & a Gal. uocat̄ Antyoidea / q̄a est alligata itra carthilaginē secūdā i ipsius supmo uersus portū aeris i opposito ossis hyoidei. Hęc tertia est tanto minor secūda / quāto prima est maior secūda: & hęc

Cymbalaris Antyoidea. Os hyoideū


G

DE ANATOMIA

carthilago iudicio meo nō est una sola / sed duę unitę taliter q̄ ui
dētur una sola: & hęc gerit i sui aptione uicē ualuarū duarū parui
libelli: quarū una clauditur uersus aliā: & opposito modo operan
tur in sui apertione: & hęc carthilago quādo clauditur in suo supe
riori: & etiā in inferiori: facit foramen latius q̄ in ipsius medio: &
tunc habet tale foramen: quale / seu qualia habet tuba in suis ex
tremis. Maius tamen superius / q̄ inferius: ideo Gal. dicebat octa
uo de iuuamentis / q̄ ad esse uocis oportebat epiglottida esse pri
mo amplā: deinde strictā: & deinde iterū ampliari: & quādo hęc
clauditur obuiat scutali: & quādo aperiūtur suę partes seu sua la
tera: uadunt uersus carthilaginē nomen nō habentem.

Glottis.
Sublinguū.

¶ Supra has tres carthilagines est quarta q̄ est corpus mēbrano /
sum / carthilagineū & pingue / simile linguis fistulae / assimilae ē
hedere folio & lingue humanę: & ideo Gale. ipsā uocat / glottida:
uocatur etiā sublinguū: & hoc est principalissimū uocis organū:
& glottis nō est mēbrū ex pura carthilagine / quia durū difficul
ter plicatur: nec ex pura mēbrana / quia in claudēdo duplicareē:
sed est cōposita ex mēbrana & carthilagine: propter decetē clau
surā: & in ipsa est etiā pinguedo / ne exsiccet / tū motu fere cōti
nuo: tum etiā spirando & respirando aerem exsiccatem: hoc mē
brum habet claudere epiglottida deglutionis tempore: Cimba
laris etiam claudit: hęc a retro / glottis uero antierius / taliter q̄
nec in uomitibus: nec in deglutionibus aliquid ingredi potest
pulmonis cānam nisi uiolenter.



¶ Et epiglottis non est ex una carthilagine: sed ex pluribus ut
possit dilatari & cōstringi in diuersitatibus uocum formandis: &
Ideo natura dedit istis carthilaginibus & etiam gutturi musculos
seruiētes / quorū quatuor uniūt primā carthilaginē secundę: &
istorū duo sunt intra claudētes epiglottida: & duo extra.

¶ Sunt & alii quatuor: qui iūgunt secundā cū tertiā. scū cimbala
ri / quorū duo sunt posterius: & isti apiūt Cymbalare ad postero
ra trahētes: & duo a lateribus ipsam etiā ad latera trahentes.

¶ Sunt duo alii musculi circa scutalem carthilaginē intra epi
glottida / qui claudunt cymbalarem.

Epiglottidi
xii. pprii mu
sculi.

¶ Sunt etiā intra epiglottida duo alii musculi circa radicē cimba
laris: claudētes etiā epiglottida: & isti. xii. sunt pprii carthilagini /
bus epiglottidis / nulli ptiū adiacētū copulati: teste Gal. 7. de uti:

¶ Glottis etiā habet unū par musculorū: quibus mediātibus claudīt supmū epiglottidis: & isti sunt fortiores aliis: teste Gal. viii. de iuuamētis: & isti resistūt musculis pectoris: & aliis musculis apertibus epiglottida: & forte secundum aliquos quod isti sunt ultimi duo immediate descripti.

¶ Ultra predictos sunt etiā alii octo musculi: quorum duo sūt proprii cānē pulmonis teste Gal. in libro de uoce: & anhelitu: & isti sunt in cānali gutturis: & istos Auic. dicit esse apud gulam.

¶ Est aliud par musculorū gutturi seruiens: non principaliter tamen: sed seruit etiam mēbris uicinis: & hoc par continuat tertiam cartilaginem cum Gula.

¶ Et sunt duo alii gutturi seruiētes: ad destructionē quorū sit raudedo. Et isto mō erūt. xx. musculi seruiētes epiglottidi & gutturi.

¶ Et hinc cōprehendit error aliquorū modernorū: qui credūt in faucibus esse duos proprios musculos ipsis seruiētes: putantes quod Auic. prima primi de musculis gutturis: per guttur itelligeret fauces: sicut fecit nona tertii: sed hoc negamus: quia faux nō est aliqd determinatū mēbrū: ut latius diximus in nostris sup Mūdino cōmētariis: Et iō recte iudicare Intēdētes nō cōfidāt in uerbis: gaiteptates de grēco: & de Arabico in latinū (sēpe ignari) capiunt unū palio: & isto mō fere oēs sciētię sūt spurie iteptū uarietate.

¶ De Gula.

Ost Guttur iuestigāda est Gula: quod locū gutturi posteriorē ante spinā tenet: hęc a faucibus per collū & pectus cōtingua Aortę Arterię & spinę septū trāuersum perforādo ad uētriculū descēdit: hęc gulā aliq̄ latini: ciborū ministrā & dispē sarricē: Arabes Meri: grēci Oesophagū: quāsi ferēs comesta uocāt.

¶ Hoc mēbrū directe usq̄ ad quartū sphōdylū pectoris iclusiuē descēdit: deinde paulisp obliquat ad dextrū cēdens locū Aortę de cēdētī: ne deglutita ipediāt Aorte motus: & cū est nō multū distās a septo trāuerso: parū subleuat: ne chilim cōprimat uenā: & ut melius firmetur pro subliētatiōe predictorū neruorū: descēdētū: deinde iterū circa decimū sphondylū incipit obliquari ad sinistrum: & sic obliquata ad uentriculum descendit.

¶ Huius mēbri substantiā carnea est & pellicu laris: longos attractioni seruiētes habens in interiori panniculo uillos: cuti oris & labiorū terminatos: & latos in exteriori expulsionī seruiētes: ex

Musculi seruiētes Gutturi & epiglottidi sunt. xx.



Gula. Liborū ministrā. m. cr. Oesophagus

DE ANATOMIA

pulsionem ad inferius & etiā superius se cōtrahendo iuuantes: & isto modo uilli longi & lati iuuāt deglutionē: iuuāt etiā uomitū: & secūdum aliquos Gula etiā habet uillos obliquos in tunica intrinseca uersus exterius/qui retinent/sed ego credo q̄ expelāt se cōtrahēdo/sicut faciūt musculi obliqui abdominis: & Gulę herent duo nerui descendētes a cerebro utrinq̄ unus/a quibus oriuntur reuersiui. Dicti nerui uocis: Gulę ē pāniculus interior tegit linguā et omnia oris membra.



Et Gulę pāniculus interior est densior in sui sūmo/ q̄ in imo: et ibidē dēfior q̄ in uētriculo: et densior i uētriculo q̄ in primo intestino/ quia materię digestę nō requiritur eque fortis resistentia in tactu: sicut indigestę: et hīc pāniculus interior continuatur ori: ut attractio ciborū sit cōtinua: et hīc iudicatur q̄ Gula est pars uētriculi cōtinua ipsi cū gradatione. Et epiglottis et oīa mēbra oris inuoluūtur a mēbrana intrinseca Gulę/ teste Gal. i libro de motibus liquidis. Tertia etiā cartilago Epiglottidis alligatur Gulę per duos musculos/ teste eodem in libro de uoce et anelitu ob quā colligatiā in deglutionibus epiglottis ascēdit: et Gula descēdit/ dū ipsius uilli lōgi cōtrahūtur a faucibus uersus uētriculum: et ecōrta a uētriculo uersus fauces Gula ascēdit / et quā primum res deglutiēda ptransiuit locū propriū Epiglottidis/ et relaxatis Gulę uillis/ Epiglottis subito descendendo ad pristinū locū: ad iuuātibus Gulę obliquis et latis uillis cū grauitate rei deglutiēde fit deglutio: licet aliter sentiāt aliqui. Epiglottidis etiā ascensus se cū dum aliquos iuuatur a uillis longis/ locatis in interiori mēbrana Gutturis/ qui alligantur Gulę usq̄ ad oris extremum.

Nota motus
epiglottidis.



Et sunt aliqui dicētes Epiglottida etiā ascēdere uolūtarie/ quia cū uolumus ascendit. et isto modo habebit ex motu uolūtario et naturali motū cōpositū. Aliter tñ sentit Gal. i libro de motibus liquidis: tenēs q̄ tārtū naturaliter ascēdat epiglottis/ in cuius ascēsu/ necessario musculi Glottidis trahūt ipsam ad inferiora: et forte nō uolūtarie mouētur tales musculi/ quia Epiglottis ascendēdo attracta a uillis p̄dictis secū ducit glottida: sicut alias cartilagine/ in cuius ascensu necessario glottis deprimi/ quia est alligata suis propriis musculis/ qui sunt uniti cū sua parte inferiori uersus tracheā: et cū superiori ipsi glottidi: qui nō ascēdūt cū glottide/ et ideo ipsam ad inferiora trahūt: et isto modo etiam nō uoluntarie

semper in deglutionibus per ascēsum epiglottidis clauditur glottis modo p̄dicto/quo fit ne bibita & deglutita trāseant ad guttur:nisi in hora:in qua festinat deglutio anteq̄ cōpleatur ascēsus epiglottidis:& tunc natura cū tussī expellit in cānam ingressa si potest.In historia.n.habetur q̄ Fabio p̄tōri/& Anacreōti poetē contigit suffocatio: huic uuē passiē azino. Illi pillo in lacte au/sto.Clauditur tamen glottis uoluntarie a suis musculis: quando uolumus retinere inspirationem & respirationem: & isto modo p̄dicti musculi glottidē ipsam claudunt interdum per se:& interdum per accidens.

¶ Figura gulę est oblonga in superiori parte in faucibus dilata/ta ut tuba/& est non cānulata.Est enim tāq̄ intestinū/cuius ori ficiū inferius uentriculo est cōtinuū/ubi notabilem habet sensum propter notabiles ramos neruorū a cerebro ad ipsum terminatos.Sua quātitas patet. Numero est unū mēbrū/colligat ori & epiglottidi firmissime/taliter q̄ cū difficultate unū ab alio separatur.Colligatur etiā gutturi p̄ totū:Cordi per arterias/hepatis per uenas/& cerebro p̄ p̄dictos neruos. Sua cōplexio tēdit ad calidū nō excellēter:q̄a est ualde pānicularis.Sua iuuamēta sunt ducere deglutita ad uentriculū: & multa superflua reducere ab ipso ad extra per os.Passiones omnium modorum patitur.

¶ Qui cum diligentia cupit gutturis/& gulę habere inuestigationem.primo uideat ipsorū situm/incipiendo ab ima parte notando Gulam:& ascendendo notet cum gutture ipsius colligantiam:ea falce uel alio ingenio ab inuicem sepando usq̄ prope epiglottida/notando musculos p̄dictos/aliquibus quorum uidebis neruos reuersiuos alligari.

¶ Visis musculis separet gulam in suo supremo ab epiglottidi:& notet ipsius carthilagine/notādo etiam situm ossis lambdę:quod cum duobus suis maioribus additamentis amplexitur carthilaginem scutalem:& cum minoribus substat linguam:uideatur deinde epiglottidis tres carthilagine p̄dictę:& quarta carthilago unita cum pinguedine & pellicula/glottis dicta:qua mediāte fit epiglottidis clausio/scindat deinde lingua suas p̄dictas partes notādo:& hęc sufficiant pro Anatomia medii uentris/in quo sui proluxus & nō incongrue/quia hęc discipulis traduntur.

G III

DE ANATOMIA

DE Anatomia Ventris sup̄mt.

Uenter sup̄/
mus.
Cephale.
Caput qd sit
& vñ dicat.

Enter supremus nominatur caput/ quia ibi sensus initium
u caplunt: quod gr̄ci Cephale dicunt/ & caput de p̄senti
sumitur pro eo toto quod collo sub̄st̄at: in quo cōtinē
tur mēbra animata. s. cerebrū: de parte capitis anteriori sacra est
aliquarū partium (melioris ordinis gratia) inuestigatio.

Sinciput.
Occiput.
Tempora.
Auriū locus
interciput.
Bregma.
Vertex.
Cacumen.
Basis capij.

Hic uenter in homine insignis est propter ipsius contentū/ qui
habet partes cōmunes & proprias/ Cōmuniū alia est ante/ alia
post/ alia lateralis/ alia superius/ alia inferius: Anterior sinciput:
posterior occiput/ laterales tēpora & auriū locus dicūtur: & supe
rior dicitur interciput/ vertex & cacumen. Inferior uero dicitur
basis capitis & membrorum suorum: An caput sit propter cere
brum uel oculos alibi diximus.

Cutis capitis

Partes proprie alię sunt continētes/ alię contentę.
Cōtinētes sunt oēs partes exteriores. s. primo pilī/ qui tamē nō
sunt numerādi in p̄tibus capitis: nisi īproprie/ q̄a nō sunt mēbra:
sed numerātur tāq̄ superfluitas aliquādo utilis.

Pericraneū.
Almocatium.
Zinzia mater.
Circū ossalis
mēbrana.
Calua Testa.
Craneum.
Dura mater.
Pia mater.

Secundo cutis: quę est grossa aliquāliter carnea/ ut in ipsa bene
firmētur pilī: & ut sit scutum partibus sibi inferioribus.

Sub cute ē diminuta caro uel nulla: excepta frōte & tēporibus.

Post cutem & carnem: est pāniculus circūdans totum os capi
tis: dictum gr̄ce pericraneum & Arabice Almocatium: & ab ali
quibus zinzia mater: & circū ossalis mēbrana.

Post pericraneū sequitur os capitis/ calua & testa a latinis di
ctum: & gr̄ce craneum/ siue cranion/ quia durum.

Cōtēta sunt pāniculus durus: & pāniculus lenis: hic pia mater
& secūdina. Ille uero dura mater dic̄t: & supra os ī imo capitis in
fra pāniculū durū: multitudinis usus ponit Rete mirabile.

Intra p̄dictos pāniculos est sub̄st̄ia medullaris cerebri: cum
suis uētribus/ glādulis/ uermibus: & neruis a cerebro ortis: pia ta
men mater & dura ab aliq̄bus ponūtur inter cōtinētes. Nasus
uero & mīryngē auriū: pariter & oculi: & omnia mēbra faciei po
nūtur inter partes in capite cōtētas: nō sunt tamen in uentre
sup̄mo contenta.

Capilli.

Capilli igitur sunt primo examinandi/ qui generantur gratia
materiē uaporosę eleuatę a toto ad caput/ tāq̄ superfluitates pro
pter calorem totius: & inde fiunt pilī capitis/ capilli dicti/ gratia fi

nls facti/quia sunt ad decorem: ut aliquibus placet:& ut tueatur caput ab extrinsecis multis.

Cutis capitis de se patet/hęc caret motu/nisi in fronte & tēporibus/& ideo priuatur musculis/paucū etiā habet sensum.

Excoriando totā cutem a capite uidebis pāniculū pīcraneum dictū/undiq; inuoluentē caput/factū ut dura mater suspēdatur craneo per cōmissuras & per multos alios poros cranei:hic pāniculus est etiā ibidē/ne craneū obuiet cuti & carni capitis sine medio:& ut craneū ipso mediante sentiat:& ut huic pāniculo inhe-
reant uenę & arterię per exterius caput cibantes:& quę per cōmissuras & alios poros intrant & exeunt a capite.

Post istū pāniculū est os craneū dictū/quod per totum a peri-
craneo detege formā ipsius cōsiderādo/q̄ debet esse rotūda: ut sit maioris capacitatis & minus apta ledi:& est leuiter a lateribus cōpressā: faciens prorā ante/& puppim post:ut sui uētres sint lōgi: melius seruiētes operationibus intellectus:& q̄libet forma de uiās ab ista est praua:& quāto plus distat ab ista ē deterior. Hoc os nō est unū cōtinuū/nec durū/densum:ut sunt multa alia:sed rarū/siringosum seu spongiosum:nō multū grossum/& cōmissuris seu iuncturis aliquibus compositum.

Suę tamen iuncturę nō sunt nodatiles: sed ferratiles/dentales et squamose/quia nō mouētur:et craneū est tale ut iuncturę suę sint firmiores:et ut si unī parti cōtingat lesio:alię illesę maneant:et etiā ut uirtus medicinę capiti pro cerebro leso applicandę melius suū imprimat effectū: et ut uapores eleuatī a toto et a cerebro:facilius exeant et resoluantur:et ideo ipsius suprema pars est rarior quacūq; alia parte/nec ibidem est ualde durū/quia cacumini non accidit lesio sicut aliis partibus/biliosus tamen Mars omnia lēdit:est etiam tale/ne grauaret corpus:est tamen in fronte grossius:quia ē mollius ibidem/duas tamē habet partes: quas aliqui uocāt tabulas:intra quas est uacuitas notabilis/ne grauet corpus:et ut inter illas sit aer implātatus suscipiens odores:et hęc pars est mollior aliis:quia suū contentū est mollius.

Os uero posterius est durius:quia cōrētū posterius est durius:est etiam durius os posterius:quia oculi suo uisu nō possunt tueri ipsum:est tñ grossius et durius in lateribus:ut sit sonorū/quia ibi dē intra ipsius substātiā debuit locari organum auditus.

G IIII

Pericranēū.

Craneū & sua bona forma.

Capitis iuncturae sunt dentales & pp quid



DE ANATOMIA

**Eminentiae
clauales & a/
culares dicte** ¶ Pars etiam huius ossis in occipitio collū uersus/est dēsa/grossa:
compacta & dura:& etiam lateraliter post aures/quia ibidē alli/
gātur ceruicis cordē ualidē/quē magnos & fere cōtinuos habēt
motus:& post aures sunt certę eminentię acute:clauales & acula
res dicte:durę ualde:quibus alligantur musculi multi mēbra oris
& faciei ac collī mouentes/quę si molles essent prędictis moti/
bus non resisterent.

Ossa petrosa ¶ Et circa tempora hoc os est etiam durū / quia ibi sunt musculi
magni mouentes mandibulas : & ideo omnia hęc ossa lateralialia
uersus posterius sunt dura ut petra:& petrosa dicuntur.

Colatoriū ubi ¶ Pars etiā inferior huius cranei dicta os basilare est dura / maxi
me in directo palati / ubi sunt nerui optici in crucis formā situati:
per quod ibidem perforatū ut cribrū descendit superfluitas hu/
mida aquosa cerebri:& hic locus cōmuniter dicitur colatoriū.

¶ Hoc os basilare i sui supremo nō est planū sed inęquale / quod
potest optime uideri in cimiteriis / sicut & alię cranei partes : &
etiam omnia totius corporis ossa / ad quę uidenda non accedat
qui non est legitimus medicus.

¶ Numerū ossiū totius capitis & noīa commissurarū suarū optime
dixi in cōmētariis super Mūdino. Ideo a multis narrādis breuita
tis causa supsedeo / maxime qa de ipsis scribētes nō coincidūt.

**Frons.
Coronalis iū
ctura ubi.** ¶ Pars huius ossis primo occurrēs est illa in qua sunt loca oculorū
frons dicta / quę terminatur in prima iunctura serratili occurrēte:
quę dicif coronalis / sic dicta / quia ut aliquibus placet ibidē coro
nātur Reges / uel forte / quia hęc cōmissura gerit formā quasi ar/
cualē / seu circularē & coronalem / a summate capitis descēdendo
utrinq; usq; ad angulos locorū oculorū qui sunt uersus aures.

**Commissura
lambde.** ¶ In opposito huius ossis est unū aliud os terminatū in iunctura
serratili posita in capitis postrema parte / quę uocatur commissura
lambdę / quia assimilatut illi literę gręce quę lābda uocatur / hęc
cōmissura habet etiam formam arcus .

**Commissura sa
gittalis.** ¶ Inter has iuncturas est una alia cōmissura etiā serratilis in su/
mate capitis posita ab ante retro porrecta:& hęc uocatur sagit
talis:quia recta incedit ab unaquaq; prędictarū arcualiū iunctu/
rarum a . i . aliam / sicut stat sagitta ad arcum.

**Commissure
squamosae.** ¶ Ad latera huius ossis supra duo ossa partis in parietibus tempo
rum:sunt duę iuncturę squamosę (utrinq; una) quarum ossa in /

feriora super equitant ossa superiora.

¶ Primę tres iuncture uocantur uerę per directũ intra cranium penetrantes: & istę ultimę obliq; penetrātes uocātur mēdosę.

¶ Inter istas cōmissuras laterales ascendēdo uersus sagittalem est etiā utrinq; una alia iunctura squamosa / q̄ nō uidet nisi raro i capitibus a tēpore maceratis / uel in ultimate decoctis: inter quas & sagittalē / sunt duo ossa (utrinq; unũ) rariora ceteris ossibus capitũ / quę Gale. uocat ossa bregmaris: & Auic. prima primi uocat craneũ / & locus ille ubi copulat iunctura coronalis cū sagittali uocatur ab aliquibus Bregma / & Zuendech: & capitis fontanella / in qua os ultimate pueris cōcreuit: & ibidē ponūtur cauteria & cerata & alia localia pro catarrhis & multis aliis morbis: i aliis capitibus partibus sunt etiā multę alię iuncture / de quibus nō fit sermo: quia de ipsis Medici nō curant tantũ sicut de p̄dictis.

Cōmissura
oculta.

Ossa bregma
tis: Craneũ.

Bregma.
Zuendech.
Capitis fon-
tanella.

¶ Ex p̄dictis patuit capitis situs: substantia & figura. Sua quāti-
tas patet. Sua iuuamēta & colligantia sunt pro parte dicta & di-
centur. Numero est unũ. Numerus partiũ dictus est: & etiā cō-
missurati crani: quarũ tres sunt serratiles directe intra penetrā-
tes: alię sunt squamosę obliq; penetrātes. Sua cōplexio est cōple-
xio partiũ componētium ipsum. Passiones omniũ modorũ pati-
tur / quę si sint in uelaminibus & in ipso cerebro: mala iudicātur:
plus & minus secundum locum & morbi qualitatem.

¶ De Dura Matre.

¶ Isis p̄dictis ut cōmodius uideātur intra craneũ cōten-
ta: diuide caput a collo circa tertiũ sphondylum: deinde
seca craneũ supra aures parum (circum quaq; usq; ad in-
trinsecam circūferentiam ipsius taliter ne lēdas duram matrem)
semper seruando situm p̄dictum.

¶ Hoc facto eleua os totum superius secatũ a suo inferlori / cum
aliquo eleuatorio apto & forti: quia undiq; alligatur firmissime
dure matri: tam in cōmissuris q̄ in multis aliis ipsius poris.

Os i eleuan-
do cranium.

¶ Eleuato craneo uidebis durā matrē etiā miringā dictam / quę
est pāniculus satis grossus nerueus & ualidus: est tamen porosus:
ut a cerebro exeāt uapores. Sua figura ē plana / extēsa i circularē
formā / cōphēdens totā itra se cū pia matre cerebri medullā.

Dura mater
alSiringa.

¶ Dura mater est a prora ad pupim per longum duplicata: & in
directo sagittalis cōmissurę penetrat per quātitatē duar; unciarũ



Intra substantiā cerebri/dextrā partem a sinistra diuidens: dupli-
cat etia posteri⁹ per latum/diuidendo cerebrū posteri⁹ ab an-
teriori: hęc secūda duplicatio nō est inuicem alligata: ut alia pri-
ma/quia prima per ligamēta aliqua & per uenulas est inuicē cō-
iuncta: taliter q̄ in ipsa est uacuitas apta tenere intra se aliquid &
in ista uacuitate ab ante usq̄ retro sunt multę uene a guidez p̄/
dictis ascensę/quę ibidē a duplicatiōe p̄dicta cōprimunt: & cō-
pressę exprimūt sanguinē ad multos ipsarū ramulos: qui sunt cō-
tinui ramis pię matris nutrientibus cerebrum.

Lacuna.
Platea.
Fouea.
Palmentū.
Tertia uena.

Torcular.

¶ Versus occiput ī ista duplicatione est certa uacuitas uocata la-
cuna: & platea: & fouea: & palmentum/ in quam pars huius san-
guinis exprimit: & fere semper ibidē est sanguis aliquis/ propter
quem Erophylus istā lacunā uocauit tertiam uenā: quia hęc ua-
cuitas est oblonga ut uena: & alibi q̄ in uenis/ arteriis/ corde: & ī
istā lacuna nō reperit sanguis sub forma sanguinis: & istam dupli-
cationem Auic. uocat Torcular.

¶ Sua quātitas/ situs/ colligantia: & complexio patent. Numero
est unus pāniculus/ sua iuuamēta ultra p̄dicta/ sunt uestire ce-
rebrū cū pia matre/ secūdū longum latum: & profundū/ ipsum
circuendo: & in ipsum ut supra patuit penetrando. Iuuat etiā me-
diando iter os durū & piā matrē satis mollem/ Iuuat etiā in sub/
stentādo uenas/ cerebrū & mēbra sibi uicina nutrientes. Passio-
nes omniū modorū patitur/ sua solutio notabilis/ est praua.

¶ De Pia matre.

Pia mater.
Secūdina.



Cerebri ver/
mes vñ oriāt

Vb ista ē alia mēbrana tenuis subtilissimis arteriis & ue-
nis p̄ totum irretita/ imediate cerebro alligata/ dicta pia
mater & secūdina: quia nutrit cerebrū sicut secūdina fœ-
tum: & iudicio meo in istis minimis arteriis ramis in pia matre
undiq̄ dispersis subtilatur & p̄parat sanguis seu spiritus uita/
lis/ ut in cerebri substantia & in uētribus ipsius efficiatur animalis:
ut in cōmentariis super Mundino diximus.

¶ Hęc mēbrana neruea & tenuis est/ & alligat durę matri in sum-
mitate ipsius a prora usq̄ ad puppim p̄ multas uenulas/ & cū ali-
qbus uenulis alligat circa latera capitis: & ē alligata per totū sub-
stantie cerebri/ quod nutrit: & secundum sensum duo uermes in-
tra cerebri uentres locati trahunt ortum a uenis & arteriis istis/ a
quibus defertur spiritus ad intra uentres: & etiā sanguis partes ce-

rebrī intrinsecas nutriendas. In parietibus etiam ventriū: est aliqua portio pię matris / portans sanguinem & spiritū / sanguinem ad partes sibi uicinas nutriendas: spiritū uero pro animę operationibus: sicut faciunt uermes antedicti.

¶ Ex prædictis sua substantia / figura / numerus / colligantia & situs patent: patet & quātitas / quę nō solum cerebrū extra: sed etiam intra uentres: & in multis suis plicaturis seu anfractibus notabiliter ingreditur: licet aliqui dicant in postremo uētre nō esse piām matrem propter ipsius substantię duritiem: nutritur tamen hæc pars: & ideo habet uenas: ut prima / minores tamē. Sua cōplexio inata est frigida & sicca / iuuamēta patēt. Passiones omnium modorum patitur: quę sunt deteriores q̄ in dura matre.



¶ De Medulla Cerebri.

p Ost piām matrem occurrit Cerebri substantia medulla ^{medulla cerebri.} improprie dicta / quia non nutrit: nec humectat ossa sibi uicina: sicut aliorum ossium medulę / sed ossa capitis nutriuntur ut ipsam conseruent.

¶ Sua substantia est conspicabilis / mollior ante & superius / q̄ post & inferius / quātitate excedit cerebri aliorū animalū quantitatē: ^{Cerebrū maximum in homine & pp quid.} tū pp spiritū aialū multitudinē / tū ut sua cōplexione frigida & humida p ratiōe cōtēperet ipsos / qui a corde calidissimi ueniunt.

¶ Suus situs patet / & etiā figura / q̄ est talis supra & per totum: qualis est forma cranei: habet tamē multas plicaturas manifestas in primo aspectu: & etiā multas absconditas / quę uidētur in ipsius sectiōe / itra q̄s p totū ingredit̄ pia mater ipsi anexa. Sua colligantia ex p̄dictis apparet: & apparebit ex suorū neruorū cognitione.

¶ Numero est unū mēbrū. Duas tamen habet partes / quę non sunt totaliter ab inuicem sepatę: sed notabiliter unitę.

¶ Vna pars notabiliter in magnitudine aliā excedēs / est ab ante usq; retro replēs totā cōcauitatē cranei: ante & in medio a sūmo usq; ad imū: & retro replet tantū partē supremā cranei: etiā i directo maioris ptis ossis lambdę: & hæc ps uocat̄ cerebrū anterius. ^{Cerebrum nāterius.}

¶ Alia pars longe minor prima cerebellū ab Aristō. dicta: & prima solidior replet capitis posteriorem & inferiorem partem: & hæc ^{Cerebrum posterius.} situm suum habet i postremo capitis sub parte prima antedicta: in hac tamen parte cerebri posteriore cerebellum dicta / non est aliqua concauitas seu uentriculus: ut notant multi: est bene tecta.

DE ANATOMIA

circūquaq; a dura & pia matre / & sensus hęc omnia mōstrat. Pri-
ma pars ante dicta diuisa est notabiliter a dura & pia matre in
duas partes secundū capitis longū / in dextrā .s. & sinistrā partē:
ut sua substantia & sui uentres sint distincti & duplicati.

¶ Primo igitur in altero laterū talis duplicationis / cū rasorio dis-
genter moue (lateraliter secūdum supius & inferius) piā matrē
simul cum notabili quātitate cerebri / descendendo per tres digi-
tos plus & minus secūdum q̄ inuenies ipsius uentriculos.

Duo ventres
in cerebro.

¶ In quolibet .n. latere talis duplicationis reperies unam notabi-
lem uacuitatē: q̄ uentriculus est dicta / quę ē per longū porrecta
aliqua liter obliquata uersus posterius lateraliter descendens.

¶ Viso uno latere: uide & aliud: in quo uidebis idem ubiq; sicut
in antedicto: & hi uētres sunt diuisi a substantia cerebri: ut si cōtin-
gat unī parti nocumētū / ne cōtingat alteri: & operationes unius
partis talium uentrium sunt similes alteri sibi pari.

Uermes cere-
bri ubi sint.

¶ In isto uentriculo utrinq; circa basim est una substantia pellicu-
latis / rubea / uermis dicta / ex uenis & arteriis cōposita / q̄ ab uno
extremo ad aliud cuiuslibet uētriculi tendit / q̄ motū habet secū-
dum aliquos: apiens & claudēs uentriculos uoluntarie.

Uermes in cere-
bro.

¶ Infra tales uermes ad ipsorū latera est certa pars cerebri emi-
nens / quā multi assimilant natibus humanis in figura / q̄ in elon-
gatione pariter & clausione uentriū se cōtangit / in a breuiatione
uero & dilatatione ipsorū ab inuicem separatur.

¶ In istis uentriculis antedictis cōmuniter in parte ipsorū ante-
riori ponitur phantasia / sensus cōmunis: & imaginatiua.



¶ Visis p̄dictis moue notabilem cerebri medullę partem: ut
diligentius uideātur alię cerebri uacuitates: notando in basi an-
teriori p̄dictarū duarū uacuitatū unum foramen / quod est cōe
p̄dictis uacuitatibus / per quod spiritus ad alios uentres tēdūt
& etiā aliq̄e humiditates in ipsis contentę descendēdo exeunt
ad certā uacuitatē tēdentem uersus os basilare circa locū ubi est
certa caro glandosa sub incrustatione neruorum opticorum.

Lacuna assū-
dini.
Caput rosę
Embotū.

¶ Hęc uacuitas uocat̄ a Mundino lacuna / ab Auic. caput rosę:
& ab aliis Embotū / quia est lata superius / stricta inferius / undiq;
circūdata a pāniculo tenui usq; ad os basilare: & p̄ istud Embotū
(ad p̄dictū os ibidē ut cribrū subtilissimis porris perforatum)
euacuātur ut plurimum humiditates superflue cerebri / quę po-

Ita in anfractibus multis ossis basilaris supra os palati locatis in
grossantur ab aere per nares attracto: & et a calore naturali: & de-
mum extra mittuntur per nares & os mediantibus faucibus in ea for-
ma quae omnibus nota est: propter diuersas causas diuersam ha-
bens substantiam / colorem / quantitatem et figuram / ex praedictis pa-
tent cerebri iuuamenta / quae tamen alia sunt ab Aristotele. & alia a
Galieno et a sequacibus / quos uide. Passiones omnium modorum pati-
tur: sua solutio est letalis / non semper sed ut plurimum.



In iuxta istud Embotum uersus posterius etiam sub uentre seu uentri-
bus antedictis: est certa uacuitas oblonga aequaliter / cuius parietes
sunt sicut nares antedictae / quae claudunt & aperiunt talem uacu-
tatem quando opus est / uel a motu praedictorum uermium: qui in media-
te sunt supra ipsas / uel alio motu a spiritibus facto.

Et istam uacuitatem communiter Authores ponunt pro uen-
triculo medio / in quo dicunt esse uirtutem cogitativam.

*Ventriculus
melius secun-
dum communem opi-
nionem.*

In posteriori parte huius medii uentriculi est foramen paruum:
quod tendit ad unam altam uacuitatem / quae descendendo est
uersus locum ubi est principium nuchae: et haec uacuitas non est
in cerebello antedicto ut putant multi: nec est circumdata undique
a substantia medullari cerebri / sed est inter posterius et anterius
cerebrum sita / circumdata notabiliter uersus cerebellum a pia ma-
tre ipsum regente.



Et inter istam ultimam uacuitatem et uentriculum medium
antedictum est certa caro glandosa conarium dicta: quia est in
forma conii siue pini: haec glandula ibidem sustentat multas ue-
nas pię marris / ascendentes uersus cerebri centrum / ut ipsum nu-
triant / et haec glandula transcolat multas humiditates ad medium
uentriculum antedictum / a quo ad embotum praedictum: et inde:
ut supra patuit: expurgantur.

*Caro glando-
sa conarium di-
cta.*

In ista uacuitate ultimo loco dicta / quae est post medium uen-
triculum / dicta uentriculus posterior / Authores communiter ponunt
uirtutem memoratiuam. Ego autem aliter sentio.

*Ventriculus
posterior secun-
dum opinionem
communem.*

Et dico primo uirtutem apprehensiuam / cogitativam / et memorati-
uam: esse in primis duabus concavitatibus pro anteriori uentriculo
positis / tam in parte dextra quam in sinistra / et apprehensiuam seu sensus
communis est in parte ipsius anteriori: et cogitativa in medio / in
posteriori uero eiusdem est memoratiua.





DE ANATOMIA



De ortu nu/
che.

Et dico uentriculū antedictum / quem authores ponunt pro
medio uentriculo non esse pro cogitativa / sed est uia pro expur/
gatione superfluitatum multarū cerebri / & pro deferendis spīri/
tibus ad tertium antedictum uentriculum / qui spīritus non ser/
uiunt uirtuti memoratiue / sed uirtuti motiue & sensitiue / qui ue/
niunt a primo uentriculo antedicto / sensui cōmuni seruientes: &
hinc comprehenditur q̄ nuca uirtualiter habet ortū a parte an/
teriori cerebri: uidetur etiam nuca substantialiter oriri a parte an/
teriori cerebri: tum ex ipsius colore: tum etiam ex cōtinuatione:
quę tamen ē etiam cōtinua cerebello posterius locato / maiorem
directionem tamen & etiam colligantiam habet cum cerebro: q̄
cum cerebello p̄dicto. Hęc tamen melius & uberius diximus
in cōmentariis super Mundino. Sed ut p̄dicta melius intelli/
gantur quales potui hic inferius duas accomodavi cerebri figu/
ras / in quibus aliqua ex p̄narratis cōphendi possunt ut uides.



¶ Hec in hac
prima figura
durā matrē se
patam a cere
bro/ cuius me
dientas a pōra
ad pupiz tegi
tur pta matrē
ut vides / In
altera hō pre
i cētro medul
lae/ est notabi
lis cōcūitas
sensui manife
sta pū? remō
ta multa cere
bri medulla :
q̄ habet p al
tera partū vē
tris āterioris
ante dicta / in
medio cuius
ē vermi sumi
lis substantia
rubea / in hac
etiā figura est
medietas em
boti asidici /
7 medietas
vētriculi me
dij 7 postero
ris.

¶ In hac secū
da figura vñū
a dextris aliū
a sinistris cē
tro medullae
cerebri habes
duos ipsi vē
tres āterōes :
7 sui vermes
possunt cōpre
hēdi ex pma
figura āte no
tata / 7 inter
ēstos/ āterius
tū est embotū
7 ventriculus
medius 7 po
sterior ut nō
strā hē locis
suis posita.

DE ANATOMIA

¶ De Neruis a Cerebro ortis.

Septem paria
neruorum.

Neruus.
Neuron.

Carunculae
mamillares.



Nervi optici
visus.

Nervi p. mo
in oculorum.
Unde omnes
nerui vocantur

Nervi gustus

Nervi audi-
tus.

Sextus & septi-
mus par ner-
uorum cerebri.

Ost p̄dicta sunt uidēdi nerui a cerebro orti: q̄ sunt cōiter
p̄ septē paria de quolibet pari: est utrinq; unus/ similis suo
sotio. Neruus. n. gr̄ce neuron dicitur: est membrum cō

simile/ album/ substantia uiscosum: figura oblongum & rotūdū/
ad separādum tenax & durum: sensus & motus organum: & p̄t
sensitiui sunt molliores & frigidiores motiuis.

¶ Eleua igitur leuiter cerebrū a parte anteriori incipendo: & in
uenies in directo superioris partis nasi duas subst̄tias albas oblō/
gas (utrinq; unā) herētes p̄e matri/ quarū capita sunt aliquātu
lū grossa/ q̄ a multis uocātur carūculę mamillares: & sunt instru-
mēta sensus odoratus/ quas Gal. nō uocat neruos: quia sunt mol-
les/ in directo ipsarū p̄nicipuli cerebri & os frōtis sunt perforati ut
cribrū: tū p̄p odores/ tū p̄p supfluitates cerebri expurgādas i ne-
cessitatibus: quę ut plurimū expurgātur p̄ colatoriū: qđ est in di-
recto emborti antedicti: & ibi ante i craneo ē certa uacuitas nota-
bilis aere ut plurimū repleta/ in quo aere secundū aliquos ab istis
carūculis primo percipitur sensus odoris.

¶ Post carūculas p̄dictas: uidebis duos magnos neruos: qui ser-
uiunt oculis pro uisu: & hi cridentur in crutari: de hoc tamen ad
huc sub iudice lis est. et hi uocātur optici seu uisus: q̄ secundū aliquos
sūt cōcaui seu p̄forati: hoc tñ negat sensus in mortuo animali.

¶ Post istos est unum par nernorum / quod ponitur pro secun-
do pari: & hi dant motum oculis.

¶ Post istos est tertiū par: quod paulisper unitur quarto / a quo
postea separatur: & descendendo spargitur per faciem: & intra &
infra os basilare unitur cum sexto pari nunc dicēdo: & simul fa-
ciunt neruos p̄dictos descendentes ad membra uentris medil
& inferioris: & ab istis oriuntur reuersiui.

¶ Postea sunt nerui quarti paris descēdētes ad palatū p̄ sensu gu-
stus: & hi sunt subtiles: alig tñ capiūt tertiū par p̄ quarto: & ecō/
tra/ sicut diximus i cōmētariis: & ibidē dixim⁹ eām talis erroris.

¶ Est deinde quintum par quod utrinq; difeminatur intra os ba-
silare in directo aurlum: & seruit sensui auditus.

¶ Postea ē sextū par: quod misceet tertio ut p̄dictū est/ postea est
septimū par: quod q̄a obliquū ē: dat motū linguę: & etiā aligbu.
musculis epiglottidi seruiētibz: dat ēt sensū gustus ipsi linguę.

Horū neruorū substantia est oībus nota/sunt tñ posteriores an-
terioribus duriores: quia pars cerebri posterior est durior antero-
re/ pp sensus interiores. Sua figura/ quātitas: situs/ numerus et col-
ligātia patent/ ī cōplexione nō sunt multū sicci: et ideo nō habēt
fortes motus: et sunt frigidi natura. Iuamēta sua etiam patent.
Passiones omniū modorū patiūtur/ quę oēs sunt prauę: propter
colligantiam suā cū cerebro & propter suas operationes.

*Nervi poste-
riorēs sunt du-
riores anterio-
ribus.*

De Rete Mirabili secūdu cōm opinionē:
et aliquid de Nucha.

Isis p̄dictis: depone totū cerebrū cū illa portiōe Nuchę:
q̄ est inter spondylos: quos secasti et cum capite seruasti:
prius ipsius notādo sitū/ substantiā: numerū/ et figurā/ sua
colligātia cū cerebro est dicta supius. Quātitas ipsius et alia ipsi
requisita melius notabūtur ex dicēdis: ī culus initio iuxta cerebrū:
est certa uacuitas cōtinua uacuitati cōiter positę pro uentriculo
memoratiue uirtutis/ p quā trāseūt ad suos neruos spiritus a ce-
rebro missi pro sensu et motu. Et Nucha (sicut et cerebrū) uelāt
a dura et a pia matre/ ut sensus demōstrat.

Nucha.

*Nucha uelāt
a dura & pia
matre.*

Istis notatis sup ē sola dura mater: q̄a remouendo cerebrū re-
mouet et pia mater/ pp ipsorū iuicem firmā et cōtinuā colligātiā.

Inter durā matrē et os basilare in regione ī crutiationis neruo-
rū opticorū ubi est collatorū antedictū/ ascēdunt p os basilare
duę notabiles arterię: una ē a dextris alia a sinistris: ut supra pa-
tuit in cap. de Aorta ascēdēte/ a quibus ut dicūt cōmuniter Au-
thores supra os immediate sub dura matre efficiūtur multi subti-
lissimi rami: inuicē mirabiliter unus supra aliū uniti instar retis:
occupantes ante/ retro et a lateribus magnū locum. Deinde ex
istis multis ramis iterū enascūtur duę arterię similes primis/ a qui-
bus efficiūtur p̄dicti parui rami: et hę duę uenę postea iterum
factę magnę supra craneū ascēdunt ramificate usq̄ ad uentres ce-
rebrī: ipsis portando spiritus subtiliatos in isto Rete mirabili.

*Rete mirabi-
le secūdu opi-
nionē cōez.*

Et iuxta istud Rete aliqui dicunt esse duas glādulas ipsum sub
stentātes: et dicūt iuamēta istius Retis esse: ut ibidem causetur
spiritus uitalis subtilis: ut melius ad minīma diuisus alteretur:
et efficiatur animalis: et forte ut ex uaporibus a cibo eleuatis: et a
cerebro condensatis inferius cadentibus: sui minimi rami facilius
oppilentur: et somnū causent.

*Iuamēta re-
tis mirabilis.*

H

DE ANATOMIA



Istud tñ Rete ego nūq̄ uidi: & credo naturā nō opari per plu-
ra id quod pōt p pauciora / sed natura pōt subtiliare hos spiritus
in minimis ramis arteriarū ascēdentiū supra durā matrē hērentē
ossi basilari: & per piā matrē usq; ad cerebri centrū ascēdētes: er-
go nō datur ibidē inter durā matrē & os basilare hoc Rete / mul-
tas alias rationes super hoc dixi in cōmētariis super Mūdino / ad
quos breuitatis causa remitto legentes: & inter alias rationes ex-
perientia sensualis est mihi Auriga: & si datur hoc Rete est supra
durā matrem imēdiate ifra cerebri medullā ex qbus arteriis mi-
nimis ibidē fit certa mēbrana continua & similis piē matri / in ra-
mis cuius subtiliaē spiritus uitalis & fit animalis: & sic subtiliatus
trāsfit ad uētres / mediātibus p parte uermibus cerebri añ dictis.

De Naso.



Nasus.

Alaria.
Alulae.
Lepor.
Colūna.
Diaphrag-
ma.
Septū porre-
ctū Interfiniū
Nares.
Uex Rete mi-
rabile.

Isis p̄dictis occurreret sermo de osse basilari / sed quia
u ipsius anatomia / maxime de suag partiū numero: ab au-
thoribus ponit diuersa / & etiā quia hoc os melius specu-
lat i cōmeteriis / q̄ i cōi sectiōe. Ideo de ipso sermonē p̄stringo: re-
mittēdo hui' artis cupidos ad cōmētaria nostra: & ad cōmeteria.

Dicamus ergo aliquid de naso / q de p̄senti capis pro parte illa
p̄cipua eminēti / q̄ a sup̄cilioꝝ cētro equali porrecta iugo utrāq;
aciem discernit & munit: huius mēbri partes inferiores laterales:
Gale uocat alaria / aliter alule dicitur / sua pars sup̄ior ab aliqbus
dicitur lepor & summū nasi / inferior etiā lepor & imū nasi / pars
media exterior ē dicta colūna: & ipsius interna pars diuidēs dex-
trā partē a sinistra uocatur diaphragma: septū porrectū: & Interfi-
niū nasi: & aliqui uocāt nasi inferiora foramina nares: & uia a nari-
bus p supra palatū ad fauces ab Aule. quinta tertiū uocatur Cha-
lasim / sed de p̄senti a nobis cauernositates supra palatū in osse
basilari locatę nares uocātur: in quibus sup̄fluitas cerebri humi-
da trāscolata ingrossatur / de qua aliquid diximus supra.

Nasi substātia est ex cuti / musculis / carthilaginibus: & ossibus:
& p̄niculo tegente ossa sua. Sua cutis est taliter musculis eius
unita / q̄ separi nequit / nisi difficulter. Sua pars anterior & iferior
est carthilaginea: superior uero ossosa. Sui musculi sunt duo par-
ui: duri tamen / unus est a dextris / alter a sinistris uersus inferius
magis / quia ambo oriuntur a pomis mandibularum: & mouent
alas nasi: ad quam partem uult homo.

Ala nasi.

¶ Post musculos sunt tres carthilagines/una in medio:& duę la-
terales: quę sunt molliores media / quę dura est satis/ut teneat
nasum (quem diuidit intra per medium) rectū & firmum.

¶ Ossa nali sunt duo triāgulata: frōti cōtigua/uerſus angulos la-
chrymar: pforata foraminibus paruis: a qbus humiditates i ocu-
los:& ab oculis in nasum:& a naso in ore penetrare poſſunt:& pp
hoc guſtatur ſapor medicinarū poſitar: in oculis a lingua.

¶ Et os frontis in directo naſi eſt perforatū ut cribrum. ut ſeruiat
pro odore: & ut p ipſa foramina exeāt humiditates ſup fluę a ce-
rebro:trāſeūdo prius p foramina/ q ſunt in ſuis pāniculis circa ca-
rūcularum mamillarum loca.

¶ Ex prædictis uiſa eſt naſi ſubſtantia: Numero eſt unū mēbrum:
diuiſum tamen in duas partes ad interius: ut ſi una pars ledatur:
altera firma ſit: ſua figura/ quantitas/ ſitus & colligantia patent.
Sua complexio ponitur frigida & ſicca. Sua iuuamenta ſunt ad
decorem & ad ducēdū & reducēdū aerem ad pulmonē: ducūt
etiam materiam/ per colatoriū ad cauernas ante dictas miſſam/

¶ Paſſiones omnium modorum patiuntur: & ſua ſolutio facilī/
ter cōſolidat / in ſui inferiori extremo interdū applicātur ſanguis
ſugę: ad ſaphati et ad id genus/ Sua propria paſſio ē leſio uirtutis
odoratus: q ipſi poteſt cōtingere principaliter ppter oppilationē
factā in foraminibus exiſtētibz in oſſe baſilari i directo prædicta-
rum carūcularum mamillarum.

¶ De Palpebris.

¶ Alpebrę a palpitādo genę etiā dictę/ ſunt pellicule ocu-
los tegētes oībz notę. Sua ſubſtātia ē ex carthilagine
& mēbrana / cū minima & forte ut aliquibus placet: cū
nulla parte carnea: exceptis ipſar: musculis:& ē carthilaginea: ut
i ipſa pili ſigātur: q ſtāt recti:& duri: ut melius tueāt oculos: hi di-
cūtur cilia: a celandis oculis: eſt etiā carthilaginea/ quia melius re-
ſiſtit extrinſecis:& ut ſtet erecta qñ apit / quia ſi eſſet pelſcularis:
deprimere ſe faciliſ: & cute tegitur propter tutelā & decorem.

¶ In ſuperioribus palpebris ſub cute ſua: eſt mēbrana a picranio
orta: quę intra ſelecti ſuam inuoluēs carthilaginē extra & intra
uſq; ad tunicā corneā: cōiunctiua mediāte tegente musculos ocu-
li: & in inferioribus ſimili modo eſt mēbrana orta a membrana

H II

Carthilagio

Oſſa naſi.

Colatoriū in
fronte.

Colatoriū.
Nares.

Palpebra.
Cilia.

Cilia unde.

pomorū faciei ossa tegēte: & isto modo uidetur quod cōiunctiua tunica oriatur etiā a pāniculo tegēte ossa inferiora faciei: in multis tñ indiuiduis ē aliqua caro/ cū aliquibus uenarū fibris imediate supra p̄dictū pāniculū/ quę (palpebra inuerſa) ſenſui patent a quibus uenis aliis cauſis coadiuuatibus/ ſit in oculo: ungula/ & ſebel: & uerucarū genus: & alii aliqui oculorum morbi.

Tarſum.

¶ Circa iſtā carthilaginē quā Gal. uocat Tarſum: eſt aliqua pin- guedo humectās palpebras neceſſitatis cā: ne exſiccēt pp motū ſuū fere cōtinuū: Supiores ſolę mouētur/ iſetiores uero minime.

¶ Et utrinq; ſuus motus eſt ex tribus muſculis teſte Auic. quorū unus apit: qui eſt in medio palpebrę: duo uero alii ſunt in angulis oculorū, qui claudūt: Gal. tamen. x. de util. cap. 9. nō uidetur ponere niſi duos muſculos: quorū unus dicitur eē in angulo uerſus aurem/ quem dicit apire: ſi ſolus moueatur/ & alius in angulo naſi/ quem dicit claudere/ ſi etiam ſolus moueatur: & ſi ambo equaliter mouentur/ non magis palpebra clauditur q̄ apiat: & hęc ſemi clauſio uocatur ab Hipp. curua palpebra/ quę inſert in morbis malū inditiū: & etiā Gal. ibidē cap. x. dicit q̄ nūq̄ cogno- uit muſculū p̄dictū ad angulū naſi locatū/ q̄a uidit ibidē magna applicati cauteria propter fiſtulas: & tamen adhuc remāſit motus in palpebris/ qui nō remaniſſet: ſi eſſet ibi muſculus.

¶ Et aſſertit. xi. de util. cap. 14. q̄ cutis muſculoſa frōtis: & pomorū faciei ſuo motu ſufficit ad clauſionē & apitionē palpebrarū: & aliqui addūt cū iuamēto muſculorū. Ariſt. tñ ſecūdo d̄ partibus aīaliū. c. 13. dicit palpebras moueri nō uolūtarię: ſed naturę inſtitu- ctu: mihi tñ uidet: q̄ habeāt motū propriū & cōem: cōis ē a mo- tu frontis & pomorū faciei: proprius uero eſt a ſuis p̄prijs muſcu- lis/ qui habēt ſuos neruos ānexos palpebris & muſculo mouēte frontē: & muſculis tēporalibus & pomorū faciei/ utrū aut iſti ner- ui ueniāt a nucha/ an a cerebro ſenſu nō p̄cipitur. Inquit tamen Auic. quod in ſola palpebra ſupiore ſunt muſculi/ quia ſunt pro- pinquiores ſuo principio. ſ. cerebro/ qui ſunt parui: & aliqui dicūt ipſos eſſe ſine cordis/ de ſitu quoq; aliqui inter ſe ſunt diſcordes.

¶ Et palpebre inferiores teſte Auic. nō mouentur: quia motus ſu- periorū ſufficit ad p̄fectā clauſionē & apertionē ipſarū ad inuicē: & inferiores ſunt minores ſuperioribus: & oculis magis cōiuncte ne pp magnitudinē & ſepationē ipſarū ab oculis aggregarent in ſe



Curua palpe-
bra.



similitudinem: & lachrymas: & alia extranea: teste Gal. x. de util.

In substantia palpebrarum i quolibet angulo seu catho uersus nasum: sunt duo foramina parua sensibus manifesta: unum in supiore palpebra: aliud in inferiore: p que exeunt lachryme: & i isto angulo sunt carnes spogiosae: q itra se tenent tale humiditate lachrymarum: ut humectent membra sibi uicina: ne exsiccent: & tales humiditates interdum ueniunt a naso: & etia a cerebro p uenas suorum paniculorum.

Situs palpebrarum/ numerus/ quantitas/ figura/ & colligantia patet/ substantia est tacta. Sua complexio ponit frigida & sicca: iuuamenta sua sunt tueri oculos a minutis & lenibus. Ossa uero adiacentia tuentur ipsos a magnis & duris: & iuuant in somno fiendo: sui pili: luuat etia oculos ne i palpebris aptis puluis & alia minuta ipsos ledant: & sua nigredine corroborant uisum: & non sunt ualde spissi: ne obstruant uisum: nec nimis rari: ut phibeant minuta intrare ad oculos.

Passiones omnium modorum patiuntur: & inter alias patiuntur suorum pilorum inuersione/ q curatur cauterizando quolibet pilum inuersum: in sua radice cum acu aurea: postea curant ut alia loca cauterizata.

De Anatomia oculorum.

Iis palpebris occurrunt oculi ab occultando dicti. Occultantur. n. inter palpebras/ ad quos uidendos scinde primo os frontis in directo ipsorum: taliter ut saltem alterum eorum uideas modo infra dicendo: notando primo neruum suum qui opticus est dictus/ qui perforando ipsius tunicas/ uersus centrum ipsius tendit: & iter coniunctiuam & Scleroticam est notabilis pinguedo/ & caro glandosa: suscipiens humiditates: sicut facit caro glandosa radice lingue: quas extra riuat: interdum per nasum: & per foramina que sunt in palpebris ante dicta: quibus mediatis/ tam pinguedine q humiditatibus/ seruantur oculi ab exsiccatione.

Ibidem sunt etia sui proprii musculi/ q sunt septem/ quorum unus mouet sursum/ alter deorsum: & unus alius dextrorsum: & alter sinister: & duo transuersaliter tendentes mouent circulariter: septimus uero est ppe neruum opticum/ quem sustinet: & eleuat: & ipsum tuet a laxitate: dum oculi firmantur i ituitu continuo: & ideo hic solus firmat oculum/ istum musculum aliqui dicunt esse duplicatum: & aliqui triplicatum: & hi omnes musculi habent suos neruos a secundo pari neruorum cerebri.

Vis predictis separa musculos/ pinguedinem predictam: simul & carnem glandosam a suis pelliculis/ que sunt realiter quatuor. Po-

H III

Angulus.
Lanibus.



Lura cliorum
inuersorum.



Oculi unde.

Neruus opti-
cus.

Coniunctiuam
Sclerotica
Pinguedo.
Caro glado-
sa.

Musculi ocu-
lorum.

Quatuor mu-
nicat.

Septē tunicae nuntur tñ cōiter septem/quia differūt aliquāliter/substātia/situ/ colore/figura/quāritate et complexione/colligantia tamen nō differunt. Differunt etiam aliquāliter in iuuamentis.

In istis pelliculis/ q̄ mēbrāne/et oculorum tunice uocātur/ sunt tres humores/ aliqui tñ addūt quartū/ quē ethereum uocant.

Tunicarū igitur istarū primo ante incipiēdo/ occurrit cōiunctiua/ sic dicta/ quia coniungit oculū capiti/ et hęc oritur a pīcrāneo/ et a pāniculo circūossali/ tegente inferiora faciei ossa/ et a pellicula intrinseca palpebrarū/ orta a p̄dictis pāniculis/ et hī pāniculi ēt tegunt orbitas oculorū/ et hęc sola est uere una tunica.

Ista cōiunctiua tamen nō regit ante/ totū oculū/ sed in loco ubi ipsa deficit ante oculū in medio/ est secunda tunica/ quē quia diaphanes est ut cornu/ cornea nominatur/ hęc secūdū aliquos quatuor/ habet tunicas subtiles/ ut cōpertū est in suis ulceribus.

Huic corneę uersus posterius est continua una tunica nō lucida/ sed opaca et dura. Ideo Sclerotica dicitur/ quē posterius tegit totū oculū. Hęc tñ est maior cornea/ et istę duę ab aliquibus ponūtur pro una/ solum propter colligatiā/ quia ambę per cōtinationē/ unius ad alterā/ oriūtur seu alligātur durę matri.

Post istas etiā ante incipiēdo/ est una tunica dicta uuea/ et coronoides/ et foraminālis/ quia ē perforata sicut coronat et sicut granum uue/ quādo remouetur a suo suspensorio seu racemo/ et suū foramen uocatur pupilla. Suus color est uarius/ sed sepe niger/ et Iridialis/ seu Lazuleus/ uel Ceruleus.

Huic uersus posterius cōtinuat una tunica/ quē est fere similis magnitudinis/ qualis est uuea/ et etiā eiusdē coloris/ et hęc uocat secūdina/ quā ipsa et ēt uuea oriūt a pia matre secūdina dicta/ uel ut aliqb̄ placet/ hęc secūdina nutrit oculū/ sicut secūdina foetū.

Post istas tunicas sunt duę alię tunice etiā simul continuę/ una anterior/ alia posterior/ q̄ est longe maior anteriore/ anterior uocatur Aranea/ posterior Retina/ Aranea est subtilis dēsa tamen/ lucidior adamātina gēma/ Retina etiā est subtilis/ sed nō lucida/ ut Aranea/ et Retina pro parte heret secūdine.

Inter has ultimas sunt duo humores. S. uitreus et cristallinus/ uitreus est posterior et laterālis/ sic dictus quia assimilat uitro liquefacto/ in parte cuius anteriori locatur humor cristallinus/ sicut locata est gēma in anulo/ humor uitreus est longe maior cristallino.

*Membranae.
Oculorū tunice
Tres humores.
Quatuor humores.
Coniunctiua uide.
Paniculus circūossalis.*

Cornea ubi et uide.

*Sclerotica.
Uuea.
Coronoides.
Foraminālis pupilla.*

Secūdina et uide.

*Aranea.
Retina.*

*Humor uitreus.
Cristallinus humor.*

lino sed crystallinus est durior vitro: & lucidus est ut gēma. Iste etiam duę antedictę tunicę oriūtur a neruo optico secundū Au-
thores: & ideo etiā iste duę tunicę ponunt pro una quę tñ si sint
una uel duę: sicut etiam alię parum conferunt medico legitimo.

¶ A loco continuationis secūdinę cū uuea ante uersus inter par-
tem Retinę & totam Araneā est humor dictus albugineus quia
assimilatur albugini oui. Hic tamen humor est paucus & fluidus
in mortuo animali quī in directo pupillę uenit usq; ad corneā &
ibidem est lucidus diaphanes magis q̄ alibi & ideo aliqui hunc
humorem uocant ethereum & sic ponunt in oculis quatuor hu-
mores & quia secūdina & uuea uidentur oriri a pia matre aliqui
ponunt ipas duas et etiā Corneā et Scleroticam pro una tunica.
Cetera diximus oculis spectātia in cōmentariis nostris.

¶ Ex prędictis uisa est oculorum substantia sunt siti in suis orbi-
bus. s. in duobus foraminibus magnis in frōte locatis & nō sunt
multū extra emīnētes ne ledantur ab extrinsecis & propter hoc
habent supercilia extra eminentia: & inferius ossa pomorū faciei.
Sui numerus colligantia figura & quantitas patent.

Obees siue or-
bitae oculorū.

Supercilia.

¶ Sua complexio propter humores ponitur frigida & humida: &
propter pāniculos ponitur frigida & sicca: & pro multitudine spi-
rituum ponitur calida. Sua iuuamenta sunt omnibus nota. Pas-
siones omniū modorū patiūtur. Sua propria passio est uisus ab-
latio diminutio & corruptio.



¶ Si hęc omnia nō potes uidere in uno oculo uide in ambobus:
uide saltē in uno musculos & carnem glandosam cum sua pin-
guedine simul & cōiunctiuā in alio uero uide tunicas & humo-
res. Docta tamen manus difficiliora perquirat.

¶ De Auribus.

Ost oculos occurrunt aures sic dictę ab hauriendis uo-
cibus uel quia audes sunt uocum & tā carthilago ipsa
rū: q̄ foramina dicūtur aures: sua pars suprema exterior
dicitur pina uel pirula & lobus inferior uero simbra & lobus: ubi
sunt certę uenę notabiliter fluentes si soluantur sua pars inte-
rior dicitur Scaphus.

Aures 7 vñ.

Pina pirula
Lobus.
Simbra.
Scaphus.

¶ Sua substantia est carthilaginea ut sit ab extrinsecis tuta & so-
nora: motu ut plurimū carent in ipsatū ima parte: aliqui putant
esse uirtutem memoratiuā. Ideo uolētes memorari ipsas partes

H iiii



Conchiliae.



Aer implātus.
Meninx.
auris.



Mandibulae
superiores.

cōfricant: ueritas est / q̄ illa cōcauitas postrema primi uentriculi duplicati cerebri / in qua ego pono uirtutem memoratiuā: tendit oblique uersus aures: & forte q̄ propter hoc cōfricatio talium partium iuuat memoratiuam.

¶ Hec mēbra tegūtur cute / aliquā tamen habent carnē: firmissime unitā suę cuti / In ipsis nō est sensus nisi diminutus. Sua figura est omnibus nota / sunt anfractuose: sicut conchilij: ut melius si / ne impetu inundet in ipsis aer faciens sonum.

¶ Suū foramen est in osse grossiore quacūq; alia parte cranij. Intra quod est certa uacuitas: quam claudit quidā pāniculus subtilis & solidus / secundū aliquos ortus a neruo audituo / qui est ex quinto pari neruorum cerebri.

¶ In p̄dicta uacuitate / quā ante uelat p̄dictus pāniculus: est aer implātus / qui suscipit species auditus / quas dat neruo audituo dilatato in pāniculū / qui uocat meninx auris: & tunc sensus auditus cōphēdit undā uocalē: & oēm aliū sonū ipsi adueniētē.

¶ Et huic pāniculo itra p̄dictā uacuitatem adiacent duo ossicula parua / apta moueri ab aere ibidē proximo moto / q̄ i suo motu se inuicē pcutiūt / a quibus secundū aliquos causantur oēs species soni: plus & minus secundū aerem extrinsecus motum.

¶ Sunt aliqui uolentes p̄dictū pāniculū oriri a pia matre / quę transit cū neruo audituo ad p̄dictā uacuitatem: de suo tamen ortu uide cōmentaria nostra.

¶ Ad hec bene uidenda requiritur docta manus / cum tenaculis: falce / serra & malleo apto / quia p̄dicta: tā neruus / qui uenit ab intrinseco: q̄ Meninx corrupte Mirynga dicta / quę est uersus foramen auris cum ossiculis p̄dictis: cum difficultate uidentur.

¶ Ex p̄dictis uisa est intrinseca & extrinseca auris substantia: suus situs / quāritas / figura / numerus & colligātia patēt. Sua cōplexio est frigida & sicca. Sua iuuamēta sūt oibus nota. Passiōes omnium modorū patiūtur. Sua propria passio est lesio uirtutis audituę.

¶ De Mandibulis superioribus.

¶ Iis auribus / ne aliqua pars capitis intacta maneat / ad superiores mādibulas uenio / q̄ postpositę sunt p̄dictis mēbris / melioris ordinis gratia. Iis mādibulis sunt tātum duo propria ossa: sub naso & per longū palati unica comisura diuisa: in quibus sunt dentes / qui sunt / figura / nomine / & numero

similes illis / qui sunt in inferioribus mandibulis.

¶ Secundum aliquos he mandibule superiores. xli. & pluribus sunt constitute ossibus: improprie tamen: quia ipsis addit oculorum ossa & ossa parisi & pomorum faciei: & alia ossa duobus ante dictis ossibus.

¶ Harum mandibularum substantia / numerus / quantitas / situs / figura colligantia & complexio patent. Sua iuuamenta sunt / que inferiorum: & que palati. Passiones omnium modorum patiuntur.

¶ De Anfractibus supra Palatum.

Faucibus supra palatum ad foramina nasi est uia ampla: arabice Chaisim dicta: per quam clauso ore continue spirat & respirat homo: hinc superius uersus sunt certe Camercule: Anfractus seu Cauerne: sub colatorio infra embotum cerebri posite: quarum parietes: osses: subtiles et pelliculosi sunt / hinc per nasi foramina: et per fauces ad os: cerebri grossa excrementa extrahuntur: et he uacuitates ab aliquibus uocantur nares.

Camerculae
Anfractus.
Cauerne.

¶ Ad ista bene uidenda: uiso prius magno foramine ossis basilaris per quod descendit Nucha: & bene inuestigatis illis sphondylis colli: quos cum capite eleuasti: serra / uel falce diuide os basilare per medium usque ad palatum inclusiue: & predicta omnia optime uidebis.

¶ De Anatomia Extremorum:

¶ X Pedito capite: in sectione communi primo occurrit pars colli posterior: Tenon: & Ceruix dicta / cuius finis est ab osse capitis basilari usque ad septimum sphondylum a capite inferius descendendo inclusiue.

Tenon.
Ceruix.

¶ Hec pars habet partes contentas & continentes: contentas sunt cutis / musculi / membrane: & sphondyli.

Cutis.
Musculi.
Membranae.
Sphondyli.

¶ Contentae sunt membrane nucham tegentes / ipsa nucha cum suis neruis / uenis / & arteriis.

¶ Continentium alie sunt extra / alie intra / que sunt extra: alie superiores / alie inferiores: & alie mediae.

¶ Exteriores superiores: uocantur ab aliquibus fontanella colli: & est locus ubi primus & etiam secundus sphondylus copulatur capiti. hic


fontanella
colli.

locus ab Auic. 4. primi uocatur Alchadam / in quo dantur cauteria multa ad diuersas capitis dispositiones: & ibidem et ponuntur setones.

Alchadam.
Setones.
Alchael.
Alchel.

¶ Sua pars infima ab Auic. dicitur Alchael / siue Alchel: & pars

Nucha.



media inter hæc uocatur nucha.

¶ Ab Alchael usq; ad Alchadā inclusiue; inter quēlibet sphondylum: dantur cauteria actualia pueris: i. p̄seruatione ab Epilepsia: & est remedium singulare.

¶ Inter partes cōtinētes exteriores etiā ponit̄ cutis primo occurrēs: q̄ ē excoṛiāda: ut alię partes exteriores cōtinētes uideātur. s. muscoli: q̄ i hac sectiōe postponūtur p̄p causā dictā i Anatomia p̄tū āteriorū: collū: q̄ tñ collū excoṛiādo possunt iuestigari aliquo modo cōfuso: & ipsos iuestigabis: notādo prius ipsorū quātitatē: substātiā: sitū: cōplexionē: & figurā: p̄positis: numero: colligātia: & ipsorū iuuamētis: q̄ integre nō possunt cōprehendi: p̄p ante positā sectionem capitis: & partiū anteriorū collū: quibus uis: occurrūt collū ossa: inter partes continentes posita.

Sphondyli
collū septem.
Nucha
Nucha.

Primus sphondylus.



Dens: & Pyramoide.

¶ Hęc ossa sphondyli dicūtur: & sunt septē: q̄ sunt subtiliores ceteris: q̄a debēt esse leues: ne grauēt corpus: & sunt tales: q̄a Notios: Nucha corrupte dicta: est grossior ibidem: quę descendēdo semper subtiliat: q̄a dimittit partē suę substātię pro quolibet sphondyli. Primus tñ sphondylus atlas ab aliqbus dictus: capiti unitus: in parte posteriori est grossior aliis sex: habet tñ latius foramen: & maior pars sphondyli usq; ad os factū habet alas & f̄menia: quibus hic primus caret: ut caput possit melius flecti ad p̄sterius: & ne laceret neruos iuxta se a nucha exeūtes. In isto etiā sphondyli uersus sup̄ius sunt duę foueę: in quibus intrāt duę buccellę ossis basilaris: iuxta illud magnū foramen: p̄ quod exit nucha: Habet etiā duas alias foueas: fere similes uersus inferius: in quibus ingreditur duę buccellę sectiōi sphondyli: licet sint aliq dicētes istas buccellas eē in primo sphondyli: & ingredi in secūdo: Primus sphondylus p̄ ligamēta fortia unitur capiti: sup̄ quo flectit̄ lateraliter.

¶ Post primū sphondylū seq̄tur secūdus Epistropheus dictus: eo q̄a p̄ ipsū collū uertit̄ q̄ differt ab aliis: in figura. Hic. n. sphondylus i suo sūmo habet certū additamentū: quod Hipp. noīabat Dētē: a iunioribus teste Gal. uocat̄ Pyramoidēs p̄p suā formā acutā: & hoc additamentum ingredit̄ in certā foueā: q̄ est in primo sphondyli: distincta a foramine: p̄ quod exit nucha: & p̄p hoc caput tu te mouetur ante: retro: & secūdū rotundū seu obliquū: absq; dislocatione sphondyloꝝ p̄dictorū: quę esset facilis: si ipsi nō resisteret p̄dictū additamentū: quia sūctura sectiōi sphondyli cū primo:

est laxior omni alia in tota spina reperta. Alię etiā spine colli iun-
cturę sunt laxiores suis inferioribus: & habent sua ossa simenta:
bifurcata: & parua/nē grauarēt corpus. Tertius sphondylus col-
li. A xon gręcę dicitur: alii colli sphōdyli partiali carent nomine.

¶ Post sphondylos colli: sequuntur duodecim sphondyli: quibus
unūtur utrinq; duodecim costę: & isti uocātur sphondyli dorſi: Sphondyli
dorſi.
qui gręcę dicuntur Riachis.

¶ Post istos sequuntur quinq; sphondyli lūbares & renales dicti: Sphōdyli lū
bares & Renā
les.
& ibidē sunt Renes & duo muscoli dicti lūbi: istā regionē Auic.
uocat Alchatim: & gręcę dicitur Oſphys: & hi sunt maiores alitis:
& locus qui est inter supremū iſtorū: & infimū sphondylū costa/
rum a Gal. dicitur Glutum: & ab Homero Acrusta. In ista regio
ne alligatur diaphragma. Alchatim.
Glutum.
Acrusta.

¶ Post istos sphondylos sequuntur tres alii: qui nō sunt sphondyli
nisi improprie: quia nō sunt similes ueris sphondylis in figura: &
hi ab Auic. uocātur sphōdyli Alhauius: & ab Auer. uocātur ossa Alhauius.
Ossa Agir.
Agir: & a Gal. os sacrum amplū: & teste polluce dicitur etiā Atlas
eo quia totius corporis molē sustinet / sed hoc os sacrum secundū
Gal. constat ex quatuor ossibus: quibus cōtinuātur ossa ancharę: Os Sacrum.
Ossa Ancharę.
quę utrinq; cū isto osse sunt firmissime unita: & mandato naturę
aperiūtur seu separātur ab inuicem in partu. Ista etiam ossa an-
charum / aperiūtur in tali tempore in pectine: ubi etiam natura
liter in aliis temporibus sunt firmissime unita.

¶ Post ista ossa prius posita ab Auic. tria sunt etiā tria alia ossa nō
dura ut supiora / sed carthilaginea quasi uocata ossa Alhofos & Ossa alhofos
Ossa caudæ.
caudę: q̄ etiā nō assimilātur ueris sphondylis: & nō dicūtur sphō
dyli nisi improprie sicut tres superiores imediare descripti: & sic in
totum cōmuniter ueri: & non ueri sphondyli sunt numero .xxx.
quorum omniū substantia: est ossosa cum aliquali carthilagine: Sphondyli
sunt .xxx.
intra suas iuncturas posita: & oēs firmiter per ligamenta sunt cō
iuncti: ne ex motu facilius dislocentur.

¶ Sua quantitas / figura / situs: & colligantia: est cōspicabilis. Sua
complexio patet: sua iunamenta sunt cū nucham et suos ner-
uos intra ipsos locatos. Sunt etiam fundamentū totius corporis:
sed principaliter hoc faciunt sphondyli tenum et Alhauius. Pas-
siones omnium modorum patiuntur.

¶ Ad hos sphōdylos bene inuestigandos requiruntur cōmeteria:

DE ANATOMIA



adiuuatibus aliquantulum nostris super Mundino commentariis: & ut sua substantia interior bene uideatur simul & sua medulla communiter nucha dicta magna falce diuide sphodylos per mediu: a capite usque ad caudam seruando melius quo poteris nucham & suos nervos illesam facta tali sectione: sua ossa considerabis: & etiam cartilaginem: & membranam partem ipsorum intrinsecam tegentem: & etiam ligamenta quibus he vertebrę seu sphodyli inuicem ununtur: his uisis ad nucham rede.

De Nucha.

Nucha & sui
nerui.
Duo paniculi
in sphodylis

Investigatis sphodylis partes contentę intra ipsos tam in collo quam alibi uidende sunt: quarum Nucha (dicta gręce Notos & Myelos) est principalior: cum suis nervis: alie partes sunt duo paniculi duri: & unus lenis: durior ceteris: heret ossibus: alter est loco dure matris: etiam durus: & alter est lenis loco secundine: seu pie matris: omnes circūdantes ipsam nucham & nervos.

Substantia nuchę est viscosa: humida cum aliquili soliditate: & est similis substantię cerebri: parum tamen durior: et quanto plus descendit: idurescit magis: & teste polluce in colore est subflauior cerebro: nec est medulla: ut putat aliqui: sicut neque cerebrum. Sua figura oibus patet.



Suus situs et locus: est ab infima capitis parte: descendendo usque ad secundum superius sphodylum reuerti inclusiue: et istum locum non transiit: sed ab isto loco infra. Tota nuchę substantia: in multos diuiditur nervos: qui descendendo usque ad ultimum caudem sphodylum per ipsos diuiduntur. Numerus: et quantitas patet: colligat oibus membris: ad quod uadunt sui nervi. Colligat etiam hepatis & cordis: mediate Aorta & chilia: per certas minimas uenas & Arterias ad ipsam tendentes per foramina sphodylorum. Hę uenę & arterię perforant membranas predictas duras: ipsam circūdantes: & ingrediuntur membranam lenem a pia matre ortam: qua mediate ipsi heredo ut sustentent nucham nutriunt & uitalitatem. Sua complexio cõter ponitur frigida & sicca: aliqui tamen aliter sentiunt.

Sua iuuamenta sunt: ut ab ipsa uadant nervi ad membra non in tanta distantia: sicut si uenirent a cerebro: & ut nervi sint magis distincti se inuicem non impediētes: & ut sint sicciores: & ne ex sua lesione imediate ledatur cerebrum: & et si non esset nucha: cerebrum esset malus: & nimis grauasset membra inferiora. Passiones omnium modorum patitur.

De Neruis a Nucha ortis.

Videtur sit Nervus: alibi diximus: non solum ipsorum substantiam sed figuram & complexionem. A capite igitur ad ultimum

spine dorsi descendendo sunt nervi a Nucha orti & hi sunt. xxxi. par nervorum & unus nervus sine sortio numerando sic. Primum par nervorum exit a primo sphondyli unus nervus est a dextris alter a sinistris sicut sunt etiam semper in omnibus aliis sphondylis. Et secundum par exit ab intermedio primi & secundum sphondyli. Et similiter est tertium par iter secundum & tertium sphondyli colli & descendendo usque ad Anum quilibet sphondylus habet unum par nervorum ipsi correspondentes aut in orificio quod est iter se & suum sortium aut in orificio sibi proprio sed ultimus sphondylus Alhousius quod est contiguus primo ex tribus ossibus Alhosos siue cauda habet suum par nervorum sicut & sphondyli sibi superiores. Sed inter ipsum & primum de sphondylis Alhosos est aliud par nervorum & per istud par duplicatum sunt triginta unum par & unus nervus impar quia descendendo in primo sphondyli est unum par & inter primum sphondylum & secundum colli est unum aliud par & inter secundum & tertium est etiam unum aliud par ab ultimo vero osse quod proprie cauda dicitur exit unus solus nervus & ut sic sunt triginta unum par nervorum & unus nervus impar.

¶ Istorum colligata est notior a quo quam ad quem colligatur maiori parti membrorum habentium motum suus situs & quantitas patet si cut & numerus. Iuvamenta istorum nervorum sunt dare motum & sensum. Passiones omnium modorum patiuntur.


¶ Ex predictis patet quod in humano corpore sunt triginta octo paria nervorum & unus nervus qui in totum sunt septuaginta septem exceptis illis duobus qui vadunt ad nasum pro virtute olphatiua qui contra non nominantur nervi quia sunt molles nimium. Ego tamen voco ipsos nervos in quantum sunt organa sensus odoris & ut sic sunt septuaginta novem quorum 63. nati sunt a nucha & 14. a cerebro vel 16. connumeratis secum carunculis mamillaribus de quibus supra dictum est in anatomia nervorum cerebri quod postea ad infinitos ramos & villos terminantur quos non comprehendit sensus & sunt isti. Nervus a cerebro venientes sunt paria septem seu octo. Nervus nuchae colli sunt paria octo. Nervus nuchae dorsi seu costarum sunt paria duodecim. Nervus nuchae renum seu Alcharim sunt paria quinque. Nervus nuchae Alhousius sunt paria tria. Nervus nuchae Alhosos cum duobus nervis iter sphondylos Alhosos & Alhousius sunt paria tria & unus nervus impar a cauda exiens.




xxxviij. paria nervorum & vn. nervus i totum lxxvij. vel i totum lxxix.

In ista figura potes facili-
ter uidere numerū sphon-
dyloꝝ / Et scias quod
a substātia primi sphōdyli
exēūt duo nerui: unus ab
utroq; latere: & numerum
neruorū potes notare in
extremitate linearum in
tali figura positarum.

Nota tamē lector q̄ ista
figura nō habet ueram si-
militudinem cū spondylis
nisi in numero: sed sua ue-
ra figura melius uidetur ī
figura subsequēte: quia illa
est uera sphōdyloꝝ for-
ma. Istā tamen sphōdyloꝝ
primā figurā hic posui: q̄
in hac melius uidetur si-
tus et numerus neruorū
nuchę q̄ in figura subse-
quentē.



Unus neruus solus.



In ista figura habes veram omnium sphondylorum formam qui bus et potes videre numerum nervorum illuc venientium qui sunt tota quot sunt lineae ipsis continuae excepta ultima: cui non est signatus aliquis numerus qui indicat unum solum nervum oriri ab osse caudae. Hec est in hac figura forma vera secundum sphondyli colli qui dicitur Epistropheus in quo est certum additamentum Dens et Pyrinoides dictus. In hac est figura huius ultimi ex sphondylis reni simul et os sacrum seu sphondylos althouus et sphondylos Althouos seu caudae vides etiam qualiter ibi os ancha alligat os sacrum melius tamen vides ipsorum forma in coemeterio exsiccat sicut et alia corporis ossa.

DE ANATOMIA



**Sanguis ma-
nus tres ptes.**

**Prima pars
adiutorii/ su-
pra qd est spa-
tula Brachii
Cubitus.**

**Parua man-
us vbi manus.**

**Raseta: ascha
Carpus.**

**Uena basilica
Regia.**

Jecoraria:

Hepatis.

Ascelaris.

Axillaris.

**Ascella qd r
pp qd graui-
ter ossat.**

Emulctoria.

**Locus basi-
licae.**

u **I**stis predictis ad uenas manuū phlebotomati solitas pri-
mo deuenio/ cum quibus etiā uidebimus carthilagines:
ossa/ medullā/ & ungues/ postpositis taliū mēbrorū mu-
sculis: qui in cōi sectione nō mōstrātur. Musculorū tñ notitia est
Chirurgicis maximū iuuamentum: teste Auer. primo colligeret: &
ideo/ qā in p̄senti nō possunt mōstrari/ ponemus in fine opis cer-
tas imagines aliquos musculos/ maxime exteriores demōstran-
tes. Ponemus etiam imagines ossa principalia indicantes.

¶ Primo igitur occurrūt duo mēbra lateraliter locata/ q̄ ab hu-
meris usq; ad extremitatem digitorū: Magnę manus a Gal. sunt
uocatę: hęc mēbra de presenti tres habent partes.

¶ Prima pars a superiori incipiendo cōmuniter dicit̄ adiutoriū:
supra quod est spatula/ q̄ etiā ab aliquibus ponit̄ i magna manu.

¶ Sub prima parte adiutoriū dicta: est secūda dicta brachiū: & in-
ter has est iunctura dicta cubitus: cōmuniter tamen brachium a
multis sumitur pro prima & secūda parte antedicta.

¶ Sub secūda est tertia pars: parua manus dicta: & ista ē proprie
manus/ ab emanādo dicta/ quia ab ista parte fere omnia artificia
emanāt. Inter istā & secūdā: est una iunctura ex pluribus ossibus
cōposita/ dicta arabice Raseta: & Ascam/ & gręce Carpus.

¶ Istis notatis/ excoriabis totā cutē magnę manus cū diligentia
a collo usq; ad digitorū extremitates/ & uidebis primo uenā Ba-
silicā. i. Regiā/ antiqui ante Arist. istam uenā uocabāt Iecorariā:
& adhuc seruat illud nomen/ quia cōmuniter dicitur uena hepa-
tis: dicitur etiam Ascelaris/ seu Axillaris/ quia ut supra patuit in
Anatomia uenarum: hęc uena transit per Ascellam.

¶ Est enim Ascella locus ille utrinq; cōcauus/ qui est infra hume-
ros: in parte laterali inter supremā partē pectoris & supremū ad-
iutoriū/ qui quia in respirabilis est: in multis grauiter olet. minime
enim euētur teste Arist. i proble. in his locis est notabilis pars
carnis glādosę: quę suscipit cordis aliqua excremēta: sicut & car-
nes quę sunt circa inguina: & in collo circa guidez nō multū di-
stantes ab auribus/ quę suscipiunt supfluitates hepatis: & cerebri:
& ista loca uocantur emulctoria cordis/ hepatis & cerebri. Istę ēc
carnes sunt stragulū magnis uenis circa ipsas locatis.

¶ Hęc uena Ascellaris & basilica dicta: descēdit per iterlus & in-
serius brachii cū arteria sibi sotia usq; ad certā distantiam: deinde

sola uena notabiliter manifestatur circa iuncturā cubiti in parte intrinseca: & ibidē phlebotomā: & cōfert principaliter morbis pectoris/ quia imediate est unita uenis nutriētibus suas partes.

Basilica phlebotomata ad qd cōferat.

Et a collo uero p exterius ab humeris ad istā iuncturā: p adiutorium transit una uena: dicta spatularis/ humeralis/ & cephalica: q etia circa iuncturā cubiti phlebotomā: quē principaliter cōfert morbis capitis/ & colli/ quia imediate unitur uenis guidez.

Spatularis.
Humeralis.
Cephalica.

Inter istas est una uena trāsuersaliter tēdēs ab una ad aliam/ a quibus suscipit indifferēter sanguinē: hęc uocat nīgra/ cōis: & media/ qā euacuat a mēbris capitis: & pectoris/ & cōsequēter a tota suprema parte: qua mediante euacuat etiam ab inferioribus.

Nīgra cōis media.

Et cephalica ut plurimū sola directe descēdit: usq; ad paruam manū/ inter indicē & pollicē/ & uocatur ab Albucasi/ & a Rasi: & etiā a me: uera funis brachii: & a Cauliaco/ & a Canamusali: dicitur cephalica ocularis. Hęc incisa cōfert capitis morbis: propter colligātā cū cephalica pēdicta: & etiam propter directionē.

Funis brachij
Cephalica
ocularis.

Basilica uero: etiā sola: descēdendo fere usq; ad manū p iterius & inferius/ obliquitur uersus exterius circa paruam manum/ quē emittit a se ramos inter minimū: & annularem digitum/ & hęc incisa euacuat a pectore: basilica pēdicta mediante.



Inter istas duas uenas paruē manus: sunt ut plurimū rami alii/ qui inter indicem & medium: & inter mediū & annularem/ qui incisi stant loco uenę cōmunis: sed ramus/ qui est inter indicem & medium: plus participat cum cephalica: & qui est inter mediū: & annularem: plus participat cum basilica.

Uena cōis in manu.

A cephalica supra cubitū p exterius brachii: descēdit una uena a multis etiā funis brachii nominata/ q ut plurimū terminatur in uenis pēdictis a lateribus mediū digiti existentibus: & hęc funis brachii nō est in usu phlebotomādi: Posset tamen secari ne cessitatis causa: & educeret a capite/ quia cephalicę est cōtinua.

Alia funis brachij.

Sepe etiam a uena cōmuni/ quę est in curuatura cubiti/ oritur unus ramus: qui solus absq; ramo cephalicę pēdictę descendit inter pollicē & indicē: & ideo aliqui dixerunt istū ramū incisum conferre in morbis: in quibus cōfert uena cōmunis pēdicta.



Sepe etiam ab ista uena cōmuni inter indicem & pollicem nō descendit aliqua uena: & hoc ego pluries notauī/ non solum in

DE ANATOMIA

ista sed in multis aliis uenis: uidi ipsas & etiā arterias uariare sitū:
& in aliquo indiuiduo sui rami sunt deficientes: & in aliquo su/
perfluētes: & propter hoc (iudicio meo) multi authores sunt di/
scordes.

¶ Sepe etiam inter indicem & pollicem / est ramus compositus
ex ramo cephalicę: & ramo uenę cōmunis: & tunc euacuat a cō
muni: & a cephalica: & magis a cephalica q̃ a cōmuni: propter
maiorē directionē. Directio. n. uenarū ad mēbra multū cōfert
ad euacuationes: teste Gal. in libro de phlebotomia.

¶ Et hęc de pręsenti sufficiant de uenis manū ad quas bene in/
uestigandas: cōsiderande sunt infraposte imagines: in quibus ui
dentur situs & nomina aliqua uenarū principalium.




mus ingredif illum ramū venae cephalice defcēdentis q̄ terminatur iter idicē & pollicē q̄ ab Alibucā dē su/
nis brachij & etiam ab aījs vt supra patuit.

Ubi video i
vna figura ve
ram funē bra
chij ab hume
ro tēdere dre
cte vsq; ad in
dicē & pollicē:
q̄ vocat salua
tella a mēdi
no in manu
parua & a Di
no & ab Ugo
ne & a sequaci
bus sceylez q̄
ab Alibuc. ha
bet p vno ra
mo venae cō/
mūis & vides
in abab^o figu
ris q̄ iter basili
ca ē i pte do/
mestica bra
chij & eā nu
trit & qualiter
ab ea obliqua
tur vnus ra
mus x̄sus p̄ē
situefrem ma
nus ppe iun
cturā q̄ vadit
iter minimū &
ānularē & vo
cat ascellario
a Sal. & a se/
quacibus q̄ ē
ramus ascella
ris seu basili
cae & istū ra
mū inter mini
mū & ānularē
videbis i sub/
sequēti figura:
vides ēt i istis
duabus figu
ris/venā cōez
q̄ ē ramus in
ter cephalicaz
& basilicā seu
ascellare: & vī
deo q̄lit a cōi
vena vnus ra
mus i
3 ij

DE ANATOMIA

In istis
 guntis videt lo
 e' saluatellae
 rāsūm & lo
 e' saluatellae
 Rasis: & lo
 cus sceylem
 Aluc. & locus
 salubris Halij
 & locus illius
 rami basice
 q terminat in
 ter manū &
 ānularē: quas
 venam rāsūm
 vocat saluatel
 lā: & videt qū
 ter illa vena q
 dicitur lūmē bra
 chij ab Aluc.
 terminat circa
 digitū mediū
 i ramo venae
 q dī sceyle ab
 Aluc. & salu
 bus ab Halij
 i hac etiā figu
 ra videt qūter
 dā funis bra
 chij est ramus
 Lepthalicæ q
 terminat inter
 idicē & polli
 cē: & i istis ve
 nis sunt picci
 & ēt in alia fi
 gura aliq ra
 mi parui qui
 disseminant p
 musculos bra
 chiorū & mai
 nū & ois ve
 na nostri cor
 pōis hēt il
 los: q tādē ter
 mināt ad ca
 pillares vās:
 & qūis qūlibet
 vena in istis fi
 guris picta nō
 bēat illos: hoc
 ēt nūbil re. err.



Isis uenis saltē in una manu / q̄a sufficit / oīa sua ossa sunt
 u denudāda / cū q̄bus etiā est uidēda spatula: facta ut ma-
 nus ab ipsa sustentet: & ne adiutoriū alibi cū pectore sit

Spatula.

cōtinuū / q̄a facilitas opatiōis manūū unius ad alterā destruere: &
 & fieret angustatio: & fuit sepata a costis propter suū fortē motū:
 & quia sic locata melius tueretur mēbra pectoris uersus posterius:
 & fuit lateralis: ne in motu obuiet sphōdyli: uersus quos est sub
 tilis / & lata ut spata: ideo uocat spatula / sua pars uersus adiutoriū
 est grossa / in capite cuius est certa cavitā pixis dicta / In qua reuo
 luitur extremitas supior rotōda adiutoriū: dicta uertebrum.

Lata ut spa

ta spatula,

pixis.

Uertebrū:

forma ossis

Spatulae.

¶ Os spatulę ibidē habet duo additamenta: unū est ad supiora:
 & posterius / quod ligat cū furcula supiore pectoris: & uocatur ro
 strū corui / cuius iuuamētum est prohibere ne adiutoriū ad supe
 riora de suo moueatur loco: Aliud de dictis additamētis est inte
 rius & inferius: quod etiā dislocationē adiutoriū prohibet:

¶ Hoc os supra sui dorsum habet substantiam triangulatam: cu
 ius basis est uersus posterius: & sua eminentia est uersus interius:
 ne dorsi superficies eleuetur in acutum: & de facili lēdatur / in cu
 ius extremitate est carthilago.

¶ Aduerte q̄ carthilago est duplex / una quę omnino est durior
 ossē quacūq; alia parte aiālis: & hęc est i extremo latiori ossis spa
 tulę: & in pectore & epiglottidi: & etiā alibi in multis locis: & est
 etiā una alia carthilago durior ista / quę tñ est mollior ossē: & hęc
 est in extremitatibus ossiū magnę iūcturę / q̄ ab Aui. uocatur
 Alaguahic: hęc imēdiate heret substātię ossiū / alia uero carthila
 go i p̄dictis iūcturis heret isti Alaguahic: & carthilagini molliori
 antedictę postea imēdiate herent in iuncturis ligamenta / ossa in
 uicē ligātia: & hęc optime uidētur in ossibus ultimate decoctis.

Carthilago
duplex.

Alaguahic.

¶ Visa spatula uide os adiutoriū / quod est malus de ossibus ma
 nus / cuius figura est omnibus nota: aliquid curua in cuius cō
 cavitāte: sicut & in aliis multis ossibus est medulla / dicta medul
 la: quia est in medio ossium.

Os adiutoriū

Medulla vñ

¶ Medulla. n. teste Arist. secūdo de p̄tibus aiāliū: est alimentum
 sanguineū: & est cōcociū / cōtentūq; excrementū: & Aulc. prima
 primi dicit ossa nutrirī ab ipsa: & hinc cognoscit artificiosa natu
 ra / quę cū nō habeat semp uenas aptas pro ossibus / In suis poris:
 & cōcavitatibus ponit suū alimētū: & si ē etiā supfluitas: i ipsis po

Quid sit me
dulla.

DE ANATOMIA

nit etiā extremētū cū nō habeat aliū locū p̄dictis accōmodatū.

Cubitus ubi.

¶ Extremitas inferior ossis adiutorii duas habet eminentias/ quibus coniūgitur duobus fociis brachii/ faciēdo cū ligamētis fortibus iūcturā cubiti/ & in cavitāte/ q̄ est iter p̄dictas eminentias/ in/ grediēti extremitas fociis inferioris/ quod ē maius superiore/ q̄ est curua/ ut iūctura sit firmior/ p̄p quasi cōtinuos/ & fortes motus hu/ ius iūcturę/ q̄ p̄p hoc ē raro dislocat/ & si dislocat cū difficultate i pristinū gradū reducit. Focilia brachii sūt ēt p̄caua/ q̄a oīa ossa/ uel sunt itra cōcaua uel porosa/ ut sint leuia/ ne grauet corpus.

Focilia bra/ chij.

¶ Et extremitates istoz fociiū/ & omniū ossiū/ & iuncturarū ma/ nus/ & pedis/ sunt grossiores q̄ in medio/ quia in extremis debēt esse magna ligamēta/ p̄p iuncturarū fortitudinē/ & i medio sunt subtilia/ ut cedāt locū corporibus musculorū/ qui necessario pro/ pter multiformes motus/ debent esse multi & magni.

¶ Post ossa brachii sunt ossa raseta/ siue carpi/ quę sunt octo pro/ pter multitudinem motuum/ & etiam propter aliud.

Uola/ Pal/ ma/ Nomine caris.

¶ Postea est parua manus/ pars cuius interior sine digitis/ uola/ & palma uocat/ pars uero ipsius exterior teste Arist. primo de histo/ noie caret/ sua ossa sunt quatuor/ excepto pollice/ aliis digitis co/ respondētia/ ex quibus cōponit pecten manus/ & procarpū/ seu procarpū/ & antecarpū/ & metacarpū/ sunt tñ aliqui q̄ uolūt/ q̄ primū os digiti pollicis sit in Raseta/ & ut sic pollex nō habet nisi duo ossa/ & aliqui dicūt/ q̄ primū os pollicis est i pectine manus.

Pecten ma/ nus.

Procarpū.

Procarpū.

Antecarpū.

Metacarpū.

Pollex.

Index.

Medius.

Medicus.

Annularis.

Minimus.

Auricularis.

¶ Post pectinē sunt digiti/ primo est pollex/ q̄ habet duo ossa ex/ tra uolā/ postea est index sibi proximus/ iuxta quē est medius lon/ gior aliis/ postea est digitus medicus/ & annularis dictus/ postea est minimus auricularis noīatus. Hi quatuor habēt tres iuncturas/ & tria ossa/ & ē pollex iudicio meo hēt tres iūcturas/ & tria ossa/ q̄a ego nō pono primū os ipsi seruiēs/ nec i Raseta/ nec i pectine.

¶ In intrinseca parte digitorū est notabilis caro/ q̄ est stragulum ossibus/ ne lēdantur in cōtinuis obuiationibus rerū durarū/ quas necessario tāgunt in opatiōibus manū. A lateribus uero ipsorū est minor caro/ & minor in exteriori parte/ quia istis partibus nō obuiant lēdentia in suis operationibus sicut intra manum.

Corde digito/ rum.

¶ Corde istoz digitorū maxime exteriores ingrediūtur iūcturā suā supius/ & quilibet digitus habet cordā/ de quibus i p̄senti nō sit sermo/ q̄a nō possunt uideri/ sui musculi quoz alig sunt in alto

In brachio locati: & chordę aliq̃ ad digitos uenit a ceruice/ut
latius diximus de digito anulari in cōmētariis super Mūdino.

¶ In magna ergo manu sunt. xxxi. ossa/exceptis ossibus si famiis: *Ossa manus*
q̃ replēt aliq̃s iūcturas: & p^o ē os spatulę/ postea os adiutorii: p^o / *quor sūt xybi.*
stea duo focilia brachii/ & .8. Rasetę/ & .4. pectinis: & .15. digitorū.

¶ In fine ossiū digitorū sunt unguēs/ quaq̃ iuuamēta sunt ad de *Ungues.*
corē manus & ad tutelā extremitatis digitorū: & ad capiēda mi
nuta: & unguēs generātur ex supfluitatibus: sicut & pili: ideo cō
tinue crescūt: etiā mortuo hoīe: ex p̃dictis patet manuū substan
tia/ situs/ numerus/ figura: & colligātia ac sua quātitas patēt: sua
cōplexio est qualis sunt suę partes. Sua iuuamēta nō possunt de
scribi. Sūt. n. organorū organa: passiōes omniū modorū patiūtur.

¶ De Anatomia Pedum.

His manibus: uidet etiā pedes/ saltem unū/ qui sufficit in
ista sectione: sicut & una manus: pes igitur diuiditur in
magnum & paruū/ sicut & manus teste Haly & Gal. &
pes teste Haly: habet quatuor partes/ prima pars dicitur ancha:
Secunda coxa/ Tertia crus. Quarta pes paruus. *Pes magnus
& paruus.*

¶ Et primo est ipsius cutis excoriāda undiq̃ a sūmo ad imū/ In
pte cuius intrinseca sub cute ab īguīne p̃ coxā descendēdo: ē unus
notabilis ramus uenę chilis: q̃ cū ē sub poplite: ut supra diximus:
tripartit: unus directe descēdit p̃ interius usq̃ ad cauillā dome/
sticā pedis: & hic uocatur saphena/ q̃ in diuersis secatur morbis. *Ancha: Co/
xa: Crus:
Pes paruus.*


¶ Vnus alter obliquatur uersus exterius p̃ surā & descēdit ad ca
uillā syluestre: seu exteriorē: & hic uocatur ischiadica/ qui secatus
p̃fert dolori ischiadico: & huius bifurcationē nō cognouit Mun
dinus/ nec sui sequaces: & forte qđ hic ramus p̃fert dolori ischia/
dico quia aliqui sui ramī uniūtur cū ramis uenarū nutriētū mu
sculos & partem exteriorem coxe uersus iūcturam ischiorū. *Vena chilis
tripartit sub
poplite.
Saphena.*

¶ Inter istos ramos ī Raseta pedis sunt uenę: utrinq̃ p̃dictis ra
mis cōes/ q̃ interdū secātur: maxime si alter istorū duorū ante di
ctorū nō repiatur/ q̃ sepe cōtingit/ quia ut supra patuit uenę nō
seruant eūdem situm/ nec numerū: nec etiam quātitatem. *Ischiadica.*

¶ Inter saphenā p̃dictā: et ē ischiadicā sub poplite usq̃ ad pedē
paruū: descēdit unus ramus notabilis/ qui mediū tenet iter has:
q̃ pōt secari loco deficiētē alterę p̃dictorū. In infrascriptis ima
ginibus uidetis p̃dictas uenas saltē saphenā/ et ischiadicā. *Vena media.*

DE ANATOMIA

In istis tri-
bus figuris ha-
bes omnes ve-
nas phleboto-
mari solitas i
pedibus: & in
illa figura q̄ ē
in medio vi-
des qualiter
vna vena sa-
tis magna ve-
niens a parte
domestica co-
xae obliquas
descendendo:
& sub poplite
bifurcatur: cu-
ius vnus ra-
mus vadit p
domesticā pte
pedis seu cru-
ris: qui voca-
tur Saphena
vsq; ad pedē
parvū. Alter
vero ramus
vadit per par-
tem siluestrez
pedis: qui vo-
catur scia: & isti
rami taz inte-
riores q̄z exte-
riores viden-
tur in figuris
lateralibus: q
phlebotoman-
tur circa cauil-
lā vel circa di-
gitos pedū.



¶ **I**stis uenis pedis: musculi sunt remouēdi totaliter ab ossibus: sicut & i manuū sectione factū est pp eādē causam: notādo circa īguina illā carnē glādosam: q̄ ē emulctoriū *Emulctoriū hepatis.* hepatis: iuxta quā trāsit ramus p̄dictus uenē chilīs descendētis a quo fiunt saphena & ischiadica uenae: & in tali carne imbibūtur materiē superfluentes hepati: ut alibi diximus.

¶ **R**emotis musculis remanent pedis ossa: quorū a superioribus primo occurrens: dicitur os anchē: quod os utrinq; est unum: hęc *Os Anchae.* duo ossa in posteriori parte: uniūtur firmissime ossi sacro seu ossibus Alhouius. In pectine uero se inuicem iungunt: Et tam ante q̄ retro: hęc duo ossa nutu dei aperiūtur in partibus: & propter partum hęc ossa sunt magis curua & ampliora in foemina q̄ i mare: & hęc ossa quatuor habent nomina: ante uocātur ossa pectinis: penis: pubis: & femoris: & ad partem posteriorem uocantur ossa anchē: & ad superiorem & anteriorem uocantur ossa iliū: & *Ossa pectinis penis: pubis: femoris.* Alharthapha: & ad inferiorem in loco in quo est concauitas p̄xis dicta: in qua ingreditur caput ossis coxę: superius rotundum uertebrium dictum: uocātur ossa ischia & acceptabulum. *Ossa anchae Ossa iliū. Alharthapha. Ossa ischia. Acceptabulum.*

¶ **I**stis duobus ossibus anchorū in parte posteriori adiacent nates. *Nates.* a nitendo dictę: & sessus a sedēdo: in istis partibus caro est densior: q̄ in ceteris mēbris: ne premente corporis molle ossibus prematur: & istę partes secundum aliquos habent colligantiā cum toto: ideo dicunt uentosas: & sanguisugas ibidem applicitas esse uicarias phlebotomię: & sunt obrusi sensus quia parum nerueę sunt: & prestant inter alia iuuamēta requiem corpori sedendo: tuentur etiam Anum a frigore: & sunt ad decorem abscondendo locum excrementorum. *Sessus.*

¶ **P**ost istud os seu ossa anchę sequitur os coxę: lōgum: interius *Os coxae.* plicatum: & exterius cōuexū: & grossum maius omni alio corporis osse: uacuū: ut sit leue: in quo est medulla: sicut & in aliis magnis ossibus: & iūctura inter istud os & os anchę: uocat ischia: istud os habet duo additamēta supius: & duo inferius: sed superiora sunt maiora: quorū unū ingreditur p̄dictū p̄xide ossis anchę: in cuius cetro p̄ter alia ligamēta: cū uno ligamento cordoso: rotūdo: & duro: firmissime unitur: ne de facili dislocetur.

¶ **E**t sua additamēta inferiora iūgūtur duobus fociis cruris: in parte quorū anteriori: est os planū rotundū Rotula dictū: & hęc *Rotula.*



Ossa pectinis
penis: pubis:
femoris.
Ossa anchae
Ossa iliū.
Alharthapha.
Ossa ischia.
Acceptabulum.
Nates.
Sessus.

DE ANATOMIA

Genu.

Crus/Crea
Sura.
Focilia: Arū
dines. Colla:
Tibiae/Lan
nae.

omnia ossa inuicē ligātur firmissime p ligamēta : & hęc iunctura uocatur Genu/cuius pars posterior uocatur poples.

¶ A Genu ad paruū pedē est crus/cuius pars anterior crea dicit̃ & posterior sura / in ista parte sunt duo ossa p̃dicta / q̃ uocātur focilia: arūdines/colla/tibię & cāne. Ista duo focilia differūt quātitate: nā in domestica pte/locatū est longius & grossius illo/ quod locatur in syluestri/ & minus nō cōiūgitur cum osse coxę/ sed in fra genui heret magno focili/ ut ipsū fortificet/ & rectum teneat.

Os Cahab.
Lauillae.

¶ Ista duo focilia uersus inferius terminātur ad unū os pedis parui/ qđ ē satis grossum ab Aui. noiatū os Cahab : ad latera cuius p̃dicta duo focilia faciūt illā eminentiā utrinq; q̃ cauillę dicūtur: & ex his omnibus constituitur maior iuncturā pedis parui.

Mons Altū
pedis.
Os cahab.
Os calcanei.
Naviculare.
Quatuor ossa
rasete.
Os Sisamiū
Quinq; ossa
pectinis.
Quatuordecim
ossa digitorū.


¶ Pes etiā habet cōcavitātē inferius/ & cōuexū supius/ qđ dicit̃ mons & altum pedis : & totus pes cōponitur ex multis ossibus: quorū primo occurrens est os cahab p̃dictum : sub quo est os calcanei/ quod stando est uersus inferius decliue/ ante os cahab: est unum os dictum naviculare/ deinde sunt quatuor ossa rasete: quibus uersus exterius unitur unum os sisaminum/ deinde sūt. 5. ossa pectinis pedis : postea sunt. 14. ossa digitorū: i iūctura media pollicis uidentur etiam duo ossa sisamina sic dicta/ quia assimilan tur granis sisami.

Ungues.

¶ Et corde extēdētes digitos incipiūt in crea/ & ipsos cōtrahen/ tes sunt i plāta pedis/ q̃ corde cū suis musculis non possunt bene uideri nisi in corporibus in aqua eliquatis/ uel in sole exsiccatis.

¶ In extremitate ossiū digitorū sunt etiā unguēs/ quarū iuuamēta sunt ea/ quę in manibus/ hoc excepto. s. q̃ nō sunt pro capien dis minutis: Ex ante habitis uisa est pedum substantia/ In quibus etiā sunt carthilagine/ Alhaguahic: & ēt Arterię/ sicut in mani bus. Suus situs/ figura/ quātitas/ colligantia/ & numerus patent. Sua complexio est qualis complexio mēbrorum organorum: Sua iuuamēta sunt mutare locum/ & portare superiora ad libitū animę/ pro ut possunt. Passiones omnium modorum patiuntur.


Sequitur figurę musculorum & ossium.



Hec est fi-
 gura q̄ assi-
 mulatur homi-
 ni excoato a
 cunctis qua vi-
 detur figurae
 musculorū ex-
 teriorū partis
 anterioris ho-
 minis p̄ quas
 iuuatur medi-
 ci in cognosce-
 dis capitibus:
 ⁊ etiā p̄tibus
 medij muscu-
 lorū: vt inde
 meli⁹ possint
 prognostica-
 ri vulnera vlc-
 cera ⁊ aposte-
 mata: ⁊ vt et
 sciāt facere se-
 ctiones vlcerū
 ⁊ vulnerū: ⁊
 alias chirurgi-
 cales opatio-
 nes absq̄ lac-
 siōe cordarū:
 quae sūt in ca-
 pitibus prae-
 dictorum mus-
 culorum.

DE ANATOMIA

In hac fi-
ura videtur
musculi exte-
iores latera-
les & partium
posteriores
proprie hu-
mani a quibus
medici reddunt
cauti in p-
roficandis
postemati-
is: vlcibus
vulneribus
in sectioni-
is: & in alijs
perationibus
chirurgiali-
is.





Et haec est fi-
 guratio qua a
 tergo videtur
 omnes muscu-
 li sub cute im-
 mediate loca-
 triquae prae-
 stat iuuamen-
 ta praenarra-
 ta / medicas et
 iste figure etiam
 iuuant picto-
 res in lineam-
 dis mēbra.

DE ANATOMIA

In ista figura videtur for-
mae et situs;
et etiam nume-
rus verus om-
nium ossium
corporis hu-
mani: exceptis
ossibus capi-
tis et etiam ossi-
bus dor-
si: quorum
iuncture
omnes non
possunt v. de-
ri nisi in cor-
poribus deco-
ctis vel exsic-
catis in ceme-
terio.






¶ In ista figu-
ra videt ossi-
gus posterior/
us huius videt
tur et due cal-
ne / quare dec-
tra videt coro-
nalis commissu-
ra / q̄ ē i pre su-
piori / videt / z
sagittalis / q̄ ē
i medio / vnde
tur enā tabe-
com sibi / q̄ ē
in pre sterio-
a lateribus ē
videt due co-
missure a me-
supra notate i
anatomia cra-
ni / q̄ sunt su-
pra commissu-
ra / s̄q̄ nosas
existēt ppe
aures sed iste
sunt fere insen-
biles / a fini-
stis est alia
calua / in qua
videt madi-
bule / z po co-
missure coro-
nalis / z due
commissure i tra
sagittalem ad
vā latus exi-
stentes / z vi-
det vā os de
duobus ossi-
bus parte qd
est a regione
oculi seu ab
ossē d. crā po-
mā faciei ten-
dens per facē
capitis versus
auram.

DE ANATOMIA

Cl̄ē in hac
 figura nume/
 r̄u/for̄mā/7 li/
 num ossiū ma/
 nus 7 pedis.
 In manu sūt
 extremitates
 duoz fociū
 brachij 7 octo
 ossa rasette/7
 quatuor pecti/
 nis/7 quinde/
 cim digitorū.

¶ In pede ha-
be os calca-
nei/ & os Ca-
bab/ & os Illa-
ticulari/ & qua-
tuor ossa raset-
te/ & quinq; os-
sa Dectimis/ &
ossa quatuor/
dedm digito-
rum.



Quum humani corporis sectionē publice ut sit haberentis: &
 nōnulli discipulorū (ut moris est inter ipsos nato liuore)
 per iocū atq; risum / caput pudēdag; subripuissent:
 Parthenius amenissimo ingenio iuuenis: Inde
 nactus Argumentū: hęc lufit.

¶ Plutonis & Harpagi dissecti Dialogus.

Plu. Ante meum quę nam uersatur imago cubile:
 Vulnere continuo dissita: trunca caput:
 Hanc procul in barathri furie torquete tenebras:
 Horrida ne elisios terreat umbra deos.
 Nanq; ego uix tali correptus membra pauore
 Hinc uidi alciden ducere in astra canem:
 Nec mihi deiphobi tam sęua occurrit imago:
 Cęsa aurem / & nares: depopulata manus.
 Illa nihil contra: (neq; n: producere uocem
 Os ualer abscessum) se tamen usq; motiet:
 Fare age / & hanc dixit pro tēpore suscipe linguam:
 Quę tibi tam dirum sors tulit exitium:
 Incipit illa / silent suspenso pectore manes:

Har. Harpagus / a / uulgo dictus / gula furra placebant:

Lignorum ascendi pulpita mœsta trium.

Inde ubi perfregit laquei compressio guttur:

Artubus / e / nostris maxima facta nota est:

Prorinus hoc miserum medici petiere cadauer:

Inq; schola acceptum constituere sua.

Stipantur denso subsellia plurima coetus:

Quorum unus gladios telaq; acuta parat:

Illicet abdomen districta nouacula scindit:

Quattuor inq; sinus dissilit una cutis.

Detegitur nullo constructum pancreon osse:

Et peritonei bractea pāniculi:

Omentum posthęc succedit tegmen / & intra

Intestina sacer iam penetrat gladius.

¶

Rectum. Apparet primo repletum stercore rectum :
 Colum. Scrutari at colum palma secunda fuit.
 Caecum. Hic manibus cecum gaudet tractare cruentis:
 Duodenum. Quodq; decem in digitos tenditur atq; duos,
 Ilion Jejunū. Ilion inspiciunt alii/ at ieiunia lenti
 Parca cibi longa sustinet ille mora:
 Lactes. Fit uia ui/Lactes tolluntur/qua solet ire
 Sanguis/ & albeni est semita nota chilo.
 Stomachus: Fosse dehinc stomachus magnum turgescit in orbem:
 & sui forma. Visitur hec maure forma cucurbitule.
 Lien. Cernitur hinc nigri quadrata figura lienis:
 Iecur. Illinc sanguineo finditur ense iecur.
 Vesica bilis. Cui bilis uesica hērens monstratur/ & ambos
 Rēnes. Dispare quē renes limite uena subit.
 Uretra. Vnde duplex intrans uesicę in claustra meatus
 Urina. Fert lotium/ & salse pondere turget aque.
 Vasa seminis. Seminis inde capax uas ferro aperitur utrunq;
 Podex. Hispida dehinc olidi podicis antra patent:
 Vene emoroidales. Quaq; uehunt nocuos constricta meacula fluxus
 Sanguinis/ & prauo pondere membra leuant:
 Nec satis illud erat uentris laniaisse recessus:
 Aqualiculus. Et uersasse caui scrinia aqualiculi:
 Pectus. Pectoris effringunt costas/ teretesq; lacertos:
 Costa. Ne grandem nequeat pandere pleura sinum:
 Pleura. Diuiditur trinum moles dein cordis in antrum:
 Cordistres. Vnde fluit sanguis/ spiritus unde fluit:
 ventres. Vnde fluit sanguis/ spiritus unde fluit:
 Vena in cor. Dextrum uena tenet/ sed leuo arteria pendet
 Arteria i cor. E latere/ hec ramos spargit/ & illa suos.
 Precordia si ue i Seraphre num. Suspenso uellunt gladii p̄cordia ductu:
 Hec de tutela nomina mentis habent.
 Mediastin? Hinc mediastini reseratur tela profundis:
 Gula Suttur. Quęq; cibum ac uocem semita bina uehit:
 Pulmo. Qui trahit alterno celum spiramine pulmo
 Scinditur in tenues illico particulas:
 Dorsum illu/ cha. Scinditur & dorsum/ neruosaq; uerebra: culus
 Exilit latebris multa medulla cauis.

Brachia/crura/pedes/corio nudantur adempto: *Brachia/crura/pedes.*
Vix tali perit marfia supplicio.

Fortecaput quidā/pendens & ab linguine mēbrum:

Atq; pia testes surripuere manu.

Scilicet immunis quora pars a uulnere ut esset:

Præstarentq; boni christicolæ officium:

Plu. At non ante tibi placidas inuisere sedes

Fas erit & stygios cymbula adire lacus:

Quā caput & gemino iunctum cum teste priapum

Ad solium referas nil remorate meum:

Har. Quare agite o/iuuenes mitissima pectora iam iam

Quæ mihi nunc desunt reddite membra precor:

Reddite & in solo componite cuncta sepulchro:

Viscera dum stygias cernere detur aquas:

Post rapite & uestros q̄primum uertite in usus:

Sive istis domine concilietur amor:

Seu penitas terræ luuet explorare cauernas:

Vnde aurum possit/fuluq; gēma legi:

Seu tali libeat medicamine sumere pennas:

Aetheraq; alarum findere remigio:

Har. Respuitis mea uerba: adero/noctuq; dieq;:

Et uario somnos phasmate disiciam.

O urinam tali mulcteris perfide poena:

Si cēlebs/capitis muneribus careas.

Sin coniunx penam amittas ut coniuge mēcha:

Mutere in tetrū fronte furente caprum.

Quod ens est adhuc aliqua alia de Anatomia & de Arte medica emittere / sed ineuitabilis alterius negotii culpa / huic operi finē imposui / in quo multa pro cōi Anatomia necessaria / discipulis nostris donauimus / de cuius fine laudetur / qui trinus et unus est / quē humillimē obsecro / ut me ad maiora dirigat / & qui nō est cōtētus de his / recurat ad nostra uberissima / super Mundini Anatomia comētaria . Valete in Domino candidi Lectores / quos semper ambimus ac ueneramur / iterū Valete .

Imortalitū est non errare / nō falli : quo circa si qua errata reperies / mortalibus ascribito / lingua sepe peruertit animū & scriptura effugit oculos / scitis quid trāscriptores / qd pressores / & quomodo scribūt ac p̄mūt / Recognito igitur toto uolumine / alicuius momēti errata (tum trāscriptoris / tū impresoris incuria) hic posita sunt : Multa tamen mala ortographia / in uersas / deficientes / ac superfluētes literas / punctuationes labe / culaq; obmisi / quas uiri docti agnoscēt emēdabūtq; . Valete .

In carta .z. ubi legit̃ stomacosa / legendū stomachosa & sic semp /
In car. tertia : prima uniuersalis / lege prima uniuersalia / ibidē / spiritalia / lege spiritalia . In car. 4. & uena portę / lege uena porta : & sic semp in nominatiuo / ibidē hypochondriū / lege hypochondrion & sic semp / ibidē pitonion / lege pitoneon & sic semp / ibidē sphōdili / lege sphōdyli uel spondyli & alibi sic semp / ibidē acrophalū / lege acrophalos . Carta .io. ascitis : lege & rectius ascitis / ibidem hoc intestinū sacus & cetus dictum / lege semper cecū intellinū .
Carta undecima / clisterizādi / lege clysterizādi / & sic semp cū .y .
Carta .iz. dodedactilon / lege dodecadactylon / & sic semper .
Carta .iz. nutritur a uena portę / lege porta . Carta .is. pyluron : lege pyloron / ibidem colericas / lege cholericas / & sic semp cū ch .
Carta .i6. sciatica / lege & rectius ischiadica / ibidem dyabrosis / lege diabrosis / & ibidē / a dya. lege a dia. & ibidē / & brosis seu rosis / lege tātū / & brosis / & depone seu rosis / & ibidē / Rixis / lege & rectius Raxis / & ibidē : q̄ incisio interpretat̃ / lege q̄ ruptio interpretatur .
Carta .ig. qua mediāte urinā / lege urina / ibidē ascitis lege ascites .

Carta. 19. cōponitur oscheſi/lege oscheos. Car. 20. agro naturę:
 lege agrū naturę. ſ. in matrice/lege in matricē. Car. 21. ragadas
 lege ragadēs. Car. 22. cotilldones/lege coryledones.
 Car. 26. nec in dētibus nec in cornibus/lege nec in dentes/nec in
 cornua. Car. 27. condron lege chondrios. Car. 28. proper lege
 propter. Car. 30. a medicis habetur/lege habentur. Car. 34. la
 ringa lege larynx/ & ita ubiq;. Car. 35. fragitides/lege ſphragiti
 des/ & ita ubiq; & ibidē/ & ab aliquibus Gula licet male/ licet ſe
 cundū aliquos male. Car. 37. q̄ cerebri centrū ex eodē nutritur
 lege quo cerebri centrū nutritur. Car. 38. & in forti ſquinātia &
 i acuto aſmate/lege & rectius i forti ſynāge & i acuto aſihmate.
 Car. 39. tendūt uerſus epyglottim/lege epyglottida/ & ibidē epl/
 glottis/lege epyglottidis/ & ſic ſemp; & ibidē laringā lege laryn
 ga/ & ibidē/aperationes/lege operationes. Car. 40. icteritiā/le
 ge icteron/ & ibidē heriſipellas/lege cryſipelas. Car. 42. p acci
 dent/lege per accidens. Car. 3. cinodētes/lege cynodentes.
 Car. 45. epyglottis/lege epyglottidis/ & ſic ſemper in genitiuo.
 Car. 46. lingua & epyglotti/lege epyglottidi. Car. 49. in epyglot
 ti/lege in epyglottide/ & ſic ſemper. Car. 50. epyglottis ſubito de
 ſcēdendo/lege epyglottide ſubito deſcēdēte. Car. 51. quod gręci
 cephalē/lege cephalen/ibidē/ craneū/lege cranīū/ & ſic alibi ſēp.
 Car. 52. cimiteriis/lege cœmeteriis. Car. 53. miringā/lege meni
 ga/ibidem miringa/lege meninx. Car. 68. deficiētie alterū/le
 ge alterius/ibidem qui uocatur ſcia/lege iſchiadica.

¶ Si qua etiā preter hęc mēdoſa lector inuenies/quę pro
 perātes oculos noſtros ſubter fugerint/ea quoq; pro
 tuo ludicio emēdabis: iterum Vale.

K iii

INDEX,

I Index Rerū dignarū cura / q̄ hoc uolumine cōtinētur

- Abdomen folio. llii. pagina. i. arteria aorta ascēdēs et descen/
 Acrophallū folio. llii. pagina. z. dens folio. 31. pag. i.
 Acrusta folio. 6z. pagina. i. arteria aorta est sexcupla ad ue
 Adiutoriū folio. 64. pagina. z. nam folio. xxx. pagina. z.
 Aeriplātātus in aure. f. 60. p. z. arundines fo. 69. pagina. z.
 Aegitroides fo. 19. pagina. i. ascham folio. 64. pagina. z.
 Ager naturę fo. 20. pagina. z. ascella quid et propter quid gra
 Alaria: Alulę: Alę nasi f. 57. p. z. uiter oleat folio. 64. pagina. z.
 Alcadā Alchael Alchel. f. 61. p. i. auricula cordis folio. 29. pag. z:
 Alcharīm f. 4. p. z. & fo. 6z. p. i. auritium folio. xxxi. pagina. i.
 Alfahic fo. 46. pagina. i. et. z. auriū locus folio. 51. pagina. z.
 Almochatīm fo. 51. pagina. z. aures unde folio. 60. pagina. i.
 Amigdalę fo. 46. pagina. i. auris meninx folio. 60. pagi. z.
 Anastamosis fo. 16. pagina. z. **B**
 Anatomia qd et uñ dicat. f. 3. p. i. Bacham folio. xxxix. pagina. i.
 Ancha folio. 68. pagina. i. Basis capitis folio. 51. pagina. z.
 angulus et cāth⁹ oculi f. 59. p. i. Bracōcelus folio. 46. pagina. z.
 animella folio. 33. pagina. i. Brachium folio. 64. pagina. z.
 anteron folio. 41. pagina. i. Bregma. folio. 51. pagina. z.
 antiadas folio. 46. pagina. i. Bregma folio. llii. pagina. i.
 ante carpum folio. 67. pag. z. Botium folio. 46. pagina. i.
 antyoides folio. 49. pagina. i. Brisaro folio. 1z. pagina. z.
 anus folio. 21. pagina. i. Brochi folio. xli. pagina. z.
 aqualiculus folio. 19. pagina. z. Bronchium folio. xxxiii. pag. i.
 arca aeris folio. 46. pagina. i. Brōchii et gutturis caput f. 48.
 armilę folio. 48. pagina. i. Bubo folio. 4. pag. z. (pag. i.
 arterię sēpitnę f. 5. p. i. et f. 16. p. i. Buccula Bucella fo. 41. pag. i.
 arteria aspera folio. 34. pagi. i. Buca Bucę fo. 41. pag. z.
 arteria aspera) Bucā saporita fo. xii. pag. z.
 arteria uocalis) fo. 48. pag. i. Bursa testium fol. 19. pagina. i.
 arteria trachea) **C**
 arteria aorta ē maior supra cor Cacumen capitis fo. 51. pag. z.
 q̄ infra folio. 31. pagina. i. Chaiafim folio. 61. pagina. i.
 arteria uenalis) Chaiafim folio. 57. pagina. z.

- Calua folio. 51. pagina. z.
 Cāpana oris fo. xlii. pagina. z.
 Camercula supra palatū fo. 61.
 Cāna pulmōis f. 48. p. i. (pa. i.
 Cane folio. 69. pagina. z.
 Cānale uirgē folio. xx. pag. i.
 Cānalis urinē folio. 17. pag. i. z.
 Capilli folio. li. pagina. z.
 Caput uirgē folio. xx. pag. i.
 Caput qd et uñ dicat f. li. pa. z.
 capitis cōmissurē dēratē f. lii. p. i.
 caput habet partes clauales et
 aculares fo. 52. pag. z.
 capitis cōmissurē coronalis: sa/
 gitalis lambdē et squamosē
 folio. 52. pagina. z.
 capitis cōmissura ocula)
 capitis fontanella fo. 53. pag. i.
 caput rosē fo. liii. pag. z.
 caro lūbaris fo. liii. pag. z. (p. i.
 caro glādosa conatiū dicta f. 55.
 carūculē mamillares in cerebro
 folio. lvi. pagina. z.
 carpus fo. 64. pagina. z.
 caro glādosa oculi fo. 59. pig. i.
 carthilago pomum granatum
 dicta)
 carthilago glādialis)
 carthilago scutalis) fo. 4. p. i.
 carthilago glottis)
 carthilago cimbalaris. 39. pa. i.
 carthilagies epiglottidis et sua
 nomina fo. 49. pag. i.
 carthilago colūna nasi f. 57. p. z.
 carthilago duplex fo. 67. pag. i.
 carthilago alaguahic fo. 67. p. i.
 cassus fo. xxiii. pagina. z.
 cā reuolutiōis iteslinog f. x. p. z.
 cauile pedis folio. 69. pag. z.
 celum et altū oris fo. 43. pag. z.
 ceruix matricis fo. xxi. pag. z.
 cento folio. xxi. pagina. i.
 cenona folio. 4. pag. i.
 cephalē folio. li. pagina. z.
 cerebri medulla fo. liii. pag. i.
 cerebrū maximū hominē)
 cerebrū āteri? et posterius)
 cerebri duo uentres f. 54. pa. z.
 cerebri uermium locus fo. 54.
 pagina. z.
 cerebri uermes uñ oriūt fo. liii.
 cerebrū uēter medius) (p. z.
 cerebrū uēter posterior f. 56. p. i.
 cerebrū nerui quot sint) et. z.
 ciborum ministra fo. 50. pag. i.
 cilia unde fo. 58. pag. i.
 circū ossalis mēbrana fo. 51. p. z.
 cystis parua fo. 14. pag. i.
 cystis bilis/ fel/ foliculus/ faccus
 folio. 14. pagina. z.
 cystis bilis oppilatio fo. xv. pa. i.
 clauis clides clidia f. xxxv. p. z.
 clibanū clauis fo. 24. pa. z.
 clunes fol. 4. pag. z.
 chondros fo. xxvii. pag. i.
 colago fo. 4. pag. z.
 collū qd et pp qd fo. xxxiii. p. z.
 columella columna fo. 44. p. i.
 colum matricis fo. xxi. pa. z.
 colatoriū cerebri ubi f. lii. pa. z.
 colatoriū in fronte fo. lviii. p. i.
 cōiūctiua oculi tunica f. lix. p. i.

K liii

INDEX

- Condylomata f. xxi. p. z.
 Cotyledon fo. xli. pa. i.
 Cotyledones fo. xxi. p. z.
 Cordis capsula fo. z8. pa. z.
 Cor sol microcosmi)
 Cor primo format
 Corde hirto aliqui) fo. z9. p. i.
 Cordis forma)
 Cor figuratū f. xxi. & xxii.
 Cornua matricis f. xxi. pa. i.
 Costatus fo. xxv. pa. i.
 Costa fo. z7. pa. i.
 Cranion fo. li. pagina. z.
 Craniō & sua bōa forma f. lii. p. i.
 Cremasteras f. ig. pa. z. & i9. p. i.
 Crus fo. 68. pagina. i.
 Crus fo. 69. pa. z.
 Cubitus ubi fo. lxvii. pag. z.
 Cubitus fo. lxiii. pag. z.
 Cucurbitula maura fo. xii. p. z.
 Culcitra uenę chilis fo. 33. p. i.
 Curua palpebra fo. lviii. pa. z.
 Cura ciliorū Inuersorę f. lix. p. i.
 D
 Darion fo. i9. pa. i.
 Dentes plures maribus q̄ feml
 nis & sua nomina fo. xlii. pa. i.
 Dētes neguedid: intellectus: sa
 pientię: fo. xlii. pa. z.
 Diaphragma fo. z8. pa. i.
 Diaphragma est paries in cor/
 de fo. xxx. pag. i.
 Diaphragma in naso f. lvii. p. z.
 Digitorę noia & locus f. 67. p. z.
 Diabulum fo. xxxix. pa. i.
 Diabrosis fo. i6. pag. z.
 Dragonzelus fo. xlv. pa. z.
 Dulcis morsus fo. xii. pa. z.
 Dura mater fo. li. pa. z.
 Dura mater fo. liii. pa. i.
 E
 Embotum fo. liii. pag. z.
 Emulctoriū hepatis f. lxi. pa. i.
 Epigastriū fo. liii. pag. i.
 Epiglottis fo. xlviii. pa. i.
 Erytipelas fo. 40. pa. z.
 Eucarus folio. xii. pagina. i.
 Eugion fo. xxii. pag. i.
 F
 Facies & unde fo. xl. pagina. i.
 Farynge Fragitides fo. 35. p. i.
 Fauces qd: Farynx: f. xlviii. p. i.
 Fibre folio. v. pagina. i.
 Ficus morbus fol. zi. pagina. z.
 Filum dorsi fo. liii. pagina. z.
 Filellus uirgę fo. zo. pa. i.
 Filellus lingue fo. xlv. pa. z.
 Fimbria auris fol. lx. pa. i.
 Fissura matricis fo. xxi. p. z.
 Focilia brachiorū f. 67. pa. z.
 Focilia crurū fo. lxi. pag. z.
 Fontes saluę fo. xlv. p. z.
 Fontanella colli fo. lai. pa. i.
 Foramen cōe uirgę & uelice
 folio. zo. pagina. i.
 Fos folio. xxv. pa. z.
 Fossulę in matrice fo. xxi. pa. z.
 Fouea fo. liii. pag. z.
 Fouea fo. xxxvii. pa. z.
 Flabellum fo. 33. pag. i.
 Flamen cum ictu fo. 8. pa. z.
 Flancus fo. liii. pag. i.

- Flexor fo. 39. pagina. i.
 Flexor fo. 31. pagina. i.
 Frons & unde fo. xl. pa. z.
 Frontis rugę fo. xl. pa. z.
 Frons fo. lii. pag. z.
 Fundibulum fo. xlii. pag. i.
 Fungus morbus fo. zi. pa. z.
 Furcula inferior fo. xxv. pa. i.
 G
 Galsamac fo. xvi. pa. z.
 Gargar fo. xlii. pa. i. & f. 48. p. i.
 Gargareon)
 Golsama fo. xvi. pa. z.
 Gelafinus) fo. xli. pa. i.
 Gena)
 Gena fo. lyiii. pag. i.
 Genę fo. 41. pa. z.
 Gingiua & unde fo. xlii. pa. z.
 Girgilus fo. 39. pa. i.
 Glabela)
 Glabra) fo. 40. pa. z.
 Glaber)
 Glans uirgę fo. zo. pa. i.
 Glottis fo. xlix. pa. z.
 Glutum fo. lxii. pa. i.
 Granges fo. 35. pa. i.
 Gręa fo. 5. p. i. Gręa f. 69. p. z.
 Gula fo. 46. pa. i.
 Gula fo. 35. pag. z.
 Guttur quid sit) fo. 48. pa. i.
 Gutturis nodus)
 Guttur ē hominī rātū f. 46. p. i.
 Gurgulio fo. 44. p. i.
 Guta rosacea fo. 40. pa. z.
 H
 Hepar fo. xlii. & xlii.
- Hernia) fo. xlx. pa. i.
 Hirnea)
 Hetron fo. liii. pa. i.
 Hira: Hilia fo. xl. pa. z.
 Hypochōdriū fo. liii. pa. i.
 Hyspia fo. xli. pa. i.
 Humores oculorū tres/ & qua
 tuor fo. lix. pa. z.
 I
 Ianitor fo. xii. pa. i.
 Iecur fo. xlii. pa. z.
 Ilium fo. liii. pa. i.
 Imen fo. xxii. pa. i.
 Inguen fo. liii. pa. z.
 Intersticiū oculorū fo. 40. p. z.
 Inter scapillum fo. 25. pa. i.
 Intestinorū nomina fo. x. & xl.
 Intestinū dodecadactylō f. xli.
 Iugulum fo. xxliii. p. z. (p. i.
 Interciput fo. li. pa. z.
 Interfinium nasi fo. 57. pa. z.
 L
 Labra) fo. xli. pa. z.
 Labia)
 Lac fo. 25. pa. z. & unde exeat
 folio. 26. pa. i. & z.
 Lacuna fo. liii. pa. z.
 Lacuna fo. 37. pa. z.
 Lacuna mundini ubi in cere/
 bro fo. liii. pa. z.
 Lacuna in facie fo. xli. pa. i.
 Lactes fo. xli. pa. i.
 Lacticinium fo. xxxlii. pa. i.
 Lagona. fo. 4. pa. i.
 Larynx fo. xlviii. pa. i.
 Larynga: larynx: f. xxxlii. p. i.

INDEX:

- Latera folio. xxv. pagina. i.
 Lambda folio. xvi. pagina. i.
 Lepor nasi f. xl. p. z. & f. lvii. p. z.
 Lingua & unde dicat f. xlii. p. i.
 Lien folio. xlii. pagina. z.
 Lobus fo. xxxiii. pag. i.
 Lobus auris fo. lx. pag. i.
 Lumbaris regio fo. liii. pa. z.
 Lumbaria fo. ig. pag. z.
 M
 Mādibulę quę sint fo. xlv. p. z.
 Mādibulę tres mot⁹ f. 47. p. i.
 Mamillę pp qd tument in pre-
 gnantibus fo. xvi. pag. i.
 Mamillę fo. xxv. pa. z.
 Malę folio. xli. pa. i.
 Man⁹ magna & parua f. 64. p. z.
 Manus hepatis fo. xii. p. i.
 Matrix: Mariscę fo. xxi. pa. z.
 Maxilla fo. xlv. pa. z. (z.
 Matricis tm duę celullę f. z. z. p.
 Matrix inuerfa fo. xxii. pa. z.
 Matrices duę fo. xxiii. pag. i.
 Medium dorsi fol. xliii. pa. z.
 Mentum folio. xli. pag. i.
 Meninx fo. liii. pag. i.
 Mēbra uētris inferioris quot fo.
 Meri f. xlv. p. i. & f. l. p. i. (4. p. i.
 Meseraice sanguificant
 folio. x. pagina. z.
 Meseraice lactes fo. x. pa. z.
 Mesentereō duplex fo. iz. p. i.
 Meseraice fo. xli. pag. i.
 Metaphrenon fo. xxv. pag. i.
 Metacarpū i manu fo. lxvii. p. z.
 Mirach fo. liii. pa. i.
 Mystax fo. xli. pa. i.
 Mons & altū pedis f. lxi. p. z.
 Morbus Gallicus fo. xlv. pa. z.
 Morum fo. 33. pag. i.
 Morum fo. xxxvi. p. z.
 Musculi octo abdominis f. v. p. i.
 Musculorū temporaliū solutio
 pessima fo. xlvii. pa. i.
 Musculi pectoris fo. xxvi. pa. z.
 Mustax fo. xli. pa. i.
 Medulla unde & qd sit f. 67. p. i.
 N
 Nasus Nares fo. lvii. pa. z.
 Nasi cartilaginee fo. lviii. p. i.
 Nasi ossa) fo. lvii. pa. z.
 Nasi interfiniū)
 Nates fo. lxi. pa. i.
 Nates fo. liii. pa. z.
 Nates in cerebro fo. liii. pag. z.
 Nerui descēdētes fo. xxxvi. p. i.
 Nerui apopletici f. xxxviii. p. z.
 Nerui descendentes fo. 38. p. z.
 Nerui reuerfui & uocis f. 39. p. i.
 Nerui. 7. paris ad epiglottida)
 Nerui uocis fo. xxxix. pa. z.
 Neuron)
 Neruus) fo. lvi. pa. z.
 Nerui optici & uisus: & p motu
 oculorū: & uocis: & gustus ac
 auditus fo. lvi. pag. z.
 Neruus opticus fo. lix. pag. i.
 Noīe carēs i manu fo. 67. pa. z.
 Nocra)
 Notiços) fo. lxi. pa. z.
 Noton fo. xxv. pa. i.
 Nucha unde oriat fo. ly. pag. z.
 Nucha notiços & myelos dicif
 Nucha f. lyii. p. i. (fo. lxii.

- Nuchę oēs nerui fo. lxiil. pa. i. Ossa pectinis / penis / pubis / se-
 Nucha fo. lvi. pa. i. moris / illiū fo. 69. pa. i.
 Numerus neruorū nuchę f. 63. Ossa alhartapha)
 O (pa. i. Ossa ischia & acetabulū)
 Ociput fo. li. p. z. Ossa coxę & rotulę genu f. 69.
 Oculi unde fo. lix. pa. i. Oscheon fo. i9. pa. i. (p. i.
 Oculorū tunicę fo. lix. pag. i. Ostiola in corde f. 30. & 31. p. z.
 Oesophagus fo. i. pag. i. Ostiola C formia
 Omentum fo. x. pag. i. Oua fo. xix. pagina. z.
 Orbitę oculorū fo. i. pag. i. P
 Oris partes fo. xli. pag. i. Palatum fo. xliil. pa. z.
 Os pubis fo. iiii. pag. i. Palma in manu fo. 67. pa. z.
 Os hyoideum) Palpebra fo. lviil. pa. i.
 Os lambda f. xlv. p. i. & f. xlix. Palmentū fo. liii. pa. z.
 Os alphatic & sul musculi f. 45 Platea) fo. liii. pa. z.
 Os genitale fo. xxi. pa. z. (p. i. Pāniculus carnosus f. 4. p. z.
 Os matricis fo. xxii. pa. i. Pāniculus uirginalis f. z. z. p. i.
 Os sisaminum) Pāniculi duo i sphōdylis fo. 6z.
 Os chahab) Paries fo. z8. pa. i. (p. z.
 Os calcanei fo. lxi. pa. z. Patigiba fo. xv. pa. z.
 Os naiculare) Paristhmia fo. xli. pa. i.
 Os sacrū Os agit fo. lxii. pag. i. Papilla fo. xxv. pa. z.
 Ossis sacri tria ossa) Pars stomacalis fo. iiii. pa. i.
 Ossa alhauis fo. lxii. pa. i. Pecten fo. liii. pa. i.
 Ossa caudę) Pecten manus fo. 67. pa. z.
 Ossa bregmatis fo. liii. pag. i. Pectus fo. xxliii. pa. z.
 Ossa paris fo. xl. pa. z. Pectus & uñ dicat fo. xxv. pa. i.
 Ossa alhiliricti sunt post aures f. Pectoris ossa fo. z7. pag. i.
 Ossa petrosa f. lii. p. z. (47. p. i. Pleura Pleuron fo. z7. p. i. & z.
 Ossa i4. digitorū f. lxi. pa. z. Penulę fo. xxxiiil. pa. i.
 Ossa quinq; pectinis) Peritardia fo. z8. pa. z.
 Ossa adiutorii fo. lxvii. pag. i. Perineon fo. xxii. pag. z.
 Ossa ancharū fo. lxii. pa. i. Peritoneon fo. x. p. i. & f. liii. p. z.
 Ossa alhosos fo. lxii. pag. i. Preputia fo. xxii. pag. i.
 Ossa caudę fo. lxii. pag. i. Pręsepia fo. xliil. pa. i.
 Ossa man' q̄ sint & ubi f. 68. p. i. Preputiū Perineon fo. xx. p. i.
 Ossa anchę fo. lxyiil. pa. i. Pes magnus & puus f. 68. p. i.

INDEX

- Pericraniū & sua iuuamēta fo. Renes) fo.17.pa.1.
 Pla mater f.li. & liii. (li. & lii. Renones)
 Pina auris fo.1x.pa.1. Renum lacuna fo.17.pa.z.
 Pinguedo oculi fo.lix. Rexis fo.16.pa.z.
 Pinguedo nō est mēbrū fo.iii. Rhoas fo. xxvii. pa.1.
 pa. z. & folio. 5. pa.1. Rumē fo. xxv. pa. z.
 Pixis. fo.1xvii. p.i. S
 Pyloron & portanatiū f. xii. Sanguinis serofitas est sudor
 xlii. & xv. p.i. folio. 5. pagina. 1.
 Podex fo. xxi. pa.1. Septum trāsfuerfum f. z8. p.1.
 Pomū granatū fo. xxv. pa.1. Septum porrectum fo. 57. p. z.
 Poma infacie fa. xli. pa.1. Setones fo. 61. p.1.
 Porex fo.1xvii. pa. z. Siphac f. liii. p. z. & f. x. p.1.
 Procarpū & procarpiū fo. 67. Synāge & squinātia fo. xlv. p. z.
 Prochilum) (pa. li. Sinciput fo. li. pa. z.
 Proftomion) fo. xli. pa. li. Scaphus fo. 60. p.1.
 Proftomla) Scapula)
 Profopon fo. xl. pa.1. Spatulē f. z5. p.1. & f. 64. & 67.
 Pulmo fo. xxxiii. pa.1. Scapiliū)
 Pudendū muliebrē f. xxi. p. li. Sclerotica oculi tunica fo. 59. p.1.
 Philtron fo. xli. pa.1. Scrotum) f. xix. pa.1.
 Phrenes fo. xxviii. pag.1. Scortum)
 R Spiritalis fistula fo. xlviii. pag.1.
 Radix hois ē ūbilicus f. liii. p. z. Spina inferior fo. liii. pag.1.
 Ragadas) fo. xxi. pa. li. Splen fo. xiii. pag. z.
 Radadiē) Ramex fo. 19. pag.1.
 Raseta fo. lxiii. pa. z. Stomachus proprie fo. xii. pa. z.
 Rectum Intestinum inuerfum Stragulum fo. xxxiii. pag.1.
 & p̄cipitatū fo. xxi. p.1. & li. Strept⁹ iter mingēdū f. zz. p.1.
 Recepraculū matricls f. zi. p. li. Strangoioni fo. xlv. pa. z.
 Repositorū ī faucib⁹ f. xlv. p.1. Struma fo. xlv. pa.1.
 Rete fo. x. pag.1. Spherion fo. xli. pag.1.
 Rete mirabile f. 38. p.1. & f. lvi. Sphōdyli. 7. colli & sua noia f. 61
 Renalis regio fo. liii. pag. li. Sublinguium fo. 49. p. z. (p. z.
 Renum fasciē fo. i5. pa. z. Sumen fo. liii. pa.1.
 Summū dorsi fo. xliii. pa. z.
 Suspēforū testiculī fo. xlx. p.1.

- T**
- Tarsus: folio .lviij. p. z.
- Tēpora & uñ/fo. xl. p. z.
- Tenon folio .lxi. p. i.
- Tertia uena est torcular fo. liij. (p. z. Venę ascendentes)
- Testa fol. li. p. z.
- Testiculi fo. 19. pag. z.
- Testiculi mulierum fo. xxii. p. i.
- Tibia fo. lxi. pag. z.
- Timū fo. xxxiii. p. i. & f. xxxvi.
- Typos fo. xli. pag. i. (pag. z.
- Torcular fo. xxxvii. pag. z.
- Thorax fo. xxliiij. pa. z.
- Tonillę fo. xli. pagina. i.
- Trachea fo. xxxiiii. & xxxv. p. i.
- Tubercula fo. xxi. pagina. z.
- V**
- Vasa spermatica pparantia &
- Variciformia & epididyma / &
- Anēdor & Andros & defferē
- tia & conseruātia & parastrata
- adeniformia fo. 18. pag. i. & z.
- Vasa spmatica mulierę f. z. z. p. i.
- Vallecula fo. xli. pag. i.
- Vehiculū nutrimenti fo. 18. p. i.
- Vena basilica folio lxiiij. p. z.
- Vena audax fo. xxx. pa. i.
- Vena ischiadica ī pede f. 68. p. i.
- Vena concaua fo. xxx. pag. i.
- Vena chilis fo. xxx. pag. i.
- Vena nutriēscor f. z. 9. & 36. p. z.
- Venę guidez pfundę iuuamē/
- ta foli. xxxvii. pag. z.
- Vena ascendens)
- Vena audax fo. xxx. pa. i.
- Vena arterialis fo. xxx. pag. z.
- Venę sphragitides f. xxxv. p. z.
- Venę guidez / appoplecticę / so
- mni / pēfiles / spermaticę / iuue
- niles / iugulares / organicę / fa
- gotides: carotides. f. xxxv. p. z.
- Vena nutriēs cor fo. xxxvi. p. i.
- Vena chilis in cor. f. xxxvi. pa. z.
- Vena arterialis fo. xxxvi. pa. z.
- Vene nutriētes mamillas & por
- tātes materiā lactis. f. 36. p. z.
- Vena ascelaris / basilica / hepa/
- tis / guidez manifesta & ocul/
- ra: spatularis: humeralis: cepha
- lica: spmaticę ab Hippo. fo. 37.
- Venę mamillaz fo. v. p. i. (p. i.
- Venaz mater / parigibba / chi/
- liscōcaua: chilis & aorta descē
- dētes: & emulgētes fo. xv. p. z.
- Venę ad mamillas fo. xvi. p. i.
- Venę plures q̄ arterię. f. xvi. p. z.
- Venę in fronte & in tēporibus
- folio. xl. pagina. z.
- Venę sub lingua & sua nomina
- folio. xlv. pagina. z.
- Vena porta & sui rami folio. xl.
- pagina. i. & fo. xliii.
- Vena ischiadica & saphena fo/
- lio. xvi. pagina. i.
- Venę guidez quomodo phle/
- botometur fo. xxxviii. pag. z.
- Venę manus nomina & iuua/
- menta folio. lxiiii. pag. z.
- Venter matricis)
- Vterus) fo. xxi. pag. z.
- Vulua)

INDEX

Vretra fo.xx.pa.1.& fo.xiii.p.2: Vena Basilica)
 Umbilicus ueneris fo.xli.pag.1. Vena Hepatis) folio. lxxiii
 Umbilicus & suus locus fol.iiii. Vena Iecoraria)
 & v.pagina.1.& z. Venę umbilicales fo.xiii.pag.1
 Umbilicalis pars fo.iiii.pag.1. Vena chilis & sue partes f.xiii
 Vetula folio.iiii.pagina.z. Vena chilis tripartitur sub po/
 Ventriculus fol.xii.pagina.z. plite fo.lxxviii. pag.1.
 Vermes cucurbitini ubi gene/ Vena saphena pedis fo. 68.pa.
 rentur fo.xi. pagina.1. Vertebrum fo.lxxvii.pagina.1.
 Vinea est soli homini) Vola in manu fo.67.
 Vuigera) f.xliiii.pa.1. Z
 Vuigena) Zirbus folio.x. pagina.1.
 Ventilabrum folio.xxxiii. pa.1. Zinzia mater fo.1.
 Vertex folio.1i.pagina.1. Zuendeck fo.1iii.
 Vena Regia folio.lxxiii. Finis.

Hic finit Vberime ac breues Ifagoge Anatomices: diligētius
 q̄ antea figuratę: Authore Eximio Artū ac Medicinę Do
 ctore Dño .M. Iacobo Berengario Carpenſi: Regii
 Lepidi: ſeu Lingobardię: ac Bononię ciue: Chi/
 rurgiā ordinariā in Almo Bononięſi Gy
 mnasio docente: addito Plutonis &
 Harpagi diſſecti dialogo/ autho
 re Parthenio Foroiulięſi Car
 pi amiciffimo. Anno uirgi
 nei partus. 1523. Sub
 die. xv. Iulii.

Impreſſum & nouiter reuiſſum Bononię: per Bene/
 dictum Hectoris Bibliopolam
 Bononięſem.


REGESTVM.


A. iiii. B. iiii. C. iiii. D. iiii. E. iiii. F. iiii. G. iiii. H. iiii. I. iiii. K. iiii.





1654
Z
(ph) 10603

RECEIVED
JAN 10 1864









005644077

CB